

Röntgenographische Untersuchungen an Isopolywolframaten

Inaugural - Dissertation
zur Erlangung des Grades eines
Doktors der Naturwissenschaften
im Fachbereich Chemie
der Freien Universität Berlin

vorgelegt von
Wilfried Freiwald
aus Berlin

1977

Röntgenographische Untersuchungen an Isopolywolframaten

Inaugural - Dissertation
zur Erlangung des Grades eines
Doktors der Naturwissenschaften
im Fachbereich Chemie
der Freien Universität Berlin



vorgelegt von
Wilfried Freiwald
aus Berlin



1. Gutachter: Prof. Dr. J. Fuchs

2. Gutachter: Prof. Dr. H. Hartl

Tag der mündlichen Prüfung: **26. JAN. 1977**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Einleitung	7
1.1. Isopolywolframsäuren	7
1.2. Ziel der Arbeit	17
1.3. Darstellungsmethoden	20
1.4. Analysenmethoden	23
2. Ammoniumparawolframat-B	25
3. Bestimmung der Gittergeometrie an Einkristallen des Tributylammonium(5:24)-Wolframats	36
3.1. Einführung	36
3.2. Darstellung von Einkristallen des Tributylammonium(5:24)-Wolframats	37
3.3. Fragen zur möglichen Struktur des Tributylammonium(5:24)-Wolframats	38
3.4. Bestimmung der Zellparameter	44
3.4.1. Grundlagen	44
3.4.2. Praktische Durchführung	46
4. Die Struktur des Tetrabutylammoniumhexawolframats	50
4.1. Herstellung des Untersuchungsmaterials	50
4.1.1. Darstellung des Tetrabutylammonium(1:6)-Wolframats	50

	Seite
4.1.2. Herstellung von Einkristallkugeln	52
4.2. Methodik der Röntgenstrukturbe- stimmung	55
4.2.1. Zur Intensitätsmessung mit Hilfe des AED's	55
4.2.2. Theorie zur Röntgenstrukturanalyse	59
4.3. Praktische Durchführung der Messungen	68
4.3.1. Bestimmung der Zellparameter (AED)	68
4.3.2. Veränderung der Gitterkonstanten	70
4.3.3. Messung der Intensitäten	73
4.4. Bestimmung der Struktur des Tetra- butylammonium(1:6)-Wolframats	76
4.5. Beschreibung der Struktur	101
4.5.1. Allgemeine Beschreibung der Struktur	101
4.5.2. Diskussion von Atomabständen, Bin- dungslängen und Vergleich mit anderen Strukturen	109
4.5.2.1. Atomabstände, Bindungslängen und Temperaturfaktoren	109
4.5.2.2. Thermische Schwingungen der Anionen als starre Körper	125
4.5.2.3. Diskussion und Vergleich mit anderen Strukturen	131
4.5.3. Kraftkonstanten und Bindungsordnung	151
4.5.4. Die Struktur der Kationen	156

	Seite
4.5.5. Wasserstoffatomlagen und Signifi- kanztest	158
4.5.6. Diffuse Beugungserscheinungen	165
5. Zusammenfassung	167
6. Anhang	171
6.1. Experimentelles	172
6.2. Liste der F_O , F_C -Werte	175
6.3. $M-O_b$ - Diagramme	195
6.4. Bindungslängen und Winkel der Kationen	198
6.5. Anisotrope Temperaturschwingungen der Kohlenstoffatome	200
6.6. Schwingungsfrequenzen der Poly- wolframate in IR-und Ramanspektren	201
7. Literaturverzeichnis	207

1. Einleitung

1.1. Isopolywolframsäuren

Die Nebengruppenelemente Wolfram und Molybdän bilden in der Oxydationsstufe plus sechs mit Sauerstoff eine ganze Reihe von Isopolyanionen, Ionen, die außer dem namengebenden Element, Sauerstoff und Wasserstoff keine weiteren Elemente enthalten. In alkalischer und neutraler Lösung liegt das Wolframat und Molybdat als monomeres, tetraedrisch aufgebautes WO_4^{2-} bzw. MoO_4^{2-} vor.

Beim Ansäuern entsteht durch Addition und Kondensation ein ganzes System von durch reversible und irreversible Gleichgewichte verbundenen Isopolyanionen. Diese bestehen, entsprechend der Werner'schen Koordinationslehre und nach L. Pauling (1,2,3,4), im wesentlichen aus MO_6 -Oktaedern und MO_4 -Tetraedern (M = Metall).

Viele dieser Aggregationsprodukte lassen sich in der Lösung nur mit Hilfe physikalisch-chemischer Methoden nachweisen. Man bedient sich dieser Methoden auch bei der Untersuchung des Aggregationsgrades, der die Anzahl der Metallatome im Polyanion angibt.

So wurden beispielsweise für das Wolframsystem folgende physikalisch-chemische Meßmethoden angewandt (5,6,


7,8):

- a) Potentiometrische, konduktometrische, thermometrische und refraktometrische Titration unter Variation des Verhältnisses H^+/WO_4^{2-} (9,10,6,5,11)
- b) UV-Absorptionsmessungen (5)
- c) Molmassebestimmungen mit Hilfe von Diffusions- und Dialysemessungen (12,13,14,5)
- d) Molmassebestimmungen mit Hilfe der Salzkryoskopie (11,13,15)
- e) Papierchromatographische Untersuchungen mit (16) und ohne (15) radioaktivem ^{185}W
- f) Messung des polarographischen Halbwellenpotentials (11)
- g) Molmassebestimmung mit der Ultrazentrifuge (17,20,21)

Bei festen Salzen führt man zur Bestimmung von Struktur- oder Kristallwasser isobaren oder isothermen Abbau und Kernresonanzmessungen durch (22,8).

Ganz allgemein kann man die angeführten Isopolyionen zur umfassenderen Klasse der Heteropolyanionen zählen, bei denen Aggregationsprodukte der Ionen des Vanadins, Molybdäns und Wolframs noch Atome weiterer Elemente enthalten, während von den anderen Elementen der V. und VI. Nebengruppe, dem Niob, Tantal und Chrom im wesentlichen Isopolyaninen bekannt sind.

Am besten aufgeklärt ist das System der Aggregationsvorgänge des Chromats (23), deren Endprodukt nicht die freie Säure H_2CrO_4 , sondern das wasserfreie Kondensat $(\text{CrO}_3)_n$ ist (24). Beim stärkeren Ansäuern einer Wolframatlösung, $\text{H}^+/\text{WO}_4^{2-} \geq \text{Azidifikation } 2^*$, entsteht hingegen ein Oxidhydrat.



Auf dem Wege zu diesem aus WO_6 -Oktaedern aufgebauten Endprodukt (25) und bei niedrigeren Azidifikationsstufen treten eine ganze Anzahl von durch Additions- und

* Es ist zweckmäßig, die Wasserstoffionenzugabe nicht durch den pH-Wert, sondern durch die Azidifikation x (gleich Ansäuerungsgrad P) anzugeben. Man versteht darunter das Molverhältnis von e i n gesetzten H^+ -Ionen zu eingesetzten WO_4^{2-} -Ionen in einer Lösung.

Der Z^+ -Wert ist das Verhältnis der stöchiometrischen Koeffizienten für H^+ und WO_4^{2-} in der Brutto-Bildungsgleichung für ein definiertes Produkt.


Das Verhältnis u m gesetzte Grammionen H^+ pro eingesetzte Grammionen WO_4^{2-} wird Säuregrad Z genannt. Er ist der Mittelwert der gewogenen Z^+ -Werte.

Die Bezeichnungen entsprechen der Schule Sillén sowie Schwarzenbach (27) und Tytko (34).

Kondensationsreaktionen entstandener Zwischenstufen auf.


Als erster Schritt einer solchen Aggregation wird von Schwarzenbach et al. (26,27) und Glemser (28,29) die Anlagerung eines WO_4^{2-} -Ions an ein ein- oder zweifach (26,27,29) protoniertes anderes WO_4^{2-} -Ion vorgeschlagen (s. a. Kap. 2.). Das zweite Wolframatom verändert dabei seine Koordinationszahl von vier auf sechs und erhält damit eine oktaedrische Sauerstoffsphäre. Die Protonierungsreaktionen am Wolframatom wurden, da es sich um sehr schnell ablaufende Vorgänge handelt, mit Hilfe von Strömungsmethoden und Relaxationsmessungen mit der Temperatursprungmethode erforscht (26,27,30,31,32,33).

Im einzelnen ist im Ansäuerungsschema einer wäßrigen Natrium-, Kalium- oder Ammoniumwolframatlösung bei der Azidifikation $x = 1,167$ ($7\text{H}^+ / 6\text{WO}_4^{2-}$) ein hexameres Ion, das Parawolframation-A bekannt (14,13,35,11),



* Gleichungen dieser Art sind formal aufzufassen, da nicht nur der direkte Aufbau (über Zwischenstufen), sondern auch die Entstehung aus Zerfallprodukten von zuvor gebildeten Polyanionen denkbar ist.

das sich langsam über das hexamere Parawolframation-B (5,8,36) in das dodekamere Parawolframation-Z $[H_2W_{12}O_{42}]^{10-}$ (Z^+ ebenfalls gleich = 1,167) umwandelt.



Die ersten Untersuchungen über die Parawolframate wurden schon 1847 von Laurent (37) durchgeführt, der auch den Namen vorschlug. Sie waren in der Zwischenzeit bis in die Gegenwart oft Gegenstand analytischer Untersuchungen (38 - 54), wobei es sich jedoch immer um das Parawolframat-Z gehandelt haben wird.

Parawolframate-Z fallen bei Kristallationsversuchen als einzige Produkte aus. In einer noch langsameren Reaktion bildet sich aus dem Gleichgewichtsgemisch teilweise Monowolframat und "echtes" Metawolframat (55,56,8,57), den beiden wahrscheinlich einzigen thermodynamisch stabilen Wolframaten.




Das Parawolframation-Z steht mit dem Parawolframation-B im Gleichgewicht.* Vor Bildung des sechsfach aggregierten Parawolframation-A wird noch das Vorhandensein eines tetrameren Teilchens angegeben (26,

* b. w.

27,58).

Bei stärkerem Ansäuern bis zur Azidifikation $Z = 1,5 - 1,6$ ($\text{pH} = 1-3$) entsteht das Dekawolframation ($Z^+ = 1,6$) $[\text{W}_{10}\text{O}_{32}]^{4-}$ (59,60,61,62,63,64).




Dieses Ion wurde früher auch als Metawolframation-A (5, 7,56) oder als Polywolframation-Y (7) bezeichnet. Das Dekawolframation wandelt sich über die Stufe des Pseudometawolframats (Ψ -Metawolframat) (5,11,20) sehr langsam in das "echte" Metawolframation $[\text{H}_2\text{W}_{12}\text{O}_{40}]^{6-}$ ($Z^+ = 1,5$) (7,8) um, das auch das Ergebnis aller Kristallisationsversuche dieses Säuregrades ist (Abb. 1).



Zu S. 11

* Die Bezeichnungen entsprechen einem Nomenklaturvorschlag von Kepert (6). Das Parawolframation-A wurde früher auch als Parawolframation-A₁ bezeichnet und zwischen ihm und dem Parawolframation-B noch ein weiteres Ion, das Parawolframation-A₂ angegeben (10,15). Von einigen Autoren wird das oben beschriebene Parawolframation-Z Parawolframation-B genannt (11,20).

Das Pseudometawolframat ist, so wie es bisher in der Literatur behandelt wurde, wahrscheinlich ein Gemisch verschiedener Substanzen (8). Neuerdings wird unter den Fällungsbedingungen des "Pseudometawolframats" eine neue, definierte Verbindung, das Tetraphenylphosphoniumundekawolframat ($Z^+ = 1,64$), $[(C_6H_5)_4P]_4[H_8W_{11}O_{39}]$ mit dem "Base-Säure-Verhältnis" 2:11 beschrieben (65). Dieses Salz wird nach Verfahren 5 (Kap. 1.3.) synthetisiert (s. a. Legende zu Abb. 1).



Strukturaufklärungen der angeführten Verbindungen gibt es bis jetzt nur von Parawolframat-Z (70,71,72,73, 74,75,76,77,78) und einem Dekawolframat (62,63,64).

Strukturdaten für das "echte" Metawolframation

$[H_2W_{12}O_{40}]^{6-}$ kann man dem $[PW_{12}O_{40}]^{3-}$ (79,80,81,82,83,84, 85,86) entnehmen, das als isomorph mit $[H_2W_{12}O_{40}]^{6-}$ befunden wurde. Ebenso stimmen die UV-Lösungsspektren des Metawolframat-, des Dodekawolframatophosphat- und des Wolframosilikations überein. Für das Dodekawolframosilikation wurden in wäßriger Lösung Strukturdaten bestimmt (90,69). Der tetraedrische, zentrale Hohlraum des "echten" Metawolframations enthält wahrscheinlich (ähnlich wie beim Parawolframation-Z) anstatt der Heteroatome (M_h) der Ionen $[M_h^xW_{12}O_{40}]^{(8-x)-}$ zwei Wasserstoffatome, wofür Kernresonanzmessungen (87,




Abb. 1

Legende zu Abb. 1

I. Dieses Feld enthält kurzlebige und thermodynamisch sehr instabile Zwischenprodukte, z. B. ein tetrameres Teilchen mit $Z^+ = 1,25$.

II. Dieses Feld enthält neben dem "Pseudometawolframat" noch andere Spezies, die bisher, z. B. mit Hilfe der Ramanspektroskopie, nicht nachgewiesen werden konnten, inzwischen jedoch (neben der direkten Darstellung) durch organische Kationen auch aus wäßriger Lösung gewonnen werden. So lassen sich z. B. in einem weiten pH-Bereich mit Tetraphenylphosphonium als Kation Wolframate mit dem "Base-Säure-Verhältnis"* 5:24 und 1:6 ausfällen (65).

Die Frage, ob die beiden Anionen schon in merklichen Mengen im Gleichgewicht vorhanden sind, wie z. B. das Dekawolframat in rezenten**(x = 1,6)-Lösungen, oder erst auf Grund der Schwerlöslich-

* "Base-Säure-Verhältnis": Es hat sich zur Charakterisierung, besonders von Verbindungen mit noch nicht bekannter Struktur, als geeignet erwiesen, ihr Verhältnis von (unter Umständen hypothetischem) Baseoxid zu Wolframoxid anzugeben = $M_2^I O : WO_3$.

** Unter einer rezenten Lösung versteht man eine wäßrige, frisch angesäuerte Metallatlösung.

keit der betreffenden Salze in der Lösung nachgebildet werden, ist wohl noch offen. Im Gegensatz zum Dekawolframat fallen (5:24)- und (1:6)-Wolframate erst nach längerer Zeit aus (65,66,36,69).

88) und D_2O -Austauschreaktionen (88) sprechen. Unterstützt werden diese Ergebnisse auch durch die Feststellung, daß bei der isobaren, thermischen Entwässerung nur ein H_2O -Molekül bis zum Schluß festgehalten wird (89). Sasaki et al. (91) kündigten die Veröffentlichung einer Röntgenstrukturanalyse des $[H_2W_{12}O_{40}]^{6-}$ an.

Das kristalline Natriumdekawolframat konnte, wie schon oben erwähnt, nicht durch Auskristallisierenlassen aus wäßriger Lösung (Abb. 1) gewonnen werden. Durch großen Überschuß von KCL kann man allerdings unter bestimmten Bedingungen ein mikrokristallines Kaliumdekawolframat ausfällen (60). Die Aufklärung dieses Gleichgewichtspartners ist ein Beispiel für den Weg, der heute in der Polyanionenforschung beschritten wird.

Das Ziel ist, Aussagen zu machen über die Reaktionsmechanismen im Polyanionensystem. Dies wird jedoch erst gelingen, wenn die Struktur der meisten Zwischenprodukte, von deren Existenz wir teilweise durch die angeführ-

ten physikalisch-chemischen Meßmethoden wissen, bekannt ist. Dazu benötigen wir kristalline Substanzen, die jedoch aus wäßriger Lösung, wie schon erwähnt, nur vom Parawolframat-Z und dem "echten" Metawolframat zu erhalten sind.

Inzwischen sind eine ganze Reihe neuer präparativer Methoden gefunden worden, um kristalline Polymetallate zu erzeugen. Um zu erkennen, ob es sich bei dem hergestellten Polyanion um einen Gleichgewichtspartner aus dem Ansäuerungsschema handelt, zieht man heute schwingungsspektroskopische Untersuchungen (besonders Ramanspektren), zum einen der Lösungen und zum anderen der Feststoffe, zu Rate. Es ist auch zu beachten, daß beim Auskristallisieren aus Lösungen gelöste und ausgeschiedene Teilchen unterschiedlich sein können. Auch hier dient als Entscheidungshilfe der Vergleich der Feststoffspektren mit denen der Lösungen. Früher war der Identitätsvergleich von kristallisierten Komplexen mit in Lösung befindlichen oft nur durch schwache Argumente, wie z. B. Farbgleichheit, gestützt worden (94).

1.2. Ziel der Arbeit

Um weitere Einblicke in die strukturellen Zusammenhänge in Polyanionensystemen und um Hinweise auf Reaktionsmechanismen zu erhalten, sollten Versuche ge-

macht werden, weitere kristallisierte Salze von Polyanionen zu gewinnen und deren röntgenographische Daten zu bestimmen. Außerdem sollten, besonders im Hinblick auf spektroskopische Untersuchungen (siehe auch oben Problem der kristallisierten und gelösten Salze von Polyanionen), mit Hilfe von dreidimensionalen Diffraktometerdaten die genauen Sauerstofflagen des von G. Henning und A. Hüllen (95,96) röntgenographisch untersuchten Tetrabutylammoniumhexawolframats gefunden werden. G. Henning und A. Hüllen hatten auf Grund von zweidimensionalen Röntgenfilmdaten die ungefähren Sauerstofflagen bestimmen können. Es ließen sich jedoch nur die Metallsauerstoffabstände eines einzigen Sauerstoffatoms, das sich im Zentrum eines Oktaeders aus sechs Wolframatomten befindet, errechnen. Wenn möglich sollte nun auch die vollständige Aufklärung der Struktur, d. h. zusätzlich auch die der Kationen des $[(C_4H_9)_4N]_2[W_6O_{19}]$ erfolgen.

Für die von H. Bierbüße (97,98) angefertigte Normalkoordinatenanalyse des $[W_6O_{19}]^{2-}$ -Polyions können genauere Sauerstoffkoordinaten und damit Bindungslängen Verbesserungsmöglichkeiten für die Kraftkonstanten bedeuten. Dies wird ein Vorteil sein bei der Zuordnung von Metallsauerstoffschwingungen im Hinblick auf die noch zu erforschenden sogenannten gemischten Isopoly-

anionen des Typs $[M_x^V M_{6-x}^{VI} O_{19}]^{(2+x)-}$ mit M_6O_{19} -Struktur. Die zur erwähnten Normalkoordinatenanalyse benötigten Strukturdaten wurden nämlich von den Polyanionen $[TeMo_6O_{24}]^{6-}$ (99) und $[H_6CrMo_6O_{24}]^{3-}$ (100) übernommen. Diese Anionen enthalten auch endständige und verbrückende Metallsauerstoffbindungen. In Ermangelung der eigentlichen Daten wurden die dort angegebenen für das $[Mo_6O_{19}]^{2-}$ und das $[W_6O_{19}]^{2-}$ als Berechnungsgrundlage verwendet.

Das M_6O_{19} -Anion ist von besonderem Interesse. Während sonst jedes Metall seine eigenen spezifischen Polyanionen hat, haben Niob (102), Tantal (103), Molybdän (105), Wolfram (96) und Vanadin (in "gemischten Isopolyanionen" und Isopolyanionen, die Vanadin in unterschiedlichen Wertigkeitsstufen enthalten) (91,92) Anionen des M_6O_{19} -Typs. Diese Anionen (s. Abb. 21 und Abb. 22) bieten deshalb die Möglichkeit von Vergleichen.

Weiterhin lassen sich mit genauen Daten exaktere Aussagen über die Verzerrungen der Metallsauerstoffoktaeder machen, die das wesentliche Bauelement der Polyanionen darstellen. Bei der Lösung der Atomlagen der Kationen ließen sich wiederum Aussagen über eventuelle Einwirkungen auf die Bindungen in den Anionen machen.

1.3. Darstellungsmethoden

Da aus den angesäuerten Alkali- und Ammoniumwolframat-lösungen nur das Parawolframat-Z und das "echte" Metawolframat kristallisiert werden können, mußten andere Wege gefunden werden, um Zwischenprodukte oder zusätzliche Polyanionen zu erhalten (Ausnahme: Durch K^+ -Ionenüberschuß kann Deka- (93) und "Pseudometawolframat" (11,7,93) ausgefällt werden). Seit 1960 wurde eine ganze Reihe von Darstellungverfahren entwickelt, die auch für andere Polymetallatsysteme anwendbar sind (36). Folgende präparative Methoden haben sich als geeignet erwiesen:

1. Als erste nützliche Ausgangsprodukte wurden von J. Fuchs die Metallsäureester erkannt (106). Man verseift z. B. Wolfram(VI)-säuretetraäthylester in Gegenwart einer Base durch Zugabe eines organischen Lösungsmittels, das etwas Wasser als Reagenz enthält (107,108, 109,110). Die vollständige Hydrolyse (ohne die Anwesenheit einer Base) würde zum Metalloxidhydrat führen.

Bei der Kondensation werden Zwischenstufen durchlaufen, ähnlich wie beim Ansäuern einer Metallatlösung. Durch die Anwesenheit einer Base kann jedoch das Ausfallen eines bestimmten polysauren Salzes erfolgen.

Man läßt den Ester im Überschuß, um wasserfreie Sub-

stanzen zu erhalten. Dies hat zwei Vorteile: Zum einen erhält man eindeutigere Spektren mit schmalen, schärferen Banden als von in wäßrigem Medium gefällten kristallwasserhaltigen Substanzen, zum anderen lassen sich beim Analysieren Aussagen über die im Polyion gebundenen Sauerstoffatome machen. Bei auf diesem Wege erprobten Synthesen kann man das Wasser in etwa stöchiometrischen Mengen zusetzen. Derartige Reaktionen können sogar zur Bestimmung von Wasser in organischen Lösungsmitteln dienen, z. B. die Verseifung von Orthovanadinsäure-tertiär-buthylester in Gegenwart von Ammoniak (111,112,106).

Außerdem lassen sich auf Grund dieses und der nächsten drei Verfahren durch die Abwesenheit von Wasser als Solvens auch hydrolyseempfindliche Substanzen gewinnen. (Allerdings können die entstehenden Salze manchmal anstelle von Kristallwasser organische Lösungsmittel enthalten).

2. Polysaure Salze lassen sich auch direkt durch Auflösen von Metalloxiden oder -oxidhydraten in flüssigen oder gelösten organischen Basen erhalten. Die Kristallisation läßt sich dann durch Einengen oder durch Zugabe unpolarer Lösungsmittel erreichen. Die aus organischen Lösungsmitteln erhaltenen Kristalle sind in der Regel besser auskristallisiert und damit eher für die Einkristallröntgenstrukturanalyse geeignet. Auch

gelingt die Reindarstellung polysaurer Salze aus organischen Lösungsmitteln leichter, weil Gleichgewichtsreaktionen zwischen den Polyanionen unterdrückt werden. Die Zusammensetzung der entstandenen polysauren Salze hängt von den Konzentrationsverhältnissen und von der Art der Lösungsmittel ab.

3. Durch Umsetzung anorganischer Salze in organischen Lösungsmitteln lassen sich, bei ebenfalls in organischen Solventien gelösten polysauren Salzen, die Kationen vertauschen und so z. B. polysaure Kaliumsalze, die aus wäßriger Lösung nicht erhältlich sind, herstellen.

4. Die Umsetzung von gelösten polysauren Salzen mit Metallsäureestern in Gegenwart von Spuren Wasser kann zum Aufbau höher aggregierter Polyanionen führen.

5. Die Schwerlöslichkeit polysaurer Salze mit organischem Kation in Wasser läßt sich ausnützen, indem man wäßrige, angesäuerte Metallatlösungen mit organischen Basen oder Lösungen ihrer Salze fällt. Es können bei diesem Verfahren auch Salze von Polysäuren ausgefällt werden, die in Wasser nur eine kurze Lebensdauer haben oder nur in geringen Mengen in Gleichgewichten vorliegen. Bei diesem Verfahren entstehen gewöhnlich Gemische, die sich jedoch meist mit Hilfe selektiver Lösungsmittel trennen lassen. Ein Beispiel hierfür ist

die Darstellung des Tributylammoniumdekawolframats (s. Abb. 1), das sich jedoch auch nach Verfahren 1 herstellen läßt (108).

Neben diesen Methoden besteht noch die Möglichkeit der Darstellung aus Schmelzen. Zum Beispiel läßt sich durch die Umsetzung von Nb_2O_5 bzw. Ta_2O_5 mit festem KOH und anschließendem Umfällen aus Wasser Kaliumhexaniobat und Kaliumhexatantalat präparieren (113). Hierbei entstehen kristallwasserhaltige Produkte.

1. 4. Analysenmethoden

Wolframbestimmung

Die in Wasser gelöste Substanz wird, falls nötig, mit verdünnter Salpetersäure neutralisiert (Indikator Methylorange). Das Wolfram wird mit einer Quecksilber (I)-Nitratlösung (hergestellt aus: 100 g $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$, 10 ml HNO_3 ($d = 1,2$) und 0,1 g HgO auf 0,5 l Wasser (114, 115)) als Quecksilberwolfram gefällt. Nach Spitzin unterbleibt die Zugabe von überschüssiger HNO_3 (116). Der Niederschlag wird warm filtriert und mit einer 5%igen Quecksilber(I)-Nitratlösung gewaschen, im Porzellantiegel getrocknet, verascht (Abzug) und bei 850°C geglüht (Simon-Müller-Ofen). Bei Substanzen, die organische Bestandteile z. B. in Form von Tri- oder Tetrabutylammoniumkationen enthalten, erübrigt

sich eine Fällung mit Hg(I)-Nitratlösung. Es genügt das einfache Verglühen zu WO_3 .

Ammonium- und Alkylammoniumbestimmung mit Kalignost (117, 118)

Die Probe wird in Wasser gelöst und mit Hilfe von konzentrierter Salzsäure ein pH-Wert von 2 - 2,5 (Indikatorpapier) eingestellt. Während man die 3,4%ige Kalignostlösung (Natriumtetraphenylborat, mit $\text{Al}(\text{OH})_3$ reinst geklärt) zutropft, wird die eisgekühlte Analysenlösung gerührt. Der entstandene weiße Niederschlag wird mit Hilfe eines Glasfiltertiegels (G 4) filtriert (Waschflüssigkeit: 15 ml 3,4%ige Kalignostlösung und 2,5 ml Eisessig auf 500 ml Lösung). Der Niederschlag wird bei 110°C getrocknet. Alkylammoniumsalze lassen sich nach Sporek und Williams (119) ebenfalls mit Kalignost bestimmen, jedoch wird die Fällung in diesem Fall bei einem pH-Wert von 1 durchgeführt.


N-, C- und H-Bestimmung

Die Ermittlung des Stickstoffgehalts kann auch in einer Mikrokjeldalapparatur erfolgen, die es gestattet, organisch gebundenen Stickstoff als Ammoniak zu bestimmen (120). Kohlenstoff und Wasserstoff werden durch die "Verbrennungsanalyse" in CO_2 und H_2O übergeführt und nach Absorption ausgewogen.

Bestimmungsmethode: Natrium in Natriumwolframverbindungen

Die Bestimmung des Natriums wird nach der Methode von G. Jander und D. Mojert (121) mit Hilfe einer Destillation durchgeführt. Man macht sich zunutze, daß Wolframoxidchloride im Gegensatz zu NaCl bei 600°C merklich flüchtig sind.

Die Substanz wird in einem Porzellanschiffchen einem trockenen HCl-Gasstrom ausgesetzt und dabei auf ca. 600°C erhitzt. Das Wolfram verflüchtigt sich entsprechend der nachfolgenden Reaktionsgleichung unter Bildung von gelben Wolframoxidchloriden (Beispiel: Natriummetawolframmat):



Das Natriumchlorid bleibt wägbare im Porzellanschiffchen zurück.

2. Ammoniumparawolframmat-B


Bei der Zugabe von H^+ -Ionen zu einer Alkaliwolframatlösung, die bei $\text{pH} > 10$ WO_4^{2-} -Monomere enthält (13,11), bildet sich zuallererst im Zeitraum von 5 Millisekunden ein Vorgleichgewicht von protonierten WO_4^{2-} -Ionen und zwar stellten Schwarzenbach et al. (27,122,26) bei ihren Messungen in einer Strömungsapparatur mit Glas-

elektrode fest, daß sich zwei Protonen fast in einem Schritt anlagern. Bei der Aggregation zum Parawolframat soll als Baustein allerdings nur das einfach protonierte HWO_4^- eine Rolle spielen (123,28,29). Die sich anschließenden Reaktionen benötigen mehr Zeit, die jedoch wiederum zu kurz ist, um von Kondensationsreaktionen verursacht zu sein (innerhalb einer Zehntelsekunde). Zur Einleitung der Additionsreaktionen kann man sich vorstellen, daß in einem protonierten Wolframat die Metall - Sauerstoff-Bindung so weit geschwächt wird, daß sich ein anderes WO_4^{2-} -Ion als zweizähliger Ligand anlagern kann und eine oktaedrische Sauerstoffkoordination entsteht. Schwarzenbach et al. stellten als erstes Aggregationsprodukt ein tetrameres Teilchen mit $Z^+ = 1,25$ fest, das möglicherweise folgende Formel besitzt: $[\text{HW}_4\text{O}_{12}(\text{OH})_4]^{3-}$.




Tetramere Teilchen wurden auch von Glemser und Mitarbeiter mit Relaxationsmessungen nachgewiesen (58). Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß die von Hüllen (124,125) untersuchte Substanz $\text{Li}_2\text{WO}_4 \cdot 4/7\text{H}_2\text{O}$ vierfach aggregierte Polywolframationen enthält (s. a. Kap. 4.5.2.3.). Auch von S. V. Borisov et al. (126) wurde ein Wolframat mit dem Kondensationsgrad 4 röntgenographisch aufgeklärt.


Einige Minuten nach der Säurezufuhr wird dann ein anderes Gleichgewicht gefunden (Jander et al. (12,5), Souchay (11)).



das aber nach (29,36) auch folgendermaßen geschrieben werden kann:



Andere Formulierungen in der Literatur für das Parawolframation-A sind:



Sasaki (34) konnte das Gleichgewicht (j,k) durch mathematische Analyse der bei verschiedenen Konzentrationen an Wolframat erhaltenen Kurven (Änderung des pH-Wertes mit Änderung der Azidifikation x) aufklären. Wie schon angeführt, wandelt sich das Parawolframation-A (14,13,35,11) langsam (einige Stunden) in das ebenfalls hexamere Parawolframation-B (6,67,8,36) um. Dieses aggregiert anschließend noch langsamer (einige Wochen) zum dodekameren Parawolframation-Z, mit dem es in einem reversiblen Gleichgewicht steht (67,10,21,127,56).

Die Ionen lassen sich außer durch physikalisch-chemische Methoden auch durch chemische Reaktionen unterscheiden (8,10,67,127,128,129,130). Das Parawolframation-A ist äußerst reaktionsfähig. Es läßt sich durch OH^- -Ionen sofort wieder zu WO_4^{2-} -Ionen abbauen. Die schwach saure Lösung des Parawolframation-A reagiert heftig mit H_2O_2 unter Anstieg der Azidität. Das Parawolframation-B hat diese Eigenschaft verloren. Es weist aber noch nicht die Kennzeichen der Parawolframationen-Z enthaltenden Lösungen auf: Trotz gleicher Azidifikation ist der pH-Wert von 5,5 auf ca. 8 angewachsen; Fällbarkeit der Parawolframationen-Z durch Cs^+ und Sr^{2+} ; im Gegensatz zum Parawolframation-A reagiert das Parawolframation-Z nicht mehr unter Komplexbildung mit zweiwertigen Ionen (z. B. Cu^{2+} , Cd^{2+} , Co^{2+});

Aufgrund der näheren Verwandtschaft des Parawolframation-B zum Parawolframation-A wird es für wahrscheinlich gehalten, daß sich dies auch im Aufbau zeigt.

Z. B. wird für möglich gehalten, daß es sich bei den Ionen um Strukturisomere handeln könnte, oder daß sie sich im Gehalt an Strukturwasser (in Form von OH-Gruppen) unterscheiden könnten (36). Ein erster Strukturvorschlag wurde von J. S. Anderson (131) gemacht.*

* Siehe nächste Seite

Er postulierte einen Ring aus sechs kantenverbrückten MO_6 -Oktaedern (Abb. 2 und 3**) dem die folgende Formel entsprechen würde: $[\text{H}_7\text{M}_6\text{O}_{24}]^{5-}$ ($\text{M} = \text{W}, \text{Mo}$). Tatsächlich wurden in der Zwischenzeit Strukturaufklärungen von Heteropolyverbindungen durchgeführt, die die "Andersonstruktur" zeigen. Im Mittelpunkt des Ringes befindet sich im oktaedrischen Hohlraum das Heteroatom: $(\text{NH}_4)_6[\text{TeMo}_6\text{O}_{24}] \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (132,133,99), $\text{Na}_3[\text{CrMo}_6\text{O}_{24}\text{H}_6] \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ (100), $\text{Na}_4[\text{NiW}_6\text{O}_{24}\text{H}_6] \cdot 16\text{H}_2\text{O}$ (134,135). Eine entsprechende Formel für ein Isopolywolframion würde, wie die Strukturbilder zeigen,

Zu S. 28

* Die nachfolgend diskutierten Strukturvorschläge sind aufgrund des Gesagten mit gleicher Wahrscheinlichkeit sowohl für das Parawolframion-A als auch -B anwendbar.

** Für viele Überlegungen zur Struktur und Entstehung der Polyanionen leistet die Oktaederdarstellung, bei der die Mittelpunkte der Sauerstoffatome verbunden werden, gute Dienste. Andererseits kann sie wegen mangelnder Realität in bezug auf die räumliche Erfüllung falsche Vorstellungen vermitteln, sodaß inzwischen auch oft die Darstellungsweise mit einer dichtesten Kugelpackung aus O^{2-} -Ionen gezeigt wird.




Abb. 2 Oktaeder-(Punkt-) Darstellung der "Andersonstruktur", wobei der zentrale Oktaeder, der bei den untersuchten Strukturen ein Heteroatom enthält, der Anschaulichkeit halber aus dem Ring der MO_6 -Oktaeder ($M = \text{Mn}, \text{W}$) herausgehoben ist.




Abb. 3 Darstellung der "Andersonstruktur" als Kugelmodell (dichteste Packung von Sauerstoffionen)

24 Sauerstoffatome erfordern: $[H_7W_6O_{24}]^{5-}$. Dies wird von D. L. Kepert (6) für möglich gehalten, da über den Gehalt an Strukturwasser noch keine endgültigen Aussagen gemacht werden können. Mit Hilfe der Esterhydrolyse lassen sich allerdings inzwischen Salze herstellen, die die Reaktionen des Parawolframat-A und Parawolframat-B aufweisen (136,137,138,67), deren Analyse jedoch entsprechend den Gleichungen (j) und (k) nur 21 oder 22 Sauerstoffatome ergeben. Diese Befunde widersprechen einer Struktur nach Anderson, da mit dieser Anzahl an Sauerstoffatomen ein Ringaufbau aus Ok-




Abb. 4 Oktaeder- (Punkt-) Modell des mit Hilfe
eines Kondensationsmechanismus postulier-
ten Parawolframation-A $[\text{W}_6\text{O}_{19}(\text{OH})_3]^{5-}$ (23)

taedern nicht möglich ist. Es wurde deshalb auch schon die Beteiligung von Tetraedern diskutiert (67).

Eine weitere Voraussage für die Struktur des Parawolframation-A stammt von K.-H. Tytko und O. Glemser (28, 29) unter Verwendung von möglichen, in der angesäuerten Lösung vorhandenen, Bausteinen. Der Kondensationsmechanismus wird aufgrund von Abschätzungen über Energieschwellen, -gewinne und sterischen Hinderungen postuliert (Abb. 4 und 5).





Abb. 5 Kugelmodell des mit Hilfe eines Kondensationsmechanismus postulierten Parawolframation-A (23)

Auch hier läßt sich die Weiterentwicklung zum Parawolframation-Z nicht zwanglos deuten.

Eine Strukturaufklärung des Parawolframation-A und -B wird wahrscheinlich nur durch eine Röntgenstrukturanalyse möglich sein, weshalb die Darstellung von geeigneten Einkristallen von großer Wichtigkeit ist. Wie schon erwähnt, lassen sich mit der Methode der Esterhydrolyse Salze der beiden, aus wäßriger Lösung nicht zu gewinnenden, Ionen erzeugen (67,136,137). Für das

Parawolframation-A wird als Base z. B. Pyridin und Piperidin verwendet. Mit Piperidin ist es inzwischen gelungen (137,140, Verfahren 2, Kap. 1.3.), Einkristalle zu erzeugen, die für eine röntgenographische Strukturuntersuchung geeignet erscheinen.

Salze, die die Eigenschaften des Parawolframation-B haben, ließen sich entsprechend dem Verfahren 1 (Kap. 1.3.) herstellen: 100 cm³ Esterlösung (8g WO(OCH₃)₄ in 500 ml abs. Äthanol) wurden mit 30 cm³ einer gesättigten äthanolischen Lösung von Ammoniumacetat versetzt. Die Zugabe des zur Esterhydrolyse benötigten H₂O geschah anfangs in Form einer an Wasser 1%igen äthanolischen Lösung. Die Ausfällung verlief über mehrere Stunden, sodaß getrennte Niederschläge abgefangen werden konnten, wobei die jeweils letzte Fraktion die größte Einheitlichkeit zeigte (IR-Spektrum). Die Niederschläge wurden mit Äthanol und Äther gewaschen und dann 48 Std. über P₄O₁₀ getrocknet. Die Analyse derart hergestellter Substanz ergab eine Bestätigung für das "Base-Säure-Verhältnis" von 1 : 2,4.



Die entstandene Verbindung war jedoch amorph. Um den Entstehungsprozeß zu verlangsamen, wurde mit an H₂O




Abb. IR-Spektrum: Ammoniumparawolframat-B

Aufnahmegerät: Beckmann IR-12; gemürsert,
CsBr-Preßling.

Bei $3000 \text{ [cm}^{-1}]$ liegen Valenzschwingungen der NH_4^+ -Ionen und überdecken die Valenzschwingungen von OH-Gruppen, bei $1625 \text{ [cm}^{-1}]$ $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ und bei $1400 \text{ [cm}^{-1}]$ $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ Winkeldeformationsschwingungen. Die Banden unterhalb $1000 \text{ [cm}^{-1}]$ gehören zum Bereich der Metallsauerstoff- (Valenz- und Deformations-) und Metallschwingungen. Das Spektrum zeigt gewisse Parallelen zu dem des Parawolframat-A (36). Auch hier liegt die energiereichste Metallsauerstoffbande in einem Bereich, der für das Vorliegen von zwei freien Ecken (2 terminale Sauerstoffatome) pro Oktaeder spricht (s. a. Anhang: Schwingungsfrequenzen der Polywolframate in IR- und Ramanspektren).

verdünnteren Alkohollösungen gearbeitet, die außerdem nur sehr langsam zutropften. Zuletzt wurde ganz auf die aktive Zugabe von H_2O verzichtet und die benötigte Menge allmählich durch den Kontakt mit Luftfeuchtigkeit zugeführt. Diese, wie auch Versuche durch Umkristallisation oder durch Zugabe anderer Lösungsmittel ein kristallines Produkt zu erhalten, brachten keinen Erfolg. Wahrscheinlich wird dies erst gelingen, wenn sich Salze des Parawolframat-B mit organischen Kationen erzeugen lassen. Das IR-Spektrum des $(NH_4)_5 [H_3W_6O_{22}]$ zeigt die Abb. 6.


3. Bestimmung der Gittergeometrie an Einkristallen des Tributylammonium(5:24)-Wolframats

3.1. Einführung

Bei der Verseifung von Wolframsäureestern mit unterschiedlichen Alkylammoniumbasen entstanden oft Polywolframate mit unterschiedlichem "Base-Säure-Verhältnis". So ergab z. B. die Reaktion mit Tetraalkylammoniumbasen (1:6)-Salze und mit Trialkylammoniumbasen (1:5)-Salze (108,109,110). Die Tatsache führte zu der Annahme, daß die Wahl des eingesetzten Kations auf die Lage von Anionengleichgewichten Einfluß ausübt, indem durch sie selektiv schwerlösliche Salze entstehen und zwar auch solche, die zuvor mit Alkalimetallionen

nicht erhalten werden konnten.

Bei der Untersuchung, ob sich dieser Effekt auch in wäßriger Lösung ausnutzen ließe, wurden Lösungen der Azidifikation $x = 1,5$ Trialkylammoniumbasen zugesetzt (141,142). Mit "rezenten" Lösungen ergaben sich wiederum Salze mit dem "Base-Säure-Verhältnis" 1 : 5, d. h. Salze mit dem Dekawolframation. Bei der Verwendung von Natriummetawolframatlösungen (entsprechend gealterten Lösungen der Azidifikation $x = 1,5$) entstand ein neues Salz. Nach dem Umkristallisieren aus Methanol ließ sich ein Wolframat mit dem Aggregationsgrad 12 (Ultrazentrifuge (142)) und dem "Base-Säure-Verhältnis" 5 : 24 analysieren. Die formale Bildungsgleichung des Anions lautet ($Z^+ = 1,58$):



3.2. Darstellung von Einkristallen des Tributylammonium(5:24)-Wolframats.

Das Tributylammonium(5:24)-Wolframat läßt sich nach Verfahren 5 (s. Kap. 1.3.) herstellen (141). Zu einer etwa 0,7 molaren wäßrigen Tri-n-butylammoniumacetatlösung (pH = 7, aus 9,25 g Tri-n-butylamin und 3 g Eisessig) tropft man langsam (sonst erfolgt die Bildung öligere Produkte) unter Rühren (Dreihalskolben mit

KPG-Rührer) eine Lösung von "echtem" Natriummetawolframat (Verhältnis 14,15 g in 50 ml H_2O , hergestellt nach Schott und Harzdorf (89) (s. Anhang: Experimentelles)). Das entstandene amorphe, weiße Produkt wird mit Wasser gewaschen und an der Luft getrocknet. Anschließend erfolgt mehrfache Umkristallisation in Methanol (das Produkt ist außerdem noch löslich in Äthanol, Aceton und etwas in Chloroform).

Gut gewachsene Einkristalle ließen sich am besten durch langsames Eindunsten (über mehrere Wochen) einer methanolischen Lösung des Tributylammonium(5:24)-Wolframats erzeugen.

3.3. Fragen zur möglichen Struktur des Tributylammonium(5:24)-Wolframats

Die Verbindung zeigt große Ähnlichkeit mit dem "echten" Metawolframat. So entspricht das UV-Spektrum der methanolischen Lösung des Tributylammoniumsalzes dem UV-Spektrum der wäßrigen Lösung des "echten" Metawolframats (142). Das IR- und Ramanspektrum zeigen die Abb. 7 und 8. Das "echte" Metawolframat enthält nach M. T. Pope und G. M. Varga jr. (88) im tetraedrischen Hohlraum zwei Wasserstoffatome, die jeweils von zwei Sauerstoffatomen koordiniert sind. Das "echte" Metawolframat-
ion läßt sich deshalb statt als $[H_2W_{12}O_{40}]^{6-}$ - auch als




Abb. 7 IR-Spektrum des kristallinen Tributylammonium-(5:24)-Wolframats; Gerät Beckmann IR-12; CsBr-Preßling; weiterer Text s. o.




Abb. 8 Raman-Spektrum des kristallinen Tributylammonium-(5:24)-Wolframats; Gerät Cary 82 (Krypton-Laser 6471 [Å], Leistung an der Probe 400 mW; sensitivity: a = 20000, b = 5000, c = 2000 CTS/SEC; weiterer Text s. o.

Text zu Abb. 7 und Abb. 8

Das IR- und Ramanspektrum des $[\text{HN}(\text{C}_4\text{H}_9)_3]_5[\text{H}_3\text{W}_{12}\text{O}_{40}]$ ist schon besprochen worden (36), wobei die Übereinstimmung beim IR-Spektrum gut ist und beim Ramanspektrum Abweichungen bis 12 Wellenzahlen existieren. Die Bande bei 976 und die Schulter bei 959 (Ra), sowie die Schulter bei 952 und die Bande bei 936 (IR) $[\text{cm}^{-1}]$ sind Schwingungen endständiger Sauerstoffatome zuzuordnen. Die Banden 892 (Ra) und 873 (IR) $[\text{cm}^{-1}]$ sind durch $\text{W}-\text{O}-\text{W}$ -Brücken (mit einem Winkel nahe bei 180°) verursacht. Die Schwingungen mit den Wellenzahlen 793 (Ra) und 775 (IR) $[\text{cm}^{-1}]$ sind auf Schwingungen kantenverbrückender Sauerstoffatome zurückzuführen. Die Schulter bei 975 (IR) $[\text{cm}^{-1}]$ resultiert wahrscheinlich aus einer geringen Verunreinigung an Hexawolframat, das bei dieser Frequenz eine sehr starke Bande hat (F_{1u} , ungleichphasige Schwingung der terminalen Sauerstoffatome). Schwingungen des Wassers (Valenz- (ν_{as} und ν_{s}) und Deformationsschwingungen δ) finden sich bei 3440 und 1635 (IR) $[\text{cm}^{-1}]$. Die Banden bei 3000 und bei 1450 (IR) $[\text{cm}^{-1}]$ sind dem Kation zuzuordnen. Die Spektren sind denen des "echten" Metawolframats mit Banden bei 976, 960, 935, 880 (Ra) und 960, 936, 885, 780 (IR) $[\text{cm}^{-1}]$ sehr ähnlich.

$[W_{12}O_{38}(OH)_2]^{6-}$ -Ion formulieren. Wenn man davon ausgeht, daß es sich beim (5:24)-Wolframation um ein "echtes" Metawolframation handelt, bei dem ein zusätzliches Wasserstoffatom an- oder eingebaut ist, kann man die Formel $[H_3W_{12}O_{40}]^{5-}$ auch als $[HW_{12}O_{38}(OH)_2]^{5-}$ angeben. Man bringt damit zum Ausdruck, daß es im (5:24)-Wolframation unterschiedlich gebundene Wasserstoffatome gibt.

Zur Untersuchung dieses Sachverhalts sind PMR-Messungen an einer Lösung von Tributylammonium(5:24)-Wolframat in Dimethylsulfoxid im Vergleich mit einer solchen des "echten" Natriummetawolframats durchgeführt worden (143). Die Messung zeigte beim Metawolframation zwei Wasserstoffatome (6,8ppm), wie schon oben erwähnt (88), die nicht abbaubar im Innern des Moleküls lokalisiert sind. Beim (5:24)-Wolframation entstand an gleicher Stelle ein Signal, das durch drei Protonen verursacht wurde. Bei Zugabe von D_2O wurde das Signal geschwächt, sodaß es anschließend (auch nach längerer Zeit) zwei Protonen entsprach.

Dieses Ergebnis spricht zusammen mit den spektroskopischen Untersuchungen dafür, daß das (5:24)-Wolframation eine dem "echten" Metawolframation zumindest nah verwandte Struktur mit einem zusätzlichen, peripheren und austauschbaren Wasserstoffatom besitzt.

Erstaunlich ist nur, daß dieses H-Atom ein Signal an gleicher Stelle ergibt, wie die beiden im Inneren fixierten Wasserstoffatome.

Bei den Heterowolframaten mit Kegginstruktur (Abb. 9 und 10) sind inzwischen auch Isomere entdeckt worden.

So gibt es neben einem α -Silikowolframation,

$[\alpha\text{-SiW}_{12}\text{O}_{40}]^{4-}$ mit Kegginstruktur ein geometrisches Isomeres, das β -Silikowolframation. Gegenüber der Kegginstruktur ist hier eine Oktaederdreiergruppe um 60 [Grad] gedreht (Abb. 11) (144). Insgesamt sind auf diese Weise theoretisch fünf Isomere denkbar (145). Eine Struktur, bei der alle vier Oktaederdreiergruppen gedreht sind, existiert mit dem $[\text{Al}_{13}\text{O}_4(\text{OH})_{25}(\text{H}_2\text{O})_{11}](\text{SO}_4)_3 \cdot 16\text{H}_2\text{O}$, wobei hier eines der Aluminiumatome den zentralen tetraedrischen Hohlraum besetzt (145). Zum β -Silikowolframat ist allerdings zu sagen, daß es sich nur ausgehend vom WO_4^{2-} -Ion herstellen läßt und nicht durch eine nachträgliche Umwandlung des α -Silikowolframations.

Gegenwärtig muß als Erklärung für die Entstehung des (5:24)-Wolframats, d. h. eines protonierten Polyanions, der hohe Raumbedarf der organischen Kationen angesehen werden (31). Wohl nur eine Röntgenstrukturanalyse kann zur Klärung der tatsächlichen Struktur führen. Die folgende Gitterparameterbestimmung soll eine der Grundlagen dazu liefern.




Abb. 9 Oktaeder-(Punkt-) Modell der Kegginstruktur
 $([XW_{12}O_{40}]^{6-}, X = H_2, P, Si \text{ usw.})$




Abb. 10 Kugelmodell der Kegginstruktur (dichteste
 Kugelpackung aus Sauerstoffionen)




Abb. 11 Modell eines Isomeren der Kegginstruktur;
eine Dreiergruppe ist um 60 [Grad] gedreht.

3.4. Bestimmung der Zellparameter

3.4.1. Grundlagen

Prinzipiell verläuft die Lösung einer Röntgenstrukturanalyse in zwei Hauptschritten. Im ersten wird die Lage der Reflexe ausgewertet, um Aufschluß über die Geometrie der Elementarzelle zu erhalten (Gitterkonstanten, Zellinhalt, Kristallsystem, Raumgruppe, Zahl der Moleküle pro Elementarzelle). Im zweiten lassen sich mit Hilfe der Intensitäten der Reflexe die Lagen

der Atome in der Elementarzelle errechnen. Erklärungen zum ersten Teil werden im folgenden gegeben.

Beim Vorliegen von Einkristallen werden meist Filmaufnahmen mit der Weißenberg- und/oder der Precession-Kamera angefertigt. Dazu wird ein geeigneter Einkristall an der Spitze einer Glasnadel auf einen Goniometerkopf montiert. Im Falle der Weißenbergkamera wird dieser, entsprechend der zentralen Achse des waagerechten zylinderförmigen Filmes, im Gerät befestigt. Die Einstrahlung des monochromatischen Röntgenstrahles geschieht senkrecht dazu. Da man bei der Montage des Kristalls schon eine optische Justierung vornimmt, erhält man zu Beginn ein mehr oder weniger gewelltes Reflexlinienmuster, das den einzelnen Schichtlinien entspricht. Eine genaue Justierung mit Hilfe der Goniometerkopfschaukeln soll bewirken, daß die Filmaufnahmen anschließend parallele, gerade Reflexlinien aufweisen (Drehkristallaufnahmen).

Die Erzeugung der einzelnen Punkte gehorcht der Bragg'schen Gleichung

$$n \cdot \lambda = 2d \sin \vartheta \quad (G 1)$$

und aus den Abständen der Schichtlinien läßt sich die direkte Gitterkonstante der justierten Achse berechnen.

Um die auf einer Schichtlinie sitzenden Reflexe einer Gitterebene weiter aufzulösen, bewegt man, gekoppelt mit dem sich drehenden Kristall, den Filmzylinder parallel zur zentralen Achse. Die anderen Schichtlinien werden hierbei ausgeblendet. Die Reflexe einer Schicht sind jetzt auf dem Film in Form von Geraden und gekrümmten Punktreihen verteilt. Die Auswertung dieser "Weißenbergaufnahmen" erfolgt mit Gleichungen, die durch die Geometrie der Aufnahmetechnik bedingt sind. Auf diese Weise lassen sich alle Achsen und Winkel berechnen. Besonders geeignet für die Ermittlung genauer Daten sind hochindizierte Reflexe, die gegebenenfalls noch nach $K\alpha_1$ und $K\alpha_2$ aufgelöst sind.

Im Gegensatz zu Weißenbergaufnahmen erfordert die Betrachtung der Precession-Aufnahmen keine besondere Interpretation. Bei ihnen entsteht, bedingt durch die Aufnahmetechnik, ein direktes Bild der reziproken Niveaus. Beide Methoden wurden zur Messung der Zellparameter des Tributylammonium(5:24)-Wolframats herangezogen (61).

3.4.2. Praktische Durchführung

Zur Vermessung kamen zwei Einkristalle mit unterschiedlichem Habitus. Als erste Gitterkonstante ließ sich aus Drehkristallaufnahmen die längste Achse (c-Achse) mit

27,61 [Å] als Mittelwert aus 11 Einzelmessungen gewinnen. Die gleiche Achse wurde aus Precession-Aufnahmen zu 27,64 [Å] bestimmt. Bei dieser Aufnahmeart ergab sich auch direkt, daß hier ein rechtwinkliges Koordinatenkreuz vorlag. Die beiden Achsen a und b wurden berechnet zu $a = 13,79$ und $b = 25,48$ [Å], während sich aus Weißenbergschichtaufnahmen $a = 13,76$ und $b = 25,45$ [Å] ergaben.

Mit den 2 Θ -Werten von 50 Reflexen, die hauptsächlich hoch indiziert waren, wurde eine Verfeinerung mit dem Programm "PARAM" durchgeführt. Die endgültigen Werte lauten:

$$\begin{aligned}a &= 13,797 \pm 0,001 \text{ [Å]} \\b &= 25,561 \pm 0,015 \text{ " } \\c &= 27,626 \pm 0,005 \text{ " } \\\alpha = \beta = \gamma &= 90 \text{ [Grad]}\end{aligned}$$

Das Volumen der Elementarzelle ergab sich dann zu:

$$V = 9742,7 \text{ [Å]}^3$$

Das Kristallsystem ist orthorhombisch.

Zur Bestimmung der Zahl der Moleküle pro Elementarzelle wird die Dichte benötigt. Ein mit Wasser gefülltes Pyknometer wurde mit und ohne Substanz ausgewogen. Um den Einschluß von kleinsten Luftbläschen zu vermeiden, wurde zur Verbesserung der Benet-

zungsfähigkeit des Wassers ein Entspannungsmittel zugesetzt, was besonders wichtig war, da für diese Messung nur ca. 20 mg Substanz zur Verfügung standen.

Die Berechnung ergab:

$$\rho = 2,47 \text{ [g/cm}^3\text{]}$$

Mit diesem durch Messung gewonnenen Wert ließ sich die Zahl der Moleküle pro Elementarzelle nach der folgenden Formel ermitteln:

$$Z = \frac{V_{EZ} \cdot \rho \cdot L}{M} \quad (G\ 2)$$

Z = Zahl der Moleküle pro Elementarzelle

V_{EZ} = Volumen der Elementarzelle

L = Loschmidt'sche Zahl

M = Molekulargewicht

Es ergab sich für Z ein Wert nahe bei vier, d. h. die Elementarzelle beinhaltet vier Moleküle. Mit dem Wert $Z = 4$ ließ sich jetzt umgekehrt die genaue Dichte, D_x (röntgenographische Dichte) berechnen:

$$D_x = 2,579 \text{ [g/cm}^3\text{]}$$

Zur Berücksichtigung der Absorption wurde der lineare Absorptionskoeffizient, der bei dieser Verbindung durch den hohen Massenabsorptionskoeffizienten des Wolframs

bestimmt wird, unter Berücksichtigung der Masseanteile der einzelnen Atomsorten berechnet:

$$\mu_{(\text{CuK}\alpha)} = 266,4 \text{ [cm}^{-1}\text{]}$$

Um die Raumgruppe zu bestimmen wurden zusätzlich 60 h lang belichtete Precession-Aufnahmen angefertigt. Die Auswertung bezüglich der Auslöschungen ergab 2 mögliche Raumgruppen:

Pna2 ₁	No 33	Int. Tables (147)
nicht zentrosymmetrisch		
oder Pnma	No 62	
zentrosymmetrisch		

Eine spätere Strukturaufklärung wird neben den zu erwartenden großen Strukturelementen eine große Anzahl von Reflexen zu verarbeiten haben, wie man aus der Grösse der Elementarzelle mit ca. $10^4 \text{ [Å}^3\text{]}$ ableiten kann.

4. Die Struktur des Tetrabutylammoniumhexawolframats

Durch den Vergleich der Ramanspektren des festen Tetrabutylammoniumhexawolframats mit den Ramanspektren wäßriger Wolframatlösungen unterschiedlicher pH-Werte und unterschiedlichen Alters konnte bisher die Existenz des Hexawolframations $[W_6O_{19}]^{2-}$ in wäßriger Lösung nicht nachgewiesen werden. In neuerer Zeit (65,66) gelang es jedoch, ein (1:6)-Wolframat aus wäßriger Lösung mit Hilfe des großen Tetraphenylphosphoniumkations auszufällen (s. Text zu Abb. 1).

4.1. Herstellung des Untersuchungsmaterials

4.1.1. Darstellung des Tetrabutylammoniumhexawolframats

Die formale Bildungsgleichung des $W_6O_{19}^{2-}$ -Ions ($Z^+ = 1,66$) lautet:




Das Tetrabutylammoniumhexawolframat, $[N(C_4H_9)_4]_2[W_6O_{19}]$, läßt sich nach Verfahren 1 (s. Kap.1.3.) (106, 108,109,110,67) herstellen. Zu einer Lösung von Tetra-n-butylammoniumhydroxid in Methanol/Isopropanol (3:1), die eine stöchiometrische Menge Wasser enthält, wird eine äthanolische Lösung von Wolfram(VI)säuretetra-

methylester, $\text{WO}(\text{OCH}_3)_4$ gegeben (Darstellung der Ausgangssubstanzen s. Anhang: Experimentelles). Es fällt ein weißes feinkristallines Salz aus. Das zur Umsetzung benötigte Wasser kann auch allmählich im Kontakt mit feuchter Luft zugeführt werden.

Die Analyse der entstandenen Verbindung zeigt ein "Base-Säure-Verhältnis" von 1 : 6. Wie aus Molekulargewichtsbestimmungen mit der Ultrazentrifuge hervorgeht, beträgt der Kondensationsgrad 6.

Die Reaktionsgleichung lautet:



Eine weitere Darstellungsmethode (148) geht von einer methanolischen Lösung von Natriumwolframat aus. Es wird in der Wärme bis zur Azidifikation $x = 1,7$ HCl-Gas eingeleitet und anschließend wird die Lösung mit Tetrabutylammoniumbromid versetzt. Es bildet sich ein weißer Niederschlag des gewünschten Produkts, der umkristallisiert wird.

Das Tetrabutylammoniumhexawolframat ist unlöslich in Wasser, Säuren, Dioxan, Tetrahydrofuran, Äther und Tetrachlorkohlenstoff, jedoch löslich in Aceton, Acetonitril, N,N-Dimethylformamid und N,N-Dimethylacetamid.

4.1.2. Herstellung von Einkristallkugeln

Das nach dem ersten Verfahren hergestellte Produkt wurde aus Aceton umkristallisiert. Auch zur Erzeugung von Einkristallen eignete sich am besten eine acetone Lösung des Tetrabutylammoniumhexawolframats, die über mehrere Wochen hinweg langsam, kontinuierlich eingeengt wurde. Die entstandenen klaren, farblosen Einkristalle enthielten jedoch zu etwa 80% kleine Störungen, meist an der Keimstelle, d. h. im Innersten des entstandenen Kristalls. Zur Weiterverarbeitung wurden deshalb die einwandfrei gewachsenen unter dem Mikroskop ausgelesen. Es zeigte sich unter dem Polarisationsmikroskop, daß neben zu beobachtenden Verwachsungen jedoch keine Zwillingsbildung wie beim entsprechenden Molybdat auftrat. Zur weiteren Identifizierung wurden ein IR-Spektrum (108,97,98) und Röntgenaufnahmen mit der Weissenbergkamera (Nonius) angefertigt.

Die Auswertung der Drehkristall- und Weissenberggoniometeraufnahmen ergab das schon bekannte triklin Gitter (95,96). Die Daten für Achsen und Winkel konnten später noch wesentlich verbessert werden (s. u. Aufnahmen mit dem AED). Außerdem wurde eine andere Aufstellung des Gitters gewählt. Für die Weissenbergaufnahmen wurde Überwiegend, wie auch für die späteren

Messungen (hier ausschließlich) am automatischen Einkristalldiffraktometer (AED), $\text{Cu}_{K\alpha}$ -Strahlung (Ni-Filter) verwendet, mit der man ohne Überlagerung im Meßbereich eine ausreichende Anzahl der Reflexe erhält. Der Nachteil einer hohen Absorption fällt hier nicht ins Gewicht, da sich diese durch die Herstellung von Einkristallkugeln rechnerisch voll berücksichtigen läßt.

Einkristallkugeln wurden entsprechend der Beziehungen

$$I \sim \frac{4}{3} \pi r^3 \rho e^{-\mu r} \quad (156) \quad (G \ 3)$$

und $\mu \cdot R \leq 2 \quad (155) \quad (G \ 4)$

μ = linearer Absorptionskoeffizient

mit Durchmessern hergestellt, die günstige Intensitätsausbeuten erwarten ließen. Zur Reflexvermessung auf dem AED wurde schließlich eine Kugel mit dem Durchmesser von $0,0105 \text{ [cm]}$ verwandt ($\mu \cdot R = 1,376$). Einwandfrei klare Einkristalle (ca. $0,2 \text{ [cm]}$ Kantenlänge) wurden zuerst mechanisch annähernd rund geschliffen, dann wurde weitere Oberfläche mit Hilfe von Lösungsmitteln abgelöst (95). Der mechanische Schleifvorgang wurde in einer zylinderförmigen, mit Sandpapier ausgekleideten Zelle durchgeführt, in der der Kristall, durch einen Preßluftstrom getrieben, kreis-

förmig herumwirbelte. Der dann $d \sim 0,05$ [cm] große Kristall wies eine bucklige und sehr raue Oberfläche auf. Das weitere Entfernen der Oberfläche geschah unter dem Mikroskop in der Vertiefung eines Objektträgers zuerst mit Aceton. Von Vorteil ist hierbei, daß sich große Krümmungen (d. h. kleinere Radien) schneller lösen. Anisotropes Lösen in unterschiedlichen Kristallrichtungen wird durch diesen Effekt übertroffen, sodaß bei fortschreitendem Lösen die Einkristallkugel immer gleichmäßiger wurde. Allerdings mußte sie mit Hilfe eines Glasfadens in ständiger Bewegung gehalten werden, da andernfalls durch unterschiedliche Konzentration an gelöster Substanz sofort unterschiedliches Lösungsverhalten resultierte. Als die Kugel gegenüber der gewünschten Größe noch etwa das doppelte Volumen aufwies, wurde das Lösungsbad verändert, indem die Kugel in Gemische Äthanol/Aceton überführt wurde, wobei sich der Anteil an Äthanol laufend erhöhte. So konnte der Lösungsvorgang, der sich mit kleiner werdendem Radius im gleichen Lösungsmittel schnell verstärkt, verzögert werden, da, wie schon erwähnt, das TBA-Hexawolframat in Äthanol unlöslich ist.

Anschließend wurde die Einkristallkugel auf einem Mikrolineal vermessen und mit Hilfe von Kollodium (löslich in Äthanol) auf dem Glasfaden eines Goniometerkopfes befestigt.

Da aufgrund der kugeligen Gestalt die Kristallachsen zufällig ausgerichtet waren und die Schaukeln des Goniometerkopfes Winkel nur bis zu einem gewissen Maße ausgleichen können, wurde mehrfaches Ablösen und Wiederbefestigen notwendig. Wegen der schwierigen Handhabung (kleine Größe, Kugelform) und der unkontrollierbaren statischen Aufladung (entgegengesetzt zur Umgebung) trat ein Verlust von ca. 20 präparierten Kugeln ein, bevor die anschließend auf dem AED vermessene, einwandfrei runde (Fehler $\leq 0,002$ [mm] $\leq 2\%$) Einkristallkugel auf dem Goniometerkopf justiert war.

4.2. Methodik der Röntgenstrukturbestimmung

4.2.1. Zur Intensitätsmessung mit Hilfe des AED's

Nach der Ermittlung der Gitterdaten aus der geometrischen Verteilung der Reflexe auf dem Filmmaterial erfolgt die Vermessung der Intensitäten der Reflexe und daraus die Berechnung der Atomparameter. Zum einen existiert die Möglichkeit der Auswertung von Filmaufnahmen. Es werden z. B. mit der Weißenbergkamera integrierte Schichtaufnahmen hergestellt und die indizierten Reflexe mit Hilfe eines Mikrodensitometers vermessen. Zum anderen lassen sich die Intensitäten von Reflexen mit einem Szintillationszählrohr aufnehmen. Dies geschieht in dem schon erwähnten AED. Der

Vorteil gegenüber den Filmmethoden der herkömmlichen Art ist eine genauere Messung der Intensitäten und, vor allem bei Strukturen mit vielen Reflexen, eine Verkürzung der Gesamtmeßzeit, besonders wenn es sich - nicht jedoch im vorliegenden Fall - um ein on-line-Gerät (gekoppelt mit einem Prozeßleitrechner) handelt.

Der auf dem Goniometerkopf befestigte Einkristall wird in der offenen Eulerwiege des AED's befestigt, justiert und dann mit Hilfe der vier Kreise des verwendeten Geräts (Hersteller: Siemens, nach Prof. Dr. W. Hoppe) in Reflexionsstellung gebracht. Es sind dies die drei Euler'schen Winkel Θ, Φ, χ und der Winkel 2Θ des Detektors (gleiche Ebene wie der Θ -Kreis). Die Steuerbefehle für die Fahrstrecken werden mit Hilfe der Programme AED 5 und 8 (158) (zuerst auf einer externen Rechenmaschine des Typs Siemens 2002, dann auf einem Prozeßrechner PDP 15 berechnet und auf einem "Eingabelochstreifen" (ELS) verschlüsselt. Dieses Programm benötigt die genauen Gitterkonstanten, die mit der differenziellen Abtastung auf dem AED sehr genau vermessen werden können, und die "Reflexflankenstrecken" $\Delta\Theta_1$ und $\Delta\Theta_2$.

Die Intensitätsmessung beginnt nun mit dem Anfahren des Zentrums des Reflexes. Eine kurze Bestrahlung stellt fest, ob die Intensität des Reflexes den linearen Be-

reich des Detektors (Totzeiten) überschreitet und evtl. die Einschaltung eines Filters in den Strahlengang notwendig macht. Außerdem erfolgt hierbei die Festlegung der Höchstmeßzeit pro hundertstel Grad.

Anschließend wird das Reflexprofil in einer sog. Fünf-Wert-Messung abgefahren (2θ -scan). Die (relative) Gesamtintensität ergibt sich aus

$$I_{\text{rel}} = I_1 + I_3 + I_5 - I_2 - I_4 \quad (\text{G } 5)$$

wozu entsprechend die Meßzeiten t_1 bis t_5 gehören. Vom berechneten Maximum des Reflexes fährt das Gerät in hundertstel Graden zum Ende der unteren Flankenstrecke (I_1, t_1) wo der Untergrund gemessen wird (I_2, t_2). Anschließend bewegt sich die Messung über den ganzen Reflex zum Ende der oberen Flankenstrecke (I_3, t_3), dann Untergrundmessung (I_4, t_4) und zurück zum Maximum (I_5, t_5). Der Reflex wird also zweimal vermessen, wobei die Zeiten für die Untergrundmessungen

$$t_2 + t_4 = t_1 + t_3 + t_5 \quad (\text{G } 6)$$

sind. Die Intensitäten und Filter werden auf einem Ausgabelochstreifen vermerkt. Anschließend fährt das AED den nächsten Reflex an und mißt ihn in gleicher Weise.

Um die Intensitäten der Reflexe gegeneinander gewichten zu können, wird nach einer Reihe von Messungen die Überprüfung eines Referenzreflexes wiederholt. Zur Feststellung von möglicher Dejustierung wird in gewissen Abständen eine Messung mit Halbblenden eingeschoben. Der einwandfreie mechanische Lauf läßt sich testen, indem das Gerät nach einer vorgegebenen Anzahl von Reflexen in allen Kreisen zur Nullpunktskontrolle zurückläuft.

Nach Beendigung der Messungen werden die Intensitäten des Ausgabelochstreifens "ALS" mit dem gleichnamigen Programm (159) (auf Siemens 2002) ausgewertet.

Man hat anschließend für jeden Reflex eine Lochkarte zur Verfügung, die die Indizes h, k, l, die gegen den Referenzreflex korrigierte relative Intensität und deren Fehler σ_I enthält (im Format der nachfolgenden Rechenprogramme).

$$\sigma_I = \left[I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + k^2(I_1 + I_3 + I_5 - I_2 - I_4)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (G 7)$$

$$k = 3\%$$

4.2.2. Theorie zur Röntgenstrukturanalyse

Um die Lage eines Atoms anzugeben, verwendet man die Koordinaten des Zentrums des Atomkerns. Die Informationen, die man durch die Intensitäten der Reflexe erhält, sind jedoch durch die Streuung der Elektronenhülle verursacht. Eine Berechnung mit Hilfe der Intensitäten wird also eine Elektronendichteverteilung in der Elementarzelle liefern und hierdurch indirekt die Atomlagen. Da man so die Kristallstruktur als periodische Verteilung von Elektronen auffaßt, läßt sich die Elektronendichte als dreidimensionale Fourierreihe darstellen.

$$\rho_{xyz} = \frac{1}{V} \sum_{h=-\infty}^{+\infty} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} F_{hkl} \cdot e^{-2\pi i(hx+ky+lz)} \quad (G 8)$$

ρ = Elektronendichte

V = Volumen der Elementarzelle

F = Strukturfaktor

Die Elektronenverteilung um ein Atom (kugelsymmetr.) wird durch den Atomformfaktor f berücksichtigt, der mit wachsendem $\sin \Theta / \lambda$ abnimmt. Hiermit läßt sich der Strukturfaktor über N Atome der Elementarzelle berechnen:

$$F = \sum_{n=1}^N f_n e^{-2\pi i(hx_n+ky_n+lz_n)} \quad (G 9)$$

Wenn die Frequenz des einfallenden Röntgenstrahls in der Nähe der Absorptionsfrequenz liegt, tritt ein "anomaler" Phasenwechsel auf, die sog. anomale Dispersion (160). Besonders die schwereren Atome sind davon betroffen. Sie hängt praktisch nicht vom Beugungswinkel, jedoch von der verwendeten Röntgenstrahlung ab. Der Atomformfaktor erhält durch die anomale Dispersion einen realen ($\Delta f'$) und einen imaginären Summanden ($\Delta f''$), wobei der Realteil gewöhnlich negativ ist.

$$f_{a.D.} = f + \Delta f' + \Delta f'' \quad (G10)$$

Man benötigt den Strukturfaktor hinsichtlich Amplitude und Phase. Der Zusammenhang zwischen Intensität und Strukturfaktor lautet:

$$|F|^2 \sim I \quad (G11)$$

Es läßt sich also mit dem gewonnenen Datenmaterial der Strukturfaktor $|F|$, nicht jedoch seine Phase bestimmen. Zur Lösung des Phasenproblems sind verschiedene Möglichkeiten entwickelt worden, z. B. können schon Strukturvorstellungen vorliegen, die für eine Differenzfouriersynthese (s. u.) ausreichen oder sog. direkte Methoden; oder man fertigt eine Pattersonsynthese an, die dann mit "vector shift"-, (Superpositions-), Harkersymmetrie-, Schweratom- und "trial and error"-Methode (161,162) oder

deren Kombinationen zu den Atomparametern führen sollen. Die Fourierreihe nach Patterson (163,164) enthält im Gegensatz zur Elektronendichte (G 8) das Quadrat des Strukturfaktors.

$$P_{uvw} = \frac{1}{V} \sum_u \sum_{h=-\infty}^{+\infty} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} |F_{hkl}|^2 e^{2\pi i(hu+kv+lw)} \quad (G 12)$$

uvw = Koordinaten des Pattersonraumes

Man kann der Pattersonsynthese zwischenatomare Vektoren in bezug auf Länge und Richtung entnehmen (ausgehend vom Nullpunkt). Die Höhe der Maxima ist dem Produkt der Elektronenzahlen proportional und macht bei ausreichender Auflösung die Unterscheidung der Atomsorten möglich.

Wenn ein Strukturvorschlag z. B. der schwersten Atome vorliegt, lassen sich damit Strukturfaktoren berechnen und mit den beobachteten vergleichen. Ein Maß für die Übereinstimmung der errechneten Struktur mit der tatsächlichen ist der Zuverlässigkeitsindex

R (residual index):

a) konventioneller R-Faktor

$$R = \frac{\sum ||F_o| - |F_c||}{\sum |F_o|} \quad (G 13)$$

F_o = beobachtete Strukturfaktoren

F_c = berechnete Strukturfaktoren

b) gewichteter R-Faktor

$$R_w = \frac{[\sum w (|F_o| - |F_c|)^2]^{\frac{1}{2}}}{[\sum w \cdot F_o^2]^{\frac{1}{2}}} \quad (G 14)$$

$w \approx$ Gewicht eines Reflexes

$$\text{z. B. } w = \frac{1}{\sigma_F^2} \quad (G 14a)$$

wobei

$$\sigma_F = \frac{1}{2} k \frac{\sigma_I}{I} \cdot F_o \quad (G 14b)$$

k = Absolutierungsfaktor

$$\sigma_I = \text{Fehler der Intensität} \quad \text{s. (G 7)}$$

ist.

Der R-Wert wird meist in Prozenten angegeben ($R \cdot 100 \%$).

Beim Vorliegen einer annähernd richtigen Teilstruktur läßt sich eine Differenzfouriersynthese berechnen, die die Elektronendichte der Reststruktur ergibt. Der Gesamtstrukturfaktor ist die Summe der Strukturfaktoren der einzelnen Atome:

$$F_{hkl} = \sum F_{ca} + \sum F_{cb} + \sum F_{cc} \quad (G 15)$$

Deshalb lassen sich aus der Differenz, beobachtete Strukturfaktoren minus berechnete Teilstrukturfaktoren, die Ortskoordinaten der verbleibenden Atome er-

mitteln. Allerdings muß der überwiegende Streubetrag (Zahl der Elektronen) von der abzuziehenden Teilstruktur stammen, damit sie die Phasen der Gesamtstruktur bestimmt.

Zur weiteren Verfeinerung bedient man sich unter Freigabe einer gewünschten Anzahl von Parametern (Skalierungsfaktoren, Koordinaten usw.) der "least-squares"-Methode. Hierbei wird die Summe

$$\sum w ||F_o| - |F_c||^2 \quad (G 16)$$

minimalisiert.

Um nun den absoluten Strukturfaktor $|F|$, die Strukturamplitude (ohne Phase) aus den Intensitäten zu berechnen, benötigt man folgende Beziehung:

$$|F_{hkl}|^2 = k^2 \frac{I}{L \cdot P \cdot A \cdot E} \quad (G 17)$$

k = Absolutierungsfaktor

L = Lorentzfaktor

P = Polarisationsfaktor

A = Absorptionskorrektur

E = Extinktionskorrektur

Die Bragg'sche Reflexionsgleichung

$$n \cdot \lambda = 2d \sin \vartheta \quad (G 1)$$

ist in der Praxis nicht vollkommen erfüllt, da die Intensität auch noch neben dem eigentlichen Glanzwinkel vorhanden ist. Dies wird durch den Lorentzfaktor (unterschiedlich je nach Aufnahmeverfahren) berücksichtigt (165,166).

Die durch Polarisierung bedingte winkelabhängige Schwächung der Intensität wird durch den Polarisationsfaktor

$$p = \frac{1 + \cos^2 2\vartheta}{2} \quad (G 18)$$

berücksichtigt.

Für die Eulerwiegegeometrie ergibt sich dann ein kombinierter Faktor von:

$$L \cdot p = \frac{1 + \cos^2 2\vartheta}{2 \sin 2\vartheta} \quad (G 19)$$

Die Absorption muß entsprechend der Beziehung

$$I \sim e^{-\mu x} \quad (G 20)$$

μ = linearer Absorptionskoeffizient

x = Weglänge im Kristall

berücksichtigt werden. Der lineare Absorptionskoeffizient ist von der Wellenlänge und über die Masseanteile der einzelnen Elemente des Moleküls von deren Massenabsorptionskoeffizienten (177) abhängig. Während die Berech-

nung der Weglänge durch den normalen Kristall - eine möglichst genaue Definition der Gestalt wird benötigt - relativ schwierig ist, wird dies bei einem zylinderförmigen (z. B. Substanz, verfestigt in einem Markröhrchen) oder, wie schon erwähnt, kugelförmigen Kristall einfach, da hier die Absorption nur eine Funktion von ϑ ist. Sie wird angegeben durch den "Transmissionsfaktor" A:

$$\frac{I}{I_0} = A \quad (G \ 21)$$

wobei

$$A = \frac{1}{V} \int_V e^{-\mu x} dV \quad (155) \quad (G \ 22)$$

ist. Der reziproke Wert des "Transmissionsfaktors" ist der Absorptionsfaktor.

$$A^* = \frac{1}{A} \quad (G \ 23)$$

Er liegt für zylindrische und kugelförmige Kristalle in Tabellen vor (155).

Neben der Absorption, die bei allen Winkelstellungen stattfindet, tritt weitere Schwächung der Reflexe durch sog. primäre und sekundäre Extinktion ein, wenn sich der Kristall in Reflexionsstellung befindet (167,168,169,170,171). Hier sind zwei Extremfälle

zu betrachten: der völlig regelmäßig gewachsene Einkristall und der in kleinste, gegeneinander minimal verkantete Kristallbereiche zerfallene Kristall ("idealer Mosaikkristall"). Normalerweise wird ein Kristall, abhängig von der Entstehung und Nachbearbeitung, als Übergang zwischen den beiden Extremfällen zu charakterisieren sein, wobei z. B. durch Oberflächenbearbeitung oder Abschrecken in flüssigem Stickstoff die Mosaikstruktur verstärkt werden kann. Primäre Extinktion entsteht durch Mehrfachreflexion bei ideal regelmäßig gebautem Kristall, wobei wegen des Gangunterschiedes durch Interferenz eine Schwächung des Primär- und des reflektierten Strahles eintritt. Ein "idealer Mosaikkristall" zeigt keine primäre Extinktion.

Sekundäre Extinktion wird durch den Abschirmeffekt weiter an der Oberfläche liegender Kristallblöckchen für darunterliegende, die sich auch gerade in Reflexionsstellung befinden, verursacht. Betroffen sind besonders die stärksten Reflexe. Sekundäre Extinktion vermindert sich ebenfalls bei stärkerer Mosaikstruktur und bei größerer Verkantung der Kristallblöckchen.

Atome führen in Kristallgittern, abhängig von der Temperatur und der Substanz, Schwingungen um ihre Ruhelagen aus. Diese Veränderung der Position aus der Gitterebene

heraus bewirkt Phasenverschiebungen der reflektierten Strahlen und durch deren Interferenz eine Schwächung der Intensität (besonders der kleinen Gitterabstände, d. h. der Reflexe mit großen Θ -Winkeln). Die Temperaturbewegung wird durch den Temperaturfaktor berücksichtigt, der für den isotropen Fall folgenden Wert hat (Debye, Waller):

$$T = \exp \left[-B \left(\frac{2 \sin \Theta}{\lambda} \right)^2 \right] \quad (G \ 24)$$

$$B = 8\pi^2 U \quad (8\pi^2 = 78,96) \quad (G \ 25)$$

$\bar{U}^2$ = mittleres Quadrat der Schwingungsamplitude

Da $2 \sin \Theta / \lambda$ gleich dem reziproken Gitterabstand ist, ergibt sich für den anisotropen Fall:

$$T = \exp \left[- \frac{1}{4} (B_{11} h^2 a^{*2} + B_{22} k^2 b^{*2} + B_{33} l^2 c^{*2} + 2B_{12} h k a^* b^* + 2B_{13} h l a^* c^* + 2B_{23} k l b^* c^*) \right] \quad (G \ 26)$$

4.3. Die praktische Durchführung der Messungen

4.3.1. Bestimmung der Zellparameter (AED)

Bevor mit der Messung der Intensitäten auf dem AED begonnen werden konnte, mußte noch eine genauere Bestimmung der Gitterkonstanten durchgeführt werden. Es wurde eine Gitteraufstellung gewählt, die mit derjenigen von G. Henning und A. Hüllen (96) durch folgende Matrix verbunden ist:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Mit dieser Gitteraufstellung kam die hergestellte Einkristallkugel auch zur Vermessung in das AED, sodaß die reziproken Achsen a^* und b^* und der eingeschlossene Winkel γ^* in der Ebene des Φ -Kreises lagen. Die Achse des Φ -Kreises war gleichzeitig die c-Achse.

Die Justierung des schon auf der Weißenbergkamera ausgerichteten Einkristalls geschah mit Hilfe von Halbblen- den vor dem Detektor (senkrecht und waagrecht).

Zur Bestimmung der Gitterkonstanten wurden eine Schlitz- blende aufgesetzt und Profile der Reflexe der einzelnen Achsen in hundertstel Graden angefertigt. Hochindizierte Reflexe konnten bezüglich der eingesetzten $\text{Cu}_{K\alpha}$ -Strah-

lung nach K_{α_1} und K_{α_2} aufgelöst werden.

Zur genauen Bestimmung der Winkel α^* und β^* wurden die $\Theta/2\Theta$ -Kreise entkoppelt. Mit Hilfe trigonometrischer Berechnungen (173) ließen sich α^* und β^* jeweils in die 2Θ -Ebene legen und durch ein " ω -scan" vermessen.

Es liegt ein triklinen Gitter mit folgenden Parametern vor:

$$\begin{aligned} a &= 19,815 \pm 0,016 \quad [\text{\AA}] \\ b &= 11,803 \pm 0,003 \quad " \\ c &= 12,691 \pm 0,008 \quad " \\ \alpha &= 118,01 \pm 0,02 \quad [\text{Grad}] \\ \beta &= 77,27 \pm 0,03 \quad " \\ \gamma &= 108,46 \pm 0,05 \quad " \\ V &= 2476,4 \quad [\text{\AA}^3] \\ a^* &= 0,05340 \pm 0,00004 \quad [\text{\AA}^{-1}] \\ b^* &= 0,09905 \pm 0,00003 \quad " \\ c^* &= 0,08958 \pm 0,00006 \quad " \\ \alpha^* &= 64,39 \pm 0,02 \quad [\text{Grad}] \\ \beta^* &= 94,91 \pm 0,03 \quad " \\ \gamma^* &= 75,67 \pm 0,05 \quad " \\ V^* &= 0,00040381 \quad [\text{\AA}^{-3}] \end{aligned}$$

Wie aus einem statistischen Test mit normierten Struktur Faktoren (s. Kap.4.4.) und aus der endgültigen

Struktur hervorgeht, ist sie zentrosymmetrisch. Es liegt also die Raumgruppe $P\bar{1}$ vor.

Die Elementarzelle enthält 2 Moleküle ($Z = 2$) (96).

Damit ließ sich nach

$$D_x = \frac{Z \cdot M}{V \cdot N_L} \quad (G\ 27)$$

$$M = 1891,76$$

die röntgenographische Dichte zu $D_x = 2,537 \text{ [g} \cdot \text{cm}^{-3}]$ berechnen. Die Zahl der Atome beträgt ohne Wasserstoff 118 (12 Wolfram-, 38 Sauerstoff-, 4 Stickstoff- und 64 Kohlenstoffatome) und mit den Wasserstoffatomen 262. Es sind 1748 Elektronen in einer Elementarzelle enthalten (Wolfram, $OZ = 74$).

Der lineare Absorptionskoeffizient beträgt

$\mu = 262,15 \text{ [cm}^{-1}]$ bei einem Massenabsorptionskoeffizienten von $\mu / \rho = 172 \text{ [cm}^2 \text{g}^{-1}]$ für Wolfram (jeweils für $\text{Cu}_{K\alpha}$ -Strahlung, $\lambda = 1,5405 \text{ [Å]}$) (171).

4.3.2. Veränderung der Gitterkonstanten

Nach Beendigung der Intensitätsmessung der Äquatorschicht wurden die Gitterkonstanten noch einmal vermessen. Es stellt sich heraus, daß die Parameter jetzt etwas andere Werte hatten, eine Veränderung, die bei Filmmethoden nicht zu registrieren wäre. Es erfolgte

die Berechnung eines ELS mit neuen Daten, damit das genaue Anfahren der Reflexe gewährleistet war. Nach Abständen etwa gleicher Strahlungsbelastung wurde nun die Gitterkonstantenbestimmung jedesmal wiederholt und zwar jeweils durch Erstellung von Reflexprofilen im Θ -scan-Verfahren mit Hundertstelgradschritten (niedrig-, mittel- und hochindizierte Reflexe für jeden Parameter, ω -scan für α^* und β^*). Hierzu wurde jeweils für die Messung aller Gitterkonstanten ein Programmlochstreifen im Gerätecode angefertigt.

Da aufgrund von elektronischen und mechanischen Mängeln des AED's die Messungen an einer ersten Einkristallkugel ($d = 0,011 \text{ [cm]}$) nach dem Durchlauf von vier Schichten abgebrochen werden mußten und, um einen einheitlichen Datensatz zu erhalten mit einer neuen Kugel wiederholt wurden, ließen sich die Parameterveränderungen nach gleichen Strahlungsbelastungen vergleichen. Es zeigte sich, daß sie reproduziert wurden. Die Achse a wurde stetig größer, c stetig kleiner und b blieb etwa gleich. Die Winkel β und γ wurden stetig kleiner, α nahm zuerst zu und dann weniger stark wieder ab. Die größten Abweichungen vom Mittelwert waren dabei für: $a = \pm 0,074 \text{ [Å]}$, $b = \pm 0,007 \text{ [Å]}$, $c = \pm 0,026 \text{ [Å]}$, $\alpha = \pm 0,06 \text{ [Grad]}$, $\beta = \pm 0,13 \text{ [Grad]}$, $\gamma = \pm 0,18 \text{ [Grad]}$. Eine Berechnung der mittleren Fehler

$$F_m = \left(\frac{\sum (r^2)}{n(n-1)} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (G 28)$$

ergab die angegebenen Werte (s. Kap.4.3.1.). Die Fehler sind nicht größer als die üblicherweise mit Filmmethoden ermittelten. Es zeigte sich auch bei der Strukturberechnung, daß sie keinen Einfluß auf die Genauigkeit von Atomkoordinaten und Bindungslängen hatten. Die Messung der Intensitäten erfolgte jeweils mit den gerade ermittelten genauen Daten (ELS). Die Fehlerberechnung basierte auf neun Werten pro Parameter, die wiederum aus je fünf Meßwerten errechnet wurden, wobei die Meßfehler der einzelnen gemessenen Winkel jeweils $\leq$ ein Hundertstel Grad und die der Achsen $\leq$ ein Tausendstel Ångström waren.

Wahrscheinlich kommen derartige Gitterkonstantenveränderungen (wenn auch vielleicht in geringerem Ausmaß) öfter vor, ohne daß sie bemerkt werden. Besonders bei Filmmethoden könnten sie unentdeckt bleiben. Auch auf dem AED muß das Reflexprofil nicht unbedingt symmetrisch sein; wichtig ist vor allem, daß $I_1 + I_3 = I_5$ ist, was auch, je nach gewählten Flankenstrecken, mit etwas ungenauen Gitterdaten erreicht werden kann. Eine mögliche Ursache, "Ausheilung" erlittener Gitterveränderungen beim Kugelschleifen durch die Röntgenstrahlung konnte nicht untersucht werden, da die Möglichkeit der Reflexprofilaufzeichnung mittels Θ -scan

- außerhalb des ELS - wegen defekter Fahrstreckensteuerung des AED nicht mehr gegeben war. Man hätte sonst die Gitterkonstanten eines ungeschliffenen Einkristalls nach entsprechenden Strahlungsbelastungen unter den gleichen Bedingungen gemessen. Das Anfahren von Reflexmaximas per Hand hätte nicht die vergleichbare Genauigkeit der Reflexprofilmessungen ergeben.

Denkbar wäre auch, unter der Einwirkung der Röntgenstrahlung, eine gewisse Verschiebung der Kationen und der in sie eingebetteten Anionen gegeneinander, wobei ein energiereicherer Zustand entsteht, der metastabil erhalten bleibt.

Wahrscheinlich sind diese Gitterkonstantenveränderungen jedoch eine Vorstufe zu den Störungen der Gitterordnung durch Röntgenstrahlung, wie sie von G. Henning und A. Hüllen (96) angegeben werden (Unschärfwerden von Rückstrahlinterferenzen).

4.3.3. Messung der Intensitäten

Es wurden ELS berechnet, die nach der Messung von zehn Reflexen jeweils eine Nullpunktskontrolle und die Fünf-Wert-Messung des Referenzreflexes Nummer eins, 5 0 0, vorsahen. Nach vierzig Reflexen erfolgte die Kontrolle beider Referenzreflexe (Nummer zwei, 0 3 0) und deren Halbblendenkontrollen. Gemessen wurde

von $\Theta = 4,5 [\text{Grad}]$ (apparativ bedingt) bis $\Theta = 55 [\text{Grad}]$
entsprechend $\sin\Theta/\lambda = 0,0534 [\text{\AA}^{-1}]$ bis $0,5319 [\text{\AA}^{-1}]$.

Als äußerste Grenzen für die h, k, l -Werte wurden bestimmt:

	h	k	l
von	-20	-11	0
bis	20	11	12

Die Reflexe wurden in 13 Schichten senkrecht zur c-Achse vermessen, wobei der Äquator, $l = 0$, die erste und die Reflexe mit $l = 12$ die letzte Schicht darstellten. Es zeigte sich bei der Messung, daß die obere Grenze für $\sin\Theta/\lambda$ nicht zu groß gewählt war, da noch genügend Reflexe auch oberhalb $0,5 [\text{\AA}^{-1}]$ als beobachtet eingestuft sind.

Aufgrund der Ausmessung mehrerer Reflexprofile (Rundblende) ergaben sich für die Bestimmung der Flankenstrecken die folgenden Gleichungen:

$$\Delta \Theta = a + b \tan \Theta \quad (\text{G } 29)$$

$$\Delta \Theta_1 = 0,40 + 0,20 \tan \Theta$$

$$\Delta \Theta_2 = 0,45 + 0,23 \tan \Theta$$

Die Summe der b-Werte stimmt gut mit Literaturangaben überein (174). Als Höchstmeßzeit pro Hundertstel Grad

Meßschritt wurden $0,6 \text{ [sec]}$ gewählt.

Auf diese Weise gelangten 6081 Reflexe zur Messung, wovon 1442 als unbeobachtet eingestuft wurden, da sich bei Ihnen Intensitäten ergaben, die kleiner als die Fehler σ_I waren. Statt der gefundenen Werte wurden die Beträge der Fehler σ_I verwendet. Für 422 von den unbeobachteten Reflexen wurde später ein $F_c > F_{\min}$ berechnet.


Die Reflexe -511, -729 und -529 wurden aus dem Datensatz aussortiert, weil sie, bedingt durch mechanische Übertragungsfehler, unkorrekte Werte aufwiesen. Der Reflex 200 wies die größte gemessene Intensität auf. Hier wurde es notwendig, ein Schwächungsfilter in den Strahlungsgang zwischenzuschalten.

4.4. Die Bestimmung der Struktur des Tetrabutyl-
ammonium(1:6)-Wolframats

Die notwendigen Rechnungen wurden mit Hilfe der Programme "X-Ray 63", "X-Ray 67" und "R-Ray 72" (175, 176, 177) an der IBM 360 des Lehrstuhls für Informatik (TU Berlin), dem Rechner der Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (FU Berlin, Typen: CDC 6600 und CDC CYBER 72) durchgeführt. Vorlagen für Strukturzeichnungen wurden mit dem Programm "ORTEP" (178) am Großrechenzentrum für die Wissenschaft in Berlin berechnet und angefertigt (GRZ, Typ: Telefunken TR 440).

Die X-Ray-Programme sind in Unterprogramme unterteilt. Mit "DATRDN" wurden aus den gemessenen Intensitäten die relativen Strukturfaktoren berechnet. Dazu waren neben den Reflexkarten folgende Eingaben notwendig: die Zelldaten, λ , μ , Zahl der Elektronen, Werte zur Korrektur der anomalen Dispersion (181, 182) usw. Die Atomfaktorkurven wurden den International Tables (177), den Angaben von D. T. Cromer und J. T. Waber (179) und H. P. Hanson, F. Herman, J. D. Lea und S. Skillmann

Abb. 12 Lage der Anionen in der Elementarzelle,
x, z-Ebene; die y-Achse befindet sich senkrecht unterhalb der Zeichenebene




(180) entnommen. Die Werte für W^{4+} wurden interpoliert und für Sauerstoff die Werte für O^- (9 Elektronen) eingesetzt. Die L·P-Korrektur erfolgte nach Gleichung (G 19). Zur Berechnung der Absorption wurden den Reflexen jeder Schicht die Absorptionsfaktoren A^* von null bis neunzig Grad (Θ , in Fünf-Grad-Schritten) vorangestellt. Die Zwischenwerte werden vom Programm (Eingabe: ABSORB, später ABSBON) interpoliert. Es handelte sich um Werte zwischen 6,62 und 4,57. Die Absorptionskorrektur wurde erst eingeführt, nachdem die Wolframatompositionen dieser Rechnung gesichert waren und der R-Wert unter 40% lag.

Das Unterprogramm "DATFIX" liefert eine Skalierung und die Bestimmung eines allgemeinen, isotropen Temperaturfaktors (Angleichung der Intensitätsmeßwerte an die absoluten Intensitätswerte). Außerdem werden die normierten Strukturformfaktoren berechnet:

$$E = k \cdot F_{hkl} \cdot \epsilon^{-\frac{1}{2}} \cdot (\sum f_n^2)^{-\frac{1}{2}} \quad (G 30)$$

k = Skalierungsfaktor

Abb. 13 Lage der Anionen in der Elementarzelle
y, z-Ebene; die x-Achse befindet sich senkrecht unter der Zeichenebene



E = Gewichtungsfaktor (abhängig von Achsauslösungen)

Aufgrund statistischer Berechnungen ergibt sich, daß die Durchschnittswerte von E und E^2-1 für zentrosymmetrische und nichtzentrosymmetrische Strukturen unterschiedliche Werte haben, wobei die Mittelwerte von $E^2 = 1$ sein und von E^2-1 ein Minimum erreichen sollen.


<u>Theorie</u>	E	E^2	E^2-1
zentrosymmetrische Struktur	0,798	1,0	0,968
nicht " " "	0,886	1,0	0,736

<u>Berechnung</u>			
mit Meßwerten	0,774	1,0	1,047

Die Berechnung bedeutet eine große Wahrscheinlichkeit für die Annahme der Raumgruppe $P \bar{1}$. Die Bestimmung der Phasen reduziert sich dadurch auf die Werte ± 1 .

Mit dem Programmteil "FOURR" wurde eine dreidimensionale Pattersonsynthese berechnet. Da Wolframpositionen aus den Rechnungen von G. Henning und A. Hüllen (96)


Abb. 14 Lage der Anionen in der Elementarzelle



bekannt sind, war die Deutung der stärksten Maxima leicht möglich und brachte eine Bestätigung für den von den Autoren angegebenen Aufbau des Wolframgerüsts. Es konnte auch nach Umindizierung der Wolframparameter (96) eine Berechnung nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate gestartet werden, die zu einem Zuverlässigkeitsindex von unter 40% führte (d. h. die eingegebene Teilstruktur nähert sich wahrscheinlich den richtigen Werten).

Das benutzte Unterprogramm "ORFLS" (später "BLOKLS", blockdiagonal L. SQ., und "CRYLSQ") erlaubt zur Verfeinerung die Freigabe von Skalafaktoren, Ortskoordinaten und Temperaturfaktoren. Im ersten Zyklus wurden die Skalafaktoren, die den 13 gemessenen Schichten zugeordnet waren (am Referenzreflex abgeschätzte Ausgangswerte von 1 bis 1,107), verfeinert. Dies führte zu einem R-Wert von 45%. Weitere 3 Zyklen und Hinzunahme der Koordinaten und isotropen Temperaturfaktoren der 6 unabhängigen Wolframatome und der Absorptionskorrektur ergab einen R-Wert von 18,9%. Hierbei wurde der ganze Datensatz verwendet.


Abb. 15 Lage der Kationen in der Elementarzelle, x,z-Ebene; die y-Achse befindet sich senkrecht unterhalb der Zeichenebene



Beim nächsten Schritt konnte eine Differenzfouriersynthese berechnet werden ("FOURR"). Das Ergebnis sind "E-Maps", Elektronendichtekarten als parallele Schnitte durch die Elementarzelle. In ihnen ließen sich die Sauerstoffatome auffinden. Sie nehmen Positionen ein, die verzerrt oktaedrisch um die Wolframpositionen verteilt sind. Mit diesen Parametern zusätzlich (als Temperaturfaktor für die Sauerstoffatome wird ein Wert von $B = 3,5 \text{ \AA}^2$ gewählt) führte eine "least-squares"-Verfeinerung zu einem Wert von $R = 13,6 \%$. Da zwei Sauerstoffatome (019 und 020) spezielle Lagen (0,0,0 und $1/2, 1/2, 1/2$) besetzen, unterbleibt bei ihnen die Freigabe der Ortsparameter.

Zur Suche der Kohlenstoffatome wurde anschließend erneut eine Differenzfouriersynthese und zusätzlich mit dem Unterprogramm "PEKPIK" gerechnet. "PEKPIK" berechnet nach entsprechender Angabe von Grenzen die Koordinaten der größten Maxima in der "E-Map". Es traten eine ganz Reihe von Restmaximas etwa in Höhe der Sauerstoffatomelektronendichte neben den Positionen der rechnerisch entfernten Wolframatom auf, die keinen


Abb. 16 Lage der Kationen in der Elementarzelle, y, z-Ebene; die x-Achse befindet sich senkrecht unterhalb der Zeichenebene



chemischen Sinn ergaben. Die Ursache war in der bis jetzt noch nicht vorgenommenen Berücksichtigung der Anisotropie der Temperaturschwingung der Wolframatom- zu suchen. Die höchsten Peaks, die Atomen zugeordnet werden konnten, waren die der zwei Stickstoffatome. Nachfolgend konnten auch die meisten Kohlenstoffatome identifiziert werden. Zur Unterstützung der Suche wurden schichtweise auf durchsichtige Plexiglasplatten Linien gleicher Elektronendichteverteilung gezeichnet, sodaß ein räumliches Bild entstand. Mit einer nach weiterer Verfeinerung neu berechneten "E-Map" gelang es alle 32 Kohlenstoffatome zu lokalisieren, wenn auch mit unterschiedlicher Deutlichkeit. Die Berechnung mit den Positionen der gefundenen Stickstoff- und Kohlenstoffatome und den isotropen Temperaturfaktoren ergab $R = 10,7 \%$. Durch Berücksichtigung der anisotropen Temperaturschwingungen der Wolframatom- (die Parameter der Sauerstoff-, Stickstoff- und Kohlenstoffatome wurden nicht zur Verfeinerung freigegeben) sank der R-Wert auf $8,1 \%$.


Ein erster Rechenzyklus, der die anisotropen Temperaturfaktoren und die Ortskoordinaten der Sauerstoff- und Stickstoffatome in die Verfeinerung einbezog, wo-

Abb. 17 Lage der Kationen in der Elementarzelle



bei eine gewisse Berücksichtigung der Extinktion durch das Auslassen einiger Reflexe vorgenommen wurde, gelangte zu einer Übereinstimmung der beobachteten mit den gemessenen Strukturfaktoren von $R = 6,6 \%$. Fünfzehn Reflexe, die niedrig indiziert waren, sehr hohe F_o -, F_c -Werte und eine hohe negative Differenz ΔF aufwiesen, wurden mit Hilfe des Unterprogramms "MODIFY" vom Datensatz ausgenommen. Dieser etwas grobe Eingriff in das Datenmaterial - die zur Rechnung nicht berücksichtigten Reflexe tragen gerade relativ viel zur Struktur bei - wurde im weiteren Verlauf der Verfeinerung durch eine generelle Berücksichtigung der Extinktion ersetzt. Im Programm "X-Ray 72" werden bei der Absorptionskorrektur (Kugel) mittlere Weglängen des Röntgenstrahls durch den Kristall berechnet, auf die im Programmteil "CRYLSQ" zurückgegriffen werden kann. Es konnte ein allgemeiner, isotroper Extinktionsfaktor berechnet werden, der kaum eine Veränderung für die Ortskoordinaten der Atome bewirkte, jedoch mit den Temperaturfaktoren korrelierte. Das bedeutete nach der Verfeinerung mehr "Wahrheitsge-

Abb. 18 Elementarzelle mit Anionen und Kationen;
 x,z-Ebene, y-Achse senkrecht unterhalb
 der Zeichenebene




halt" für die Temperaturfaktoren, d. h. bei Unterlassung der Extinktionskorrektur würden deren Zahlenwerte Anteile enthalten, die nur scheinbar von Temperaturschwingungen herrühren.

Im weiteren Verlauf der Rechnung werden dann alternierend Koordinaten und anisotrope Temperaturfaktoren für Wolfram, Sauerstoff und Stickstoff, sowie Koordinaten und isotrope Temperaturfaktoren für Kohlenstoff jeweils zusammen mit den Skalafaktoren verfeinert. Die letzten Berechnungszyklen ergaben schließlich bei gleichzeitiger Freigabe aller genannten Parameter und des Extinktionsfaktors einen Zuverlässigkeitsindex von:

$$R_{(\text{konv.})} = 4,6 \%$$

Von 6 Wolframatomen (Tabelle 1 und 2), 20 Sauerstoffatomen (O19 und O20 mit der Multiplizität 0,5, nur U_{ij}) (Tabelle 1 und 2), 2 Stickstoffatomen (Tabelle 1 und 2), 32 Kohlenstoffatomen (Tabelle 3) die zur asymmetrischen Einheit gehören, wurden einschließlich Skalafaktoren und Extinktionsfaktor 388 Parameter in 5 Blöcken verfeinert. Die Skalafaktoren lagen ansteigend

Abb. 19 Elementarzelle mit Anionen und Kationen;
y, z-Ebene, x-Achse senkrecht unterhalb
der Zeichenebene



zwischen den Werten 1,923(7) für den Äquator und 2,39(8) für die zwölfte Schicht. Der isotrope Extinktionskoeffizient hatte einen Wert von 0,0658(17) angenommen (die Angaben in Klammern sind die Fehler, bezogen auf die letzten Stellen). Eine nichtdurchgeführte Extinktionskorrektur bedeutete neben der Verschlechterung der Temperaturfaktoren bei diesem Grad der Verfeinerung eine Erhöhung des R-Wertes um 0,25%. Die Freigabe der Parameter für die anomale Dispersion ergab keine sinnvolle Verbesserung, sodaß die Ausgangseingaben von -6,0 ($\Delta f'$, Realanteil) und 5,3 ($\Delta f''$, Imaginäranteil (181,182) beibehalten wurden.

Oft ist es günstig, neben der Verfeinerung von Skala-faktoren eine Gewichtung der Reflexe vorzunehmen. Hierzu wurde Gleichung (G 14a) verwendet, $w = 1/\sigma_F$, wobei σ_F der Fehler der beobachteten Strukturfaktoren F_o ist und mit den Gleichungen (G 14a) und (G 7) von dem Fehler der Intensität abhängt. Es ist auch die Annahme von Parabel- oder Hyperbelfunktionen für σ_F möglich. In jedem Fall soll, bei nicht zu ungleichmäßiger Streuung der Reflexe, erreicht werden, daß Durchschnittswerte der gewichteten Quadrate von $(|F_o| - |F_c|)$, aufgetragen gegen Größen von F_o , kein größeres Verhältnis als 1:2 aufweisen. Dies ließ sich durch die vorgenommene Gewichtung erreichen. Dazu wurden mit den Unterpro-

grammen "DATRDN", "LOADAT" (Eingabe der Atomkoordinaten, Temperaturfaktoren, der Multiplizität usw.) und "FC" Strukturfaktoren und in "WTLSSQ" eine Aufstellung $\overline{w}(\Delta F)^2 : F_o$ berechnet.

Die Berechnung des gewichteten R-Wertes R_w (G 14) ergab gegenüber dem konventionellen R-Wert von $R = 4,6\%$ eine Verschlechterung von $0,2\%$, $R_w = 4,8\%$. Die Lageparameter der Atome erfuhren keine Veränderung. Bei den Bindungslängen ergab sich insgesamt eine geringe nicht signifikante Verkleinerung der Standardabweichungen.

Das nachstehende Datenmaterial bezieht sich auf Berechnungen ohne Gewichtung. Die Tabellen 1 bis 3 enthalten Atomkoordinaten, isotrope und gegebenenfalls anisotrope Temperaturfaktoren aller Atome, ausgenommen der Wasserstoffatome. Die Bezeichnung der Wolfram- und Sauerstoffatome folgt der Benennung durch G. Henning und A. Hüllen (96). Eine Aufstellung der mit diesen Parametern berechneten Strukturfaktoren F_o befindet sich zusammen mit den beobachteten Strukturfaktoren F_o in Tabelle 27 (s. Anhang).

Die Abbildungen 12 bis 20 zeigen die Aufenthaltsorte der Wolfram- und Sauerstoffatome der Anionen und der Stickstoff- und Kohlenstoffatome der Kationen aus verschiedenen Blickrichtungen getrennt und vereinigt

in der Elementarzelle. Die Ausdehnung der Rotationsellipsoide sind ein Maß für die anisotrope und isotrope Temperaturschwingung der Atome. Die Besetzung der Anionenlagen in der Elementarzelle ist vollständig, während die Paraffinreste derjenigen Tetrabutylammoniumionen, deren Stickstoffatom sich in Nachbarzellen befindet, nicht eingezeichnet sind. Die Bilder sind nach Plotterzeichnungen, die durch das Rechenprogramm "ORTEP" (178) berechnet wurden, angefertigt worden.

Abb. 20 Räumliche Verteilung der Hexawolframat-
 und der Tetrabutylammoniumionen in der Ele-
 mentarzelle




Tabelle 1

Fraktionelle Atomkoordinaten und isotrope Temperaturfaktoren $U \cdot 10^3 [\text{\AA}^2]$, (G 25) der Wolfram-, Sauerstoff- und Stickstoffatome.*

	x	y	z	$U \cdot 10^3 [\text{\AA}^2]$
W 1	0,98147(5)	0,99988(9)	0,18700(8)	36,0(06)
2	0,88277(5)	0,87930(9)	0,96386(9)	37,0(06)
3	0,96355(5)	0,19663(9)	0,08423(9)	40,7(06)
4	0,60421(5)	0,44248(9)	0,48852(9)	31,5(06)
5	0,56283(5)	0,63870(9)	0,40867(9)	35,7(11)
6	0,52529(5)	0,67483(9)	0,68633(8)	35,7(06)
O 1	0,9864(08)	0,1597(12)	0,9167(11)	62(4)
2	0,9365(09)	0,3365(16)	0,1443(15)	85(5)
3	0,9683(08)	0,0037(14)	0,3251(12)	67(4)
4	0,9563(06)	0,1601(12)	0,2186(11)	48(3)
5	0,8906(07)	0,9034(13)	0,1223(10)	53(4)
6	0,8769(07)	0,0613(13)	0,0393(12)	54(4)
7	0,7971(07)	0,7925(16)	0,9383(14)	76(5)
8	0,9340(07)	0,7475(13)	0,9043(12)	60(4)
9	0,9188(07)	0,9046(13)	0,8206(11)	53(3)
10	0,6808(07)	0,4015(14)	0,4773(14)	65(4)
11	0,6337(06)	0,5657(12)	0,4170(11)	49(3)
12	0,6104(09)	0,7412(17)	0,3427(17)	90(5)
13	0,5343(07)	0,3439(13)	0,5629(12)	54(4)
14	0,5435(09)	0,8048(14)	0,8212(13)	78(5)
15	0,6050(06)	0,5934(12)	0,6380(11)	48(3)
16	0,5721(07)	0,7525(12)	0,5776(12)	51(3)
17	0,5627(07)	0,3131(11)	0,3413(11)	47(3)
18	0,5294(07)	0,4697(13)	0,2778(11)	51(3)
19	0,0	0,0	0,0	36(4)
20	0,5	0,5	0,5	39(4)
N 1	0,3684(09)	0,0419(17)	0,8433(15)	60(5)
2	0,1270(08)	0,3093(14)	0,5552(13)	48(4)

U-Werte vor Berücksichtigung anisotroper Temperaturschwingungen, U_{ij} -Werte in Tabelle 2

* Die Werte in Klammern geben die Standardabweichungen an und beziehen sich in allen Tabellen auf die jeweils letzten Stellen.

Tabelle 2

Anisotrope Temperaturfaktoren der Wolfram- und Sauerstoffatome; für die Temperaturfaktoren U_{ij} gelten die Gleichungen (G 25) und (G 26); sie sind für Wolfram mit dem Faktor 10^4 , Sauerstoff und Stickstoff mit 10^3 multipliziert.

	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{12}	U_{13}	U_{23}
W 1	566(06)	540(06)	362(14)	55(04)	-59(04)	197(04)
2	418(05)	574(06)	446(13)	16(04)	-62(04)	157(05)
3	663(06)	454(06)	508(14)	177(05)	-48(05)	133(05)
4	427(05)	513(06)	556(14)	206(04)	-47(04)	230(05)
5	520(06)	556(06)	583(14)	140(04)	16(05)	373(05)
6	579(06)	497(06)	415(14)	186(04)	-98(04)	109(04)
O 1	101(11)	46(08)	39(08)	3(08)	-9(08)	25(07)
2	107(13)	72(11)	89(12)	45(10)	-19(10)	14(09)
3	79(10)	62(09)	54(09)	7(08)	-8(08)	25(08)
4	50(07)	47(07)	41(07)	9(06)	3(06)	17(06)
5	55(08)	70(09)	32(07)	16(07)	1(06)	21(07)
6	49(08)	59(09)	60(09)	17(07)	-10(07)	17(07)
7	53(09)	92(12)	71(11)	2(08)	-7(07)	28(09)
8	65(09)	55(09)	46(08)	-4(07)	-4(07)	15(07)
9	51(08)	71(09)	42(08)	14(07)	-4(06)	23(07)
10	57(09)	67(10)	86(11)	25(08)	-6(08)	23(09)
11	51(08)	55(08)	55(08)	11(06)	5(06)	31(07)
12	78(11)	95(13)	132(16)	-2(10)	12(11)	86(12)
13	59(08)	59(09)	66(09)	18(07)	-9(07)	33(07)
14	114(13)	61(10)	48(09)	29(09)	-22(09)	-13(08)
15	48(08)	53(08)	52(08)	7(06)	-13(06)	21(07)
16	50(08)	52(08)	69(10)	8(07)	-6(07)	31(07)
17	62(08)	38(07)	42(08)	18(06)	0(06)	7(06)
18	64(09)	66(09)	43(08)	26(07)	-9(07)	25(07)
19	65(11)	11(07)	31(09)	2(07)	-8(08)	4(07)
20	40(09)	52(11)	29(09)	16(08)	2(07)	16(08)
N 1	83(12)	67(11)	55(11)	40(10)	3(09)	29(09)
2	55(10)	46(09)	45(10)	16(08)	-11(08)	6(08)

Tabelle 3

Fraktionelle Atomkoordinaten und isotrope Temperaturfaktoren $U \cdot 10^3 [\text{\AA}^2]$ der Kohlenstoffatome.

	x	y	z	$U \cdot 10^3 [\text{\AA}^2]$
C 111	0,3566(13)	0,1759(24)	0,8880(23)	76(07)
112	0,3894(16)	0,2819(29)	-0,0043(28)	103(09)
113	0,3709(17)	0,4132(33)	0,0255(31)	111(10)
114	0,6147(28)	0,4837(53)	0,8535(50)	190(21)
121	0,6594(15)	0,0051(28)	0,0531(27)	91(08)
122	0,6538(21)	0,1457(40)	0,0863(39)	142(14)
123	0,6735(27)	0,1759(52)	0,9930(50)	190(20)
124	0,6515(20)	0,3037(38)	0,0236(35)	138(13)
131	0,6685(13)	0,0518(24)	0,2720(23)	77(07)
132	0,7506(17)	0,0939(32)	0,2515(30)	112(10)
133	0,7844(16)	0,1687(30)	0,3733(28)	99(09)
134	0,7874(17)	0,0764(32)	0,4165(30)	110(10)
141	0,4489(15)	0,0440(27)	0,8184(26)	90(08)
142	0,4870(15)	0,0920(27)	0,7223(26)	92(08)
143	0,5657(16)	0,0913(29)	0,7073(28)	98(09)
144	0,6066(16)	0,1241(29)	0,6095(28)	96(09)
211	0,0494(11)	0,2432(20)	0,5877(19)	55(05)
212	0,0174(12)	0,3334(22)	0,7082(21)	65(06)
213	0,9377(12)	0,2574(23)	0,7210(22)	71(06)
214	0,9003(16)	0,3383(29)	0,8459(28)	98(09)
221	0,1292(11)	0,4258(20)	0,5278(20)	56(06)
222	0,0830(12)	0,3863(22)	0,4271(21)	65(06)
223	0,8976(13)	0,4916(24)	0,6071(23)	74(07)
224	0,8245(14)	0,4713(25)	0,6723(24)	82(07)
231	0,1516(10)	0,1979(18)	0,4416(18)	49(05)
232	0,2268(11)	0,2369(20)	0,3843(20)	58(06)
233	0,2455(13)	0,1096(25)	0,2800(23)	77(07)
234	0,2579(16)	0,0222(29)	0,3232(28)	99(09)
241	0,1764(11)	0,3700(20)	0,6552(19)	56(06)
242	0,1862(12)	0,2697(22)	0,6918(21)	66(06)
243	0,2270(12)	0,3443(22)	0,8076(22)	66(06)
244	0,1806(13)	0,4222(25)	0,9175(24)	79(07)

Tabelle 4

Thermische Schwingungsellipsoide der Wolframatomte;
R1 bis R3 geben die Wurzeln aus den mittleren Quadra-
ten der Auslenkungen entlang der drei Hauptachsen R
der thermischen Schwingungsellipsoide in $[R] \cdot 10^4$ an.
Die Berechnung erfolgte mit dem Programm "ORFFE"
(184).

	R1	R2	R3
W1	1332	1908	2267
W2	1552	1727	2373
W3	1686	2010	2242
W4	1347	1884	2028
W5	1379	1974	2210
W6	1501	1873	2221

Tabelle 5

Hier sind die Winkel [Grad] der Hauptachsen R der thermischen Schwingungsellipsoide gegenüber einem karthesischen Achssystem I1 bis I3 aufgeführt: I1 || (W1...W1'), I2 || (W1...W1') x (W2...W2'), I3 || (W2...W2') für das Anion (019) und I1 || (W4...W4'), I2 || (W4...W4') x (W5...W5'), I3 || (W5...W5') für das Anion (020). (Vom karthesischen Achssystem zu den Hauptachsen im Uhrzeigersinn)

	W1	W2	W3	W4	W5	W6
R1, I1	109	135	85	165	105	98
I2	116	70	68	87	79	19
I3	147	129	158	105	161	107
R2, I1	61	70	52	102	15	24
I2	147	127	45	139	85	77
I3	76	136	70	51	104	70
R3, I1	144	52	142	99	92	113
I2	110	44	53	49	12	77
I3	61	108	81	42	78	26

4.5. Beschreibung der Struktur

4.5.1. Allgemeine Beschreibung der Struktur

Mit ihrem Schwerpunkt befinden sich Oktaeder aus Wolframatomen an den Ecken 0,0,0 und im Mittelpunkt $1/2, 1/2, 1/2$ der Elementarzelle. Die Wolframatomte stellen das Gerüst der Anionen dar. Sie sind ihrerseits jeweils verzerrt oktaedrisch von sechs Sauerstoffatomen umgeben. Jedes dieser WO_6 -Oktaeder ist über vier Kanten mit vier benachbarten WO_6 -Oktaedern verbunden. Alle sechs WO_6 -Oktaeder sind über eine gemeinsame Ecke im Zentrum des Anions miteinander verknüpft, sodaß dieses zentrale Sauerstoffatom (O_c) in bezug auf Wolfram die Koordinationszahl 6 aufweist.

Modelle der Anionen zeigen die Abbildungen 21, 22 und 23. Eine Darstellung der gefundenen Anionenstruktur mit Bindungslängen Wolfram - Sauerstoff und anisotropen Schwingungsellipsoiden geben die Abbildungen 24 und 25 wieder.

Die beiden unterschiedlichen Anionen, die entsprechend ihrer Lage in der Elementarzelle in ihrem Schwerpunkt ein Symmetriezentrum haben, sind gegeneinander verdreht (Abb. 12, 13 und 14). Die jeweiligen Verbindungslinien von unabhängigen Sauerstoffatomen freier Ecken und der durch Symmetrie erzeugten Sauerstoffatome (gleich Diagonalen der Wolframoktaeder) des Anions im

Ursprung (019) und desjenigen im Zellmittelpunkt (020) haben Winkelunterschiede von 45 [Grad] oder mehr, d. h. diese Richtungen stehen weitgehend auf "Lücke". Bei den Anionen einer Schicht sind diese Verbindungslinien endständiger Sauerstoffatome symmetriebedingt parallel, doch verlaufen sie in keiner der Achsenrichtungen. Dies bewirkt, daß die Sauerstoffatome freier Ecken zweier benachbarter Anionen weiter voneinander entfernt sind, als wenn deren Verbindungslinien jeweils auf einer Geraden liegen würden. Eine Erklärung hierfür wäre die elektrostatische Abstoßung gleichsinnig geladener Pole. Die Sauerstoffatome freier Ecken (O_t), die nur von einem Wolframatom koordiniert sind, ragen aus den annähernd kugeligen Anionen etwas heraus. Die - allerdings relativ geringe - negative Ladung der $[W_6O_{19}]^{2-}$ Ionen ist hauptsächlich auf sie verteilt (190,29). Sicher wird die Ausrichtung der Anionen auch durch die sterischen Möglichkeiten der Einbettung in die zwischen den Anionen verteilten Tetrabutylammoniumionen verursacht sein (Abb. 18, 19 und 20). Diese üben ein gleichmäßiges positives elektrostatisches Kristallfeld aus, da die Träger der positiven Ladung, die Stickstoffatome, sich etwa gleichweit von allen angrenzenden Anionen entfernt befinden. Die tetraedrische Anordnung der ersten Kettenglieder um die zentralen Stickstoffatome und die vier gleichartigen Liganden verhindern




Abb. 21 Modell des Anions

Die Linien entsprechen Oktaederkanten und die Schnittpunkte den Mittelpunkten der Sauerstoffatome. Die Zeichnung zeigt damit deutlich den Aufbau des Hexawolframations aus Oktaedern, gibt aber nicht die Raumerfüllung durch die Sauerstoff- und Wolfram-atome wieder. Die Lage der Sauerstoffatome entsprechen den gefundenen Positionen. Die Wolfram-atome im Innern der Oktaeder sind nicht eingezeichnet.




Abb. 22 Modellhafte Darstellung des $[W_6O_{19}]^{2-}$ -Anions als Aufbau durch Ionen; kubisch dichteste Kugelpackung aus O^{2-} -Ionen; in den Oktaederlücken sitzen W^{6+} -Ionen; die Lage der Ionen entspricht den gefundenen Positionen. (Gepunktete Sauerstoffionen = O_t , mit einem Kreis versehene = O_b)




Abb. 23 Oktaedermodell (an den Ecken befinden sich Sauerstoffatome) des Hexawolframat- (linkes Modell) und des Dekawolframatons (rechtes Modell). Das mittlere Modell zeigt erklärend die geometrischen Zusammenhänge, stellt jedoch keinen Übergangszustand dar.

eine einseitige, direkte Annäherung an die Anionen.

Idealisiert läßt sich das Anion als Ausschnitt aus der NaCl-Struktur (W statt Na, O statt Cl) oder als kubisch dichteste Kugelpackung von Sauerstoffatomen (Schichtfolge abc, abc usw.) auffassen, in deren oktaedrischen Hohlräumen sich die Wolframatombe befinden (Symmetriegruppe O_h). Im Unterschied zu Oxiden, deren Einkristalle ein einziges großes Molekül darstellen und deren Sauerstoffatome im Innern homogene Bedingungen nach allen Seiten vorfinden, hat das $[W_6O_{19}]^{2-}$ -Ion dazu eine verhältnismäßig große Oberfläche, die für benachbarte Sauerstoffatome unterschiedliche, einseitige Krafteinwirkungen bedeutet (ausgenommen für das zentrale Sauerstoffatom). Es sind Sauerstoffatome mit 1-facher (endständige Sauerstoffatome, O_t), 2-facher (bindende Sauerstoffatome = kantenverbrückende Sauerstoffatome, O_b) und 6-facher (zentrales Sauerstoffatom, O_c) Wolframkoordination vorhanden. Die Coulombabstoßung zwischen den Wolframatombe bewirkt deren starke Versetzung weg vom Zentrum des Anions (191). Eine Verstärkung der Auslenkung tritt noch durch die erhöhte Bindungsordnung zwischen Wolframatombe und den endständigen Sauerstoffatomen ein. Diese große Verschiebung aus dem Mittelpunkt heraus bewirkt, daß die endständigen Sauerstoffatome, obwohl

zu ihnen die kürzesten Bindungen ausgebildet sind, noch aus den Kanten der idealisierten Struktur herausragen.

In Tabelle 6 sind die Versetzungen der Wolframatom e aus den idealen Positionen, den Ebenen der vier jeweils nächsten kantenverbrückenden Sauerstoffatomen (O_b) angegeben, sowie die Abstände der O_c und O_t von diesen Ebenen. Die Berechnung erfolgte mit dem Programm "LSQPL". Die Zahl unter den Sauerstoffatomen O_b gibt die Standardabweichung der jeweiligen Ebene aus vier O_b an.

Es resultieren stark verzerrte WO_6 -Oktaeder, was sich besonders bei den Wolframatom - Sauerstoffatombindungslängen bemerkbar macht. D. L. Kepert (191) machte Aussagen über die Stabilität von Polyanionen aufgrund von Größe, Ladung und Winkel der Metallatome der entstandenen Oktaederverbände, wobei der Entstehungsvorgang außer Betracht bleibt. Nach diesen Kriterien ist die Existenz von Hexametal-laten begünstigt, da nur 60 und 90 [Grad] M...M...M-Winkel auftreten, nicht jedoch die weniger vorteilhaften mit 120 und 180 [Grad]. Entsprechend H. Lipscomb (72) wird eine Struktur durch das Nichtvorhandensein von freien Kanten, d. h. zwei oder drei terminalen Sauerstoffatomen, stabilisiert. Im Hexawolframatom liegen nur freie Ecken vor. Nach K. H. Tytko und O. Glemser (29), die

Tabelle 6 Text s. o.

σ_b σ_b σ_b σ_b σ [R]	W σ_c σ_t	[R] [R] [R]
0 4 0 9' 0 5 0 1' 0,03	W 1 0 19 0 3	0,48 1,84 2,17
0 5 0 8 0 6 0 9 0,01	W 2 0 19 0 7	0,46 1,86 2,19
0 1 0 6 0 8' 0 4 0,004	W 3 0 19 0 2	0,46 1,87 2,19
0 13 0 15 0 17 0 11 0,004	W 4 0 20 0 10	0,46 1,86 2,18
0 11 0 18 0 16 0 13' 0,001	W 5 0 20 0 12	0,47 1,86 2,22
0 15 0 18' 0 16 0 17' 0,01	W 6 0 20 0 14	0,46 1,86 2,19
Mittelwerte	W σ_c σ_t	0,47 1,86 2,19

den Entstehungsvorgang von Isopolywolframaten und -molybdaten untersuchten, begünstigt die relativ große austretende Anzahl H_2O -Moleküle die Bildung des Hexawolframations aus energetischen Gründen. Ungünstig wirkt sich die große Metallkoordination des zentralen Sauerstoffatoms aus.

4.5.2. Diskussion von Atomabständen, Bindungslängen und Vergleich mit anderen Strukturen

4.5.2.1. Atomabstände, Bindungslängen und Temperaturfaktoren

Mittels trigonometrischer Funktionen wurden durch das Unterprogramm "BONDLA" die Atomabstände, Bindungslängen und Winkel errechnet. Als Eingabe waren die Gitterdaten, die Atomkoordinaten und deren Fehler nötig.

Die Tabelle 7 enthält die Abstände der Wolframatom der beiden Anionen (019) und (020) (Abb. 24 und 25). Es folgen die Tabellen 8, 9 und 10 mit Bindungslängen zwischen den Wolframatomen einerseits und den zentralen (O_c), den endständigen (O_t) und den bindenden (kantenverbrückenden) Sauerstoffatomen (O_b) andererseits. In den Tabellen 11, 12 und 13 sind die Abstände der Sauerstoffatome untereinander erfaßt. Es schließen sich die Tabellen 14 bis 17 mit den Angaben von Winkeln in den Anionen an. Die Bezeichnung der Winkel entspricht der-




Abb. 24 Strukturmodell des $[W_6O_{19}]^{2-}$ -Ions im Ursprung der Elementarzelle mit anisotropen Schwingungsellipsoiden, Bezeichnungen der Atome und Angabe der Bindungslängen




Abb. 25 Strukturmodell des Hexawolframations (020)
im Zentrum der Elementarzelle





Abb. 26 Modell des Hexametalations zur Demonstration
der Bindungswinkel (aus 97)

jenigen von R. Mattes, H. Bierbüße und J. Fuchs (97,98),
Abb. 26. Die Bindungslängen und Winkel in den Kationen
geben die beiden Tabellen 28 und 29 wieder (s. Anhang).






Abb. 28 Strukturmodell des Kations (N2)

Tabelle 7

Wolfram - Wolfram - Abstände* des Anions (019) im Ursprung und des Anions (020) im Mittelpunkt der Elementarzelle.

a) Kantenverbrückte Wolframabstände

Anion	von ... nach	Abstand [Å]
(019)	W1 ... W2	3,2805 (15)
	W2'	3,2867 (14)
	W3	3,2848 (19)
	W3'	3,2960 (12)
	W2 ... W3	3,2910 (12)
	W3'	3,2931 (16)
(020)	W4 ... W5	3,2918 (19)
	W5'	3,2922 (12)
	W6	3,2844 (13)
	W6'	3,2861 (14)
	W5 ... W6	3,2843 (16)
	W6'	3,2927 (12)
b) Diagonale Abstände der Wolframoktaeder		
(019)	W1 ... W1'	4,6415 (14)
	W2 ... W2'	4,6462 (15)
	W3 ... W3'	4,6651 (15)
(020)	W4 ... W4'	4,6509 (15)
	W5 ... W5'	4,6603 (15)
	W6 ... W6'	4,6412 (14)

* Die Werte in Klammern geben die Standardabweichungen an und beziehen sich in allen Tabellen auf die jeweils letzten Stellen.

Tabelle 8

Bindungslängen Wolframatome - zentrale Sauerstoffatome (O_c)
(c = central) der Anionen (019) und (020).

Anion	Bindung	d [Å]
(019)	W1—O19	2,3207 (11)
	W2	2,3230 (08)
	W3	2,3326 (11)
(020)	W4—O20	2,3255 (12)
	W5	2,3301 (12)
	W6	2,3205 (08)

Tabelle 9

Bindungslängen Wolframatome - endständige Sauerstoffatome (O_t)
(t = terminal) der Anionen (019) und (020).

Anion	Bindung	d [Å]
(019)	W1—O3	1,695 (17)
	W2—O7	1,692 (13)
	W3—O2	1,672 (19)
(020)	W4—O10	1,691 (17)
	W5—O12	1,713 (22)
	W6—O14	1,694 (12)

Tabelle 10

Bindungslängen Wolframatome - bindende (kantenverbrückende) Sauerstoffatome (O_b) (b = bonding) der Anionen (019) und (020).

(019)		(020)	
Bindung	d [Å]	Bindung	d [Å]
W1—04	1,944 (15)	W4—011	1,936 (17)
05	1,921 (12)	013	1,897 (15)
01	1,936 (14)	015	1,895 (11)
09	1,948 (12)	017	1,924 (11)
W2—08	1,892 (16)	W5—011	1,909 (17)
09	1,926 (15)	016	1,936 (13)
06	1,929 (14)	018	1,927 (11)
05	1,929 (15)	013	1,938 (14)
W3—04	1,913 (16)	W6—015	1,943 (14)
06	1,914 (11)	016	1,922 (16)
01	1,935 (14)	017	1,912 (15)
08	1,941 (14)	018	1,906 (15)

Tabelle 11

Abstände der bindenden (kantenverknüpfenden) Sauerstoffatome (O_b) und der endständigen Sauerstoffatome (O_t) der Anionen (019) und (020).

(019)		(020)	
von...nach	Abstand [$\text{\AA}$]	von...nach	Abstand [$\text{\AA}$]
02...04	2,812(29)	012...011	2,834(31)
06	2,814(19)	016	2,859(27)
08'	2,880(26)	018	2,893(21)
01	2,839(19)	013'	2,909(20)
03...04	2,837(26)	014...015	2,889(19)
05	2,851(21)	016	2,814(22)
09'	2,849(20)	017'	2,825(22)
01'	2,876(17)	018'	2,860(18)
07...08	2,830(23)	010...011	2,839(28)
09	2,837(20)	013	2,849(18)
06	2,847(18)	015	2,829(19)
05	2,845(21)	017	2,844(22)

Tabelle 12

Abstände der bindenden (kantenverbrückenden) Sauerstoffatome (O_b) untereinander, der Anionen (O_{19}) und (O_{20}).

(019)		(020)	
von...nach	Abstand [$\text{\AA}$]	von...nach	Abstand [$\text{\AA}$]
08...09	2,647(26)	013...016'	2,674(21)
05	2,637(16)	017	2,613(21)
04'	2,636(18)	018'	2,642(18)
01'	2,645(22)	015	2,624(17)
06...09	2,636(16)	011...015	2,617(21)
05	2,636(26)	016	2,626(17)
01	2,662(19)	017	2,654(16)
04	2,634(20)	018	2,631(20)
01...09	2,658(17)	015...016	2,624(26)
05'	2,649(23)	018'	2,652(17)
04...09'	2,693(21)	017...016'	2,649(17)
05	2,663(16)	018	2,628(25)

Tabelle 13

Abstände der zentralen (O_c) und der bindenden (kantenverbrückenden) Sauerstoffatome (O_b) der Anionen (019) und (020).

(019)		(020)	
von...nach	Abstand [$\text{\AA}$]	von...nach	Abstand [$\text{\AA}$]
019...04	2,659(11)	020...011	2,640(12)
06	2,639(15)	013	2,628(19)
01	2,658(19)	015	2,637(14)
05	2,651(13)	016	2,657(12)
08	2,626(12)	017	2,632(12)
09	2,665(14)	018	2,623(14)

Tabelle 14

Winkel α , gebildet aus zwei Wolframatomen und einem bindenden (kantenverbrückenden) Sauerstoffatom (O_b , als Zentralatom) der Anionen (019) und (020).

(019)		(020)	
Winkel α	[Grad]	Winkel α	[Grad]
W1' - O1 - W3	116,7(9)	W4 - O11 - W5	117,8(6)
W1 - O4 - W3	116,8(5)	W4 - O13 - W5'	118,3(9)
W1 - O5 - W2	116,9(7)	W4 - O15 - W6	117,6(7)
W2 - O6 - W3	117,8(8)	W5 - O16 - W6	116,8(6)
W2 - O8 - W3'	118,4(6)	W4 - O17 - W6'	117,9(6)
W1' - O9 - W2	116,1(7)	W5 - O18 - W6'	118,4(7)

Tabelle 15

Winkel β , gebildet aus zwei bindenden (kantenverbrückenden) Sauerstoffatomen und einem Wolframatom (W als Zentrum) der Anionen (019) und (020). Die Winkel β würden bei unverzerrtem Oktaederbau 90 [Grad] betragen.

(019)			(020)		
Winkel β		[Grad]	Winkel β		[Grad]
04 - W1 - 05		87,1(6)	011 - W4 - 017		86,9(6)
04	09'	87,6(6)	013	015	87,6(5)
05	01'	86,8(6)	011	015	86,2(6)
09'	01'	86,4(6)	013	017	86,3(6)
08 - W2 - 09		87,8(7)	011 - W5 - 016		86,2(6)
08	05	87,3(7)	011	018	86,6(6)
09	06	86,3(6)	016	013'	87,3(6)
06	05	86,2(7)	018	013'	86,3(5)
04 - W3 - 06		87,0(6)	015 - W6 - 016		85,5(7)
06	01	87,5(6)	016	017'	87,4(6)
01	08'	86,1(6)	015	018'	87,1(6)
04	08'	86,3(6)	017'	018'	87,0(7)

Tabelle 17

Winkel ϑ , gebildet aus einem endständigen Sauerstoffatom (O_t), einem Wolframatom (W als Zentrum) und einem bindenden (kantenverbrückenden) Sauerstoffatom (O_b), der Anionen (019) und (020).

(019)		(020)	
Winkel ϑ	[Grad]	Winkel ϑ	[Grad]
03 - W1 - 04	102,2(7)	010 - W4 - 011	102,8(7)
05	103,9(6)	013	105,0(8)
09'	102,7(6)	015	104,0(6)
01'	104,5(8)	017	103,5(6)
07 - W2 - 08	104,1(7)	012 - W5 - 011	102,8(8)
09	103,1(7)	016	103,0(7)
06	103,4(7)	018	105,1(7)
05	103,4(7)	013'	105,5(9)
02 - W3 - 04	103,2(8)	014 - W6 - 015	105,0(8)
06	103,2(7)	016	102,0(7)
01	103,6(9)	017	103,0(8)
08'	105,5(7)	018	105,0(7)

4.5.2.2. Thermische Schwingungen der Anionen als starre Körper

Bei der Berücksichtigung von Wärmebewegungen sollte man nicht nur die Schwingungen einzelner Atome, sondern auch verbundener Atomgruppen in Betracht ziehen. So kann man das $[\text{W}_6\text{O}_{19}]^{2-}$ -Ion als starres Gebilde auffassen, das als Verband Translationsschwingungen und Schwingungen um ein Zentrum (Librationsschwingungen) ausführt, wobei sich entweder das ganze Anion oder das Schweratomgerüst allein bewegt. Die Beschreibung dieser Bewegungen geschieht durch den Translationstensor $\mathbf{T}$ und den Librationstensor $\boldsymbol{\omega}$ (185,186, 187,188). Die Berücksichtigung deren Abhängigkeit untereinander durch einen dritten Tensor entfällt hier, da sich die beiden Anionen in zentrosymmetrischer Lage befinden. Die Berechnung erfolgt mit Hilfe des Programms "RIGID" auf Grundlage der Temperaturfaktoren U_{ij} der beteiligten Atome. In dem schwingenden Körper wird dazu als Bezug ein orthogonales System errichtet, dessen erste Achse parallel zu a , dessen zweite Achse parallel zu $c^* \times a$ und dessen dritte Achse parallel zu c^* verläuft. Die folgenden Tabellen 18 und 19 geben die mittleren Amplituden, bzw. Winkel der Tensoren $\mathbf{T}$ und $\boldsymbol{\omega}$, die orthogonalen Achsen, auf die Bezug genommen wird und den jeweiligen cosinus des Winkels in Richtung auf die Hauptachsen der Schwingungsellipsoide an.

Tabelle 18 Beschreibung s. o. Text

Anion im Ursprung (019)

[Å]	Bezugs- achse	Winkel [Grad]		
0,2183	1	44	134	86
0,1958	2	49	50	114
0,1806	3	76	70	24
[Grad]				
4,274	1	97	101	167
3,488	2	135	133	78
2,478	3	135	45	93

Tabelle 19 Beschreibung s. o. Text

Anion im Zellenmittelpunkt (020)

[Å]	Bezugs- achse	Winkel [Grad]		
0,2037	1	126	139	106
0,1883	2	113	92	23
0,1715	3	135	49	106
[Grad]				
4,144	1	165	75	89
3,631	2	104	152	114
2,981	3	96	113	24

Die Tabellen 20 und 21 enthalten die Translations- und Librationstensoren, bezogen auf das orthogonale System und ihre Standardabweichungen.

Tabelle 20

Anion (019)

$T_{ij} [Å^2]$					
0.0428	0.0421	0.0336	-0.0051	-0.0008	-0.0022
0.0004	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0003
$\omega_{ij} [Grad^2]$					
9.27	9.35	17.94	3.13	0.44	1.35
0.37	0.37	0.38	0.21	0.29	0.24

Tabelle 21

Anion (020)

$T_{ij} [Å^2]$					
0.0345	0.0364	0.0355	0.0055	-0.0002	0.0023
0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
$\omega_{ij} [Grad^2]$					
16.86	12.77	9.60	-1.16	0.34	1.57
0.19	0.18	0.18	0.17	0.17	0.13

Durch die Librationsbewegung werden bei der Struktur-analyse die Bindungslängen zu kurz berechnet, da sich der mittlere Aufenthaltsort des schwingenden Atoms dem Zentrum der "Libration" nähert. Wenn man die Schwin-gung des starren Körpers mittels der Librationstensor-berücksichtigt, erhält man die tatsächlichen Bin-dungslängen. Die Berechnung erfolgte durch das Pro-gramm "AUW" (189), das die Librationstensoren, bezo-gen auf das Kristallsystem, benötigt.

Tabelle 22

Librationstensoren, bezogen auf das Kristallsystem

Anion (019)		
$\omega_{ij} =$	$\begin{pmatrix} 1,1080 & 0,0029 & 0,0850 \\ 0,0029 & 0,3165 & -0,1053 \\ 0,0850 & -0,1053 & 0,7155 \end{pmatrix}$	
Anion (020)		
$\omega_{ij} =$	$\begin{pmatrix} 2,0168 & -0,4586 & 0,3445 \\ -0,4586 & 0,5887 & -0,2494 \\ 0,3445 & -0,2494 & 0,4760 \end{pmatrix}$	

Die Auswirkungen waren jedoch nur für die Wolframato-
me von Bedeutung, da nur dort die Veränderungen in
Größenordnungen lagen, die die Standardabweichungen
der Bindungslängen, bzw. Atomabstände übertreffen. Die
Libration führte also nur zu einer Verlängerung der
Bindungen zwischen den zentralen Sauerstoffatomen und
den Wolframatomten und den Abständen der Wolframato-
me untereinander (Tabelle 23 und 24).

Tabelle 23 und 24

Bindungslängen $D_c - W$ und Abstände $W...W$ unter Berücksichtigung der thermischen Schwingung der Anionen (019) und (020).

Anion (019)				
Atome	unkorrigierter Wert [Å]	$\sigma \times 10^4$ [Å]	thermische Korrektur $\times 10^4$ [Å]	korrigierter neuer Wert [Å]
019 - W1	2,3207	11	76	2,3283
W2	2,3230	08	85	2,3315
W3	2,3326	11	98	2,3424
W1...W2	3,2805	15	108	3,2913
W2'	3,2867	14	119	3,2986
W3	3,2848	19	145	3,2993
W3'	3,2960	12	101	3,3061
W2...W3	3,2910	12	118	3,3028
W3'	3,2931	16	141	3,3072
W1...W1'	4,6415	14	151	4,6566
W2...W2'	4,6462	15	170	4,6632
W3...W3'	4,6651	15	197	4,6848

Anion (020)				
Atome	unkorrigierter Wert [Å]	$\sigma \times 10^4$ [Å]	thermische Korrektur $\times 10^4$ [Å]	korrigierter wert [Å]
020 - W4	2,3255	12	78	2,3333
W5	2,3301	12	101	2,3402
W6	2,3205	08	98	2,3303
W4...W5	3,2918	19	126	3,3044
W5'	3,2922	12	128	3,3050
W6	3,2844	13	126	3,2970
W6'	3,2861	14	123	3,2984
W5...W6	3,2843	16	152	3,2995
W6'	3,2927	12	131	3,3058
W4...W4'	4,6509	15	156	4,6665
W5...W5'	4,6603	15	203	4,6806
W6...W6'	4,6412	14	197	4,6609

Beim Vergleich mit anderen Strukturen werden, wenn nicht anders erwähnt, die unkorrigierten Daten verwendet, da dort meist keine Librationsschwingungskorrektur vorgenommen wurde. Oft ist eine Unterscheidung auch unerheblich, da die entsprechenden Standardabweichungen zu groß sind.

4.5.2.3. Diskussion und Vergleich mit anderen Strukturen

Es folgen Vergleichsstrukturen (MO_6^- , Dekawolfram-, Parawolfram-Z- und Keggintypen usw.; Iso-, gemischte Iso- und Heteropolywolframate), die dem $[\text{W}_6\text{O}_{19}]^{2-}$ -Ion gleichen oder teilweise ähnliche Strukturteile enthalten, wobei zuerst die Verbindungen angegeben sind.

- 1 Tetrabutylammoniumhexawolfram $[\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_4]_2 [\text{W}_6\text{O}_{19}]$
diese Arbeit
- 2 wie 1
G. Henning und A. Hüllen (95,96)
- 3 wie 1
H. Bierbüße (97,98)
- 4 $\alpha - [\text{CN}_3\text{H}_6]_4 [\text{V}_2\text{W}_4\text{O}_{19}]$
K. Nishikawa, A. Kobayashi and Y. Sasaki (91)
- 5 $[\text{HN}_3\text{P}_3(\text{NMe}_2)_6]_2 [\text{Mo}_6\text{O}_{19}]$
H.R. Allcock, E. C. Bissell and E. T. Shawl (104,105)
- 6 $\text{Na}_7\text{H}[\text{Nb}_6\text{O}_{19}] \cdot 15\text{H}_2\text{O}$
I. Lindqvist (102)
- 7 $\text{K}_8[\text{Ta}_6\text{O}_{19}] \cdot 16\text{H}_2\text{O}$
I. Lindqvist and B. Aronsson (103)
- 8 $[(\text{C}_4\text{H}_9)_3\text{NH}]_4 [\text{W}_{10}\text{O}_{32}]$
J. Fuchs, H. Hartl, W. Schiller und U. Gerlach (62, 63,64)

- 9 $K_2Zn_2[V_{10}O_{28}] \cdot 16H_2O$
H. T. Evans jr. (198)
- 10 $Na_{12}[MnNb_{12}O_{38}] \cdot 50H_2O$
C. M. Flynn jr. and G. D. Stucky (192)
- 11 $\alpha-Cu^{II}V^{IV}O_3$
J. R. Rea and E. Kostiner (199)
- 12 $Na_6[CeW_{10}O_{36}H_2] \cdot 30H_2O$
J. Iball, J. N. Low and T. J. R. Weakley (193)
- 13 $[NH_4]_{10}[H_2W_{12}O_{42}] \cdot 10H_2O$
G. Weiss (73)
- 14 wie 13
R. Allmann (74)
- 15 $[NH_4]_{10}[H_2W_{12}O_{42}] \cdot 4H_2O$
H. d' Amour und R. Allmann (75)
- 16 $Na_2(NH_4)_8[H_2W_{12}O_{42}] \cdot 12H_2O$
H. d' Amour und R. Allmann (76)
- 17 $Mg_5[H_2W_{12}O_{42}] \cdot 38H_2O$
Y.-H. Tsay and J. V. Silverton (77)
- 18 $Na_{10}[H_2W_{12}O_{42}] \cdot 20H_2O$
H. T. Evans jr. and O. W. Rollins (78)
- 19 $[NH_4]_6[P_2W_{18}O_{62}] \cdot nH_2O, (n=9)$
H. d' Amour (194)
- 20 $K_{10}[P_2Co_4(H_2O)_2W_{18}O_{68}] \cdot 20H_2O$

T. J. R. Weakly, H. T. Evans jr., J. S. Showell,
G. F. Tourné and C. M. Tourné (196)






Tabelle 25 Legende s. u.

Vergleichsstrukturen: Abstände in [Å] und Winkel in [Grad]

Struktur		1	2	3	4	5
Kurzform		W_6	W_6	W_6	V_2W_4	Mo_6
Datum		1976	1968/9	1971	1975	1973
R-Wert [%]		4,6	16		8,6	2,9
M...M diagonal	von	4,6412	4,61		--	--
	bis	4,6651	4,73		--	--
	Mittelw.	4,6509	4,66			
	σ	0,0015	--			
M...M kantenver- brückt	von	3,2805	3,22		3,168	3,258
	bis	3,2960	3,34		3,347	3,288
	Mittelw.	3,2886	3,28		3,267	3,274
	σ	0,0014	--		0,009	--
M-O c	koord.	6	6		6	6
	von	2,3205	2,37		2,21	2,312
	bis	2,3326	2,31		2,42	2,324
	Mittelw.	2,3254	2,33		2,31	2,319
	σ	0,0010	--		0,07	0,004
M-O t	n	1		1	1	1
	von	1,672			1,60	1,676
	bis	1,713			1,82	1,678
	Mittelw.	1,693		1,71	1,70	1,677
	σ	0,017			0,08	0,005
M-O _b kantenver- brückend	von	1,892			1,77	1,855
	bis	1,948			2,09	2,005
	Mittelw.	1,924		1,94	1,94	1,928
	σ	0,014			0,07	0,004
O _b -O _b	Mittelw.	2,643				
	σ	0,020				
O _t -O _b	Mittelw.	2,848				
r	σ	0,022				
Koordination des O		6				
O _b -O _c	Mittelw.	2,643				
s	σ	0,014				
M-O _b -M Winkel α	von	116,1				
	bis	118,4				
	Mittelw.	117,5		114		
	σ	0,7				
O _b -M-O _b Winkel β benach- barte O _b	von	85,5				82,7
	bis	87,8				91,3
	Mittelw.	86,8		87,9		87,0
	σ	0,6				0,2
O _b -M-O _b Winkel γ gegenüb.- lieg. O _b	von	151,4				152,3
	bis	153,6				153,6
	Mittelw.	152,5		156		153,1
	σ	0,6				0,2
O _b -M-O _t Winkel δ	von	102,0				101,7
	bis	105,5				105,0
	Mittelw.	103,7		102		103,2
	σ	0,7				0,2

6 Nb ₆	7 Ta ₆	8 W ₁₀	9 V ₁₀	10 Mn(Nb ₆) ₂	11 Cu(W ₆) ₂	12 Ce(W ₅) ₂
1953	1955	1976	1966	1969	1973	1974
--	--	7,5	9,4	11,7	5,0	8,3
4,6	4,4	4,615	--		--	
4,7	4,7	4,621				
4,7	4,6	4,618				
--	--	0,003				
3,2	3,3	3,251	3,052	3,31	--	3,254
3,4	3,3	3,298	3,187	3,35		3,333
3,3	3,3	3,277	3,117	3,33		3,296
--	--	0,003	0,002	0,02		0,003
		5	6	6		5
		2,27	2,218	2,35		2,24
		2,34	2,355	2,39		2,39
		2,32	2,284	2,38	2,234	2,31
		0,03	0,006	0,03	0,001	0,03
		1	1	1	1	1
		1,68	1,602	1,75		1,70
		1,76	1,612	1,77		1,80
		1,71	1,606	1,76	1,670	1,74
		0,03	0,008	0,01	0,005	0,04
		1,84	1,803	1,88		1,86
		2,06	2,077	2,06		2,05
		1,94	1,912	1,96	1,923	1,96
		0,03	0,007	0,03	0,005	0,04
		2,69		2,74		
		--		0,04		
		2,83		2,93		
		--		0,05		
		5		6		
		2,66		2,74		
		--		0,04		
		112,3	116,1	113,3		
		115,6	118,6	118,5		
		114,3	117,4	116,3		
		1,1	1,2	2,5		
	u	v		80,7		
				91,6		
				87,2		
				1,5		
				152,1		
				155,1		
				153,9		
				1,5		
				100,6		
				105,4		
				102,9		
				2,1		
Fortsetzung nächste Seite						

Tabelle 25 Fortsetzung

Vergleichsstrukturen: Abstände in [Å] und Winkel in [Grad]

Struktur Kurzform	13	14	15	16	17
	[H ₂ U ₁₂ O ₄₂]				
Datum	1969	1971	1972	1973	1973
R-Wert [%]	16,9	8,1	6,7	9,0	8,5
M...M diagonal	von bis Mittelw. σ				
M...M kantenver- brückt	von bis Mittelw. σ	3,33 3,41 3,36 --	3,297 3,390 3,340 0,016	3,273 3,369 3,326 0,003	3,327 3,373 3,351 0,003
M-O _c	koord. von bis Mittelw. σ	3 -- 2,21 0,07	3 2,27 2,32 2,29 0,03	3 2,19 2,30 2,26 0,03	3 2,22 2,29 2,26 0,035
M-O _t	n von bis Mittelw. σ	1 -- 1,76 0,07	1 1,71 1,76 1,74 0,03	1 1,70 1,75 1,72 0,03	1 1,65 1,78 1,71 0,035
M-O _b	von kantenver- brückend Mittelw. σ	-- 1,97 0,07	1,86 2,06 1,96 0,03	1,84 2,16 1,96 0,03	1,78 2,17 1,94 0,035
O _b -O _b	Mittelw. σ	2,68 0,04	2,68 0,05	--	2,66 0,03
O _t -O _b	Mittelw. σ	2,80 0,07	2,80 0,04	2,79 0,05	-- 0,03
Koordination des O _b		3	3		3
O _b -O _c	Mittelw. σ	2,54 0,04	2,56 0,05	--	2,52 0,03
M-O _b -M Winkel α	von bis Mittelw. σ				
O _b -M-O _b Winkel β	von bis benach- barte O _b Mittelw. σ				
O _b -M-O _b Winkel γ	von bis gegenüb.- lieg. O _b Mittelw. σ				
O _b -M-O _t Winkel δ	von bis Mittelw. σ				

Legende zu Tabelle 25

- M - O_b über gemeinsame Oktaederecken wurde jeweils außer Betracht gelassen, da ein solches Strukturelement im $W_6O_{19}^{2-}$ -Anion nicht enthalten ist. Für die Bindungslänge M- O_b -M spielt es jedoch keine große Rolle, ob die Bindungen kanten- (36) oder eckenverbrückend, z. B. WO_3 , MO_3 (25,202,203) sind oder welcher Winkel in den Bindungen M- O_b -M vorliegt, wenn auch die eckenverbrückenden oft etwas kürzer sind.
- 9 Bei den Abständen V...V wurde des besseren Vergleichs wegen der Abstand $V_4...V_4$, nicht verwendet. Ebenso wurden die Bindungen M- O_c und M- O_b ohne die entsprechenden Bindungen von den Vanadinatomen V_4 und V_4 , berechnet.
- 10 Es wurden nur Abstände auf der vom Mangan abgelegenen Seite berücksichtigt.
- n Zahl der endständigen O_t pro Oktaeder
- q Abstand kantenverbrückender $O_b...O_b$ oder zweifach koordinierte O_b untereinander
- r Abstand zwischen einfach und zweifach koordinierten Sauerstoffatomen

- s Abstand zwischen zweifach und mehrfach koordinierten O_C
- u Winkel von der Spitze ($W1$) aus gemessen
- v Winkel im Ring
- keine Angabe

Bei einer der aufgeführten Verbindungen, dem Tributylammoniumdekawolframat (Verbindung 8) ist ebenfalls eine Korrektur auf Librationsbewegung durchgeführt worden, sodaß sich die berechneten Abstände vergleichen lassen. Das Dekawolframat läßt sich formal aus zwei Hexawolframationen herstellen. Man entfernt aus diesen ein Oktaeder, sodaß jeweils vier neue freie Ecken entstehen, über die die Hexawolframatbruchstücke zu einem neuen Gebilde, dem Dekawolframat zusammengesetzt werden (s. Abb. 23). Wahrscheinlich sind die beiden Strukturen auch praktisch ineinander umwandelbar (36). Bei der Reaktion von $WO_3 \cdot xH_2O$ mit Tributylamin in Gegenwart von Methanol entstehen Hexa- und Dekawolframat nebeneinander, wobei sich das Mischungsverhältnis durch den Zusatz anderer Lösungsmittel variieren läßt. Ein einfacher, plausibler Umwandlungsmechanismus ist allerdings schwer erkennbar.

Aus der Abbildung erkennt man, daß sich in den beiden Strukturen die Diagonalabstände in den Viererringen

und von den benachbarten Abständen diejenigen von den Wolframatomen an der Spitze zu den Metallviererringen vergleichen lassen. Die Diagonalabstände im Dekawolframation weisen einen Durchschnittswert von $4,640(3) \text{ [Å]}$ zu $4,6688(15) \text{ [Å]}$ im Hexawolframation auf. Der kleinere Wert im Dekawolframation ist sicher durch die geringere Abstoßung bedingt, da gegenüber dem Hexawolframation die Koordinationszahl der direkten Metallionennachbarn verringert ist. Die Wolframatomabstände im Ring des Dekawolframations weisen einen Mittelwert von $3,281(3) \text{ [Å]}$ auf, der dann aus dem gleichen Grund etwas kleiner als der Mittelwert von $3,3013(15) \text{ [Å]}$ im Hexawolframation ist. Eine bessere Übereinstimmung ergibt sich, wenn man den Mittelwert der Abstände der Spitzenwolframatom von den Wolframatomen in den Viererringen bildet: $3,298(3) \text{ [Å]}$. Die Spitzenwolframatom haben die gleichen Umgebungsverhältnisse wie alle Metallatome des Hexawolframations. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt man, wenn man die unkorrigierten Werte vergleicht, da die Librationsbewegungen für die beiden Anionen größenordnungsmäßig etwa gleich sind. Auch hier sind die Metallabstände vom Spitzenwolframatome aus gemessen, $3,289(3) \text{ [Å]}$, innerhalb der Fehlergrenzen mit den Abständen der benachbarten Wolframatom, $3,2886(14) \text{ [Å]}$, im Hexawolframation gleich.

Bei der vergleichenden Betrachtung der kantenverbrückten Metallabstände zeigt sich eine gute Übereinstimmung aller hexawolframatähnlichen Ganz- oder Teilstrukturen: Mittelwert der Strukturen 1 bis 12 ohne 6, 7 und 9 gleich $3,288 \text{ [Å]}$ zu $3,2886(14) \text{ [Å]}$ im Hexawolframatom. Die Abstände im Wolframatomdreieck der Parawolframatom-Z-Strukturen 13 bis 17 haben im Durchschnitt einen etwas größeren Wert von $3,34 \text{ [Å]}$, der sich bei dem Kegginstrukturtyp nochmals erhöht auf $3,381(4) \text{ [Å]}$ (Struktur 19). Bei der Struktur 22 wird sogar ein Wert von $3,486 \text{ [Å]}$ angegeben. Der kleinste Metall - Metallabstand tritt im Dekavanadat, Struktur 9, auf: $3,117(2) \text{ [Å]}$. In den Strukturen 23 und 24 liegen neben WO_4 -Tetraedern Vierergruppen aus tetraedrisch kombinierten WO_6 -Oktaedern vor, deren kantenverbrückte Metallabstände die Mittelwerte $3,39(1)$ und $3,36 \text{ [Å]}$ aufweisen.

Von den Metallsauerstoffabständen haben diejenigen zu den zentralen drei- bis sechsfach koordinierten Sauerstoffatomen O_c die größten Werte. Die Strukturtypen von 1 bis 12, ausgenommen die Strukturen 9 und 11 (Koordination des O_c sechs und fünf) weisen einen Mittelwert $\text{M} \cdots \text{O}_c$ von $2,328 \text{ [Å]}$ zu $2,3254(10) \text{ [Å]}$ bei Struktur 1 auf. Im Dekavanadat und α -Kupfervanadat, Struktur 9 und 11, ergeben sich kürzere $\text{M} \cdots \text{O}_c$ -Werte: $2,284(6)$ und $2,234(1) \text{ [Å]}$. Bei den Parawolframatom-Z-

Strukturen weisen diese Abstände wegen der nur 3-fachen Metallkoordination (und 0,5-fach durch Wasserstoff (87,74)) der Sauerstoffatome einen geringeren Durchschnittswert von 2,254 [Å] auf. Bei den Kegginstrukturen 19, 21 und 22 liegt der Durchschnittswert für $M-O_c$ (dreifache Koordination der O_c durch Wolfram, einfache durch Phosphor bzw. Vanadin) mit 2,33 [Å] näher beim Wert des Hexametallats. Obwohl in den Strukturen 23 und 24 das zentrale Sauerstoffatom 4-fach von Wolfram koordiniert ist, ergibt sich mit einem Mittelwert von 2,19 [Å] ein geringerer Wert als beim Parawolframat-Z, bei dem die drei einwirkenden Wolfram-atome auf einer Seite des O_c liegen und damit besser mit den Hexametallaten übereinstimmen.

Die kürzeste Verbindung liegt jeweils bei den einfach koordinierten Sauerstoffatomen mit erheblichem Doppelbindungsanteil vor, wobei die Oktaeder betrachtet werden, die nur ein endständiges Sauerstoffatom aufweisen. Hier ergeben sich für fast alle Strukturen nahe beieinanderliegende Werte für die $M-O_t$ -Bindung: Hexawolframation gleich 1,693(17) [Å], Hexametallattypen ohne Struktur 9, Mittelwert gleich 1,708 [Å], Parawolframat-Z, Mittelwert gleich 1,735 [Å], Keggintypen außer Struktur 21, Mittelwert gleich 1,703 [Å]. Für die Struktur 21 wird ein wahrscheinlich zu großer Wert von

1,84 [Å] angegeben. Im Dekavanadation weist die $V=O_t$ -Bindung einen Wert von 1,606(8) [Å] auf. Wie auch bei anderen Strukturen festzustellen ist, zeigen die Ortskoordinaten der endständigen Sauerstoffatome, O_t , größere Fehler (ca. 30%) als die bindenden (kantenverbrückenden) Sauerstoffatome, O_b . Durch die Bindung in nur einer Richtung (wenn auch mit Doppelbindungscharakter) ergibt sich eine verminderte Fixierung der terminalen Sauerstoffatome. Die negativen Ladungen der Polyanionen sind zwar bevorzugt auf die endständigen Sauerstoffatome verteilt, aber ein auf der höheren Konzentration von Elektronen bei den O_t 's beruhender gegenläufiger Effekt, die genauere Bestimmung der Lage von Atomen mit mehr Elektronen, kommt gegen die verminderte Fixierung nicht zum Tragen. Auch die Temperaturfaktoren sind durchschnittlich größer (ebenfalls ca. 30%).

Die Ergebnisse für die Mittelwerte der $M=O_b$ -Bindungen (kantenverbrückend) zeigen ebenfalls keine große Streuung. Sie reichen von 1,91(4) [Å], Struktur 19, bis 2,00(5) [Å], Struktur 22. Das einheitlichste Bild liegt bei den Parawolframat-Z-Typen vor: Durchschnittswert 1,955 [Å]. Bei den Kegginstrukturtypen ergibt sich ein mittlerer Wert von 1,95 [Å] und wenn man alle angegebenen Durchschnittswerte der Strukturen 1 bis 12 mittelt, erhält man einen Wert von 1,936 [Å].

Das Hexawolframatom, Struktur 1, hat eine Bindungslänge $M-O_b$ gleich $1,924(14)$ [Å]. Ein besonders interessanter Vergleich bietet sich hier mit dem Hexamolybdat, Struktur 5, an. Das Ergebnis der Mittelung der Einzelwerte ergibt mit $1,928(4)$ [Å] einen Wert, der sich innerhalb der Fehlergrenzen mit dem für das Hexawolframatom deckt. Bei der Untersuchung der Einzelwerte zeigen sich jedoch Unterschiede. Die Schwingungsbreite der $M-O_b$ -Bindung beim Hexawolframatom ist mit $1,892 - 1,948$ [Å] deutlich geringer als beim Hexamolybdat mit $1,855 - 2,005$ [Å]. Auf diese Tatsache wurde schon von R. Mattes, H. Bierbüße und J. Fuchs (97,98) hingewiesen. In den IR-Spektren des $[Mo_6O_{19}]^{2-}$ - im Gegensatz zum $[W_6O_{19}]^{2-}$ -Ion sind die Schwingungsbanden, an denen Brückenbindungen beteiligt sind, stark verbreitert (bis zu 80 $[cm^{-1}]$ Halbwertsbreite). Besonders ist dies an der breiten Bande der Symmetrieklasse (F_{1u}) mit der Wellenzahl 602 $[cm^{-1}]$ beim Hexamolybdat festzustellen, die beim Hexawolframatom den Wert 587 $[cm^{-1}]$ (s. Abb. 32 und Besprechung der Spektren, Anhang) hat und schmal ist. Die unterschiedlich langen $M-O_b$ -Bindungen existieren auch in anderen Molybdänverbindungen (z. B. 99,100,194). Sie weisen aber nicht nur eine größere Schwingungsbreite auf, sondern man kann einen regelmäßigen Wechsel von kurzer und langer $M-O_b$ -Bindung feststellen,

während dies bei den Wolframverbindungen nicht der Fall ist. So finden sich im $[\text{Mo}_6\text{O}_{19}]^{2-}$ -Ion (104,105) nachstehende $\text{Mo}-\text{O}_\text{B}$ -Reihenfolgen $[\text{R}]$ (Abb. 30, Anhang):

Ring 1:

$\text{Mo3}-2,005-09-1,859-\text{Mo2}-1,996-08-1,855-\text{Mo3}'$

Ring 2:

$\text{Mo3}-1,911-06-1,945-\text{Mo1}-1,906-07'-1,948-\text{Mo3}'$

Ring 3:

$\text{Mo2}-1,886-04-1,944-\text{Mo1}-1,914-05-1,961-\text{Mo2}'$

Die $[\text{W}_6\text{O}_{19}]^{2-}$ -Ionen (019) und (020) enthalten folgende $\text{W}-\text{O}_\text{B}$ -Reihen $[\text{R}]$ (Abb. 24, 25 und Abb. 31, Anhang):

Anion (019)

Ring 1:

$\text{W1}-1,921-05-1,929-\text{W2}-1,926-09-1,948-\text{W1}'$

Ring 2:

$\text{W1}-1,944-04-1,913-\text{W3}-1,935-01-1,936-\text{W1}'$

Ring 3:

$\text{W3}-1,914-06-1,929-\text{W2}-1,892-08-1,941-\text{W3}'$

Anion (020)

Ring 1:

$\text{W4}-1,897-013-1,938-\text{W5}'-1,909-011'-1,936-\text{W4}'$

Ring 2:

$\text{W4}-1,895-015-1,943-\text{W6}-1,912-017'-1,924-\text{W4}'$

Ring 3:

$\text{W6}-1,906-018'-1,927-\text{W5}'-1,936-016'-1,922-\text{W6}'$

Auch beim Vergleich der beiden Anionen $[P_2Mo_{18}O_{62}]^{6-}$ und $[P_2W_{18}O_{62}]^{6-}$ (194) lassen sich diese Feststellungen machen. Deutlich zeigen sich hier bei der Molybdänverbindung alternierende $Mo-O_b$ -Verbindungen (in der endständigen Oktaederdreiergruppe):

Mo7	1,85	
	2,02	027
Mo9	1,82	
	2,05	029
Mo8	1,82	
	2,08	031
Mo7		

Bei der entsprechenden Wolframverbindung treten solche durchgehend alternierende $W-O_b$ -Bindungen nicht auf (allerdings streuen hier die Werte sehr). Auch bei der Betrachtung der $W-O_b$ -Bindungen im Dekawolframat ergibt sich ein Bereich wechselnder Bindungslängen, der zwar einen größeren Längenbereich als beim Hexawolframat umfaßt, aber auch keine durchgehend alternierenden Bindungen aufweist.

Ein weiterer Unterschied zwischen Molybdän- und Wolframverbindungen zeigt sich bei den oben genannten Heteroverbindungen und den einfacheren $[PM_9O_{31}(H_2O)_3]^{3-}$ -Heteropolyionen ($M = Mo, W$) (194). Der Metallsechser-

ring der Kegginteilstrukturen ist bei M gleich M_0 stark gewellt, $\Delta Z = 0,5 \text{ [\AA]}$ (Z = absolute Koordinate in Richtung der (pseudo)-dreizähligen Achse), während dies bei M gleich W kaum der Fall ist, $\Delta Z = 0,08 \text{ [\AA]}$.

Dunitz und Orgel (204,205), H. D. Megaw (206) und L. Pauling (207) machen Vorschläge zum Verständnis des Koordinationswechsels bei abnehmendem Radius. Wenn man die Ionen als endliche, geschlossene Kugeln betrachtet, läßt sich berechnen, daß oktaedrische Koordination bei einem Radienverhältnis von 0,414 oder größer und tetraedrische darunter vorliegen muß. Wenn man für das O^{2-} -Ion einen Radius von $r = 1,4 \text{ [\AA]}$ ansetzt, müßte hiernach ein Metall mindestens einen Radius von $r = 0,58 \text{ [\AA]}$ aufweisen, um oktaedrisch von Sauerstoff koordiniert zu sein. Tatsächlich existieren neben regelmäßigen Oktaedern und Tetraedern alle möglichen Übergangsstufen, die man als mehr oder weniger stark verzerrte Oktaeder auffassen kann (z. B. in der Reihe WO_3 , MoO_3 , CrO_3). Zur Interpretation verwenden Dunitz und Orgel den "contact radius" oder effektiven Radius (unter anderem Berücksichtigung der Kompressibilität von Ionen) anstatt der herkömmlichen Ionenradien. Aus den experimentell gefundenen Übergangsstufen läßt sich eine Reihe von abnehmenden effektiven Radien aufstellen. So ergibt sich für die Übergangsmetallionen mit leeren d-Schalen ungefähr folgende

Ordnung: Hf^{4+} (kubisch koordiniert), Zr^{4+} , Ti^{4+} , Ta^{5+} , Nb^{5+} , W^{6+} , Mo^{6+} , V^{5+} , Cr^{6+} , Mn^{7+} (tetraedrisch koordiniert). Im Vergleich mit Wolfram weisen Molybdänsauerstoffverbindungen größere Verzerrungen auf. Da man bei diesen Betrachtungen auch die Vorstellung von reinen Ionen in Richtung auf eine Beteiligung von kovalenten Bindungen ändern muß (bei den $\text{M} \text{---} \text{O}_t$ bis zur vollen Doppelbindung), läßt sich das Alternieren der $\text{Mo} \text{---} \text{O}_b \text{---} \text{Mo}$ -Bindung verstehen, da eine Verkürzung der einen Bindung ein Längerwerden der anderen nach sich zieht. Eine solche kooperative Verzerrung tritt aber erst bei den größeren Abweichungen, wie sie bei den Molybdänverbindungen vorkommen, deutlich in Erscheinung.

Nach H. D. Megaw (206) haben die Kanten der Sauerstoffoktaeder, die eine kurze $\text{M} \text{---} \text{O}$ -Bindung einschließen, etwas größere Werte als die mit durchschnittlicher oder langer $\text{M} \text{---} \text{O}$ -Bindung, wobei hier die Metallsauerstoffoktaeder betrachtet werden, deren effektiver Metallradius etwas kleiner als der oktaedrische Hohlraum ist. Dies kann auch beim Hexawolframat festgestellt werden: Die Oktaederkanten $\text{O}_b \text{---} \text{O}_t$, die die kurzen $\text{M} \text{---} \text{O}_t$ -Bindungen einschließen, sind im Durchschnitt 2,848(22) [Å] lang. Die Kanten $\text{O}_b \text{---} \text{O}_b$ haben eine durchschnittliche Länge von 2,643(20) [Å] und die Kanten $\text{O}_b \text{---} \text{O}_c$ ebenfalls 2,643(14) [Å]. Es ist nicht eindeutig, ob die Kanten-

länge $O_b \text{---} O_c$ aus chemisch relevanten Gründen denselben Wert wie die Kanten $O_b \text{---} O_b$ aufweisen, denn allein durch geometrische Überlegungen ergibt sich, daß die Abstände der Mittelpunkte von 12 gleichgroßen, sich auf einer Kugeloberfläche befindenden und sich berührenden Kugeln gleich den Abständen der Mittelpunkte der Kugeln vom Zentrum der inneren Kugel sind, d. h. die innere Kugel ist von gleicher Größe. Dieselben Verhältnisse wie beim Hexawolframatom finden wir z. B. auch bei der Struktur 10, wo die Kantenlängen $O_b \text{---} O_b$ und $O_b \text{---} O_c$ 2,74(4) und $O_b \text{---} O_t$ 2,93(5) [Å] betragen.

Im Falle der Oktaeder des Hexawolframats kann man, bedingt durch die Versetzung des Wolframatoms in der Richtung $O_c \text{---} W \text{---} O_t$ von "one-corner displacement" (206) sprechen. Beim Hexamolybdat kommt noch eine geringe Versetzung durch die alternierenden $Mo \text{---} O_b$ -Bindungen in zwei weiteren Richtungen hinzu, sodaß daraus ein "three-corner displacement" resultiert. Im Gegensatz zum Hexawolframatom mit einer geringen Schwankung beim Winkel β von 85,5 - 87,8 [Grad] weist das Hexamolybdat deshalb die Schwankungsbreite von 82,7 - 91,3 [Grad] auf.

H. d' Amour (194) begründet die geringere Wellung des Sechseringes des $[P_2W_{18}O_{62}]^{6-}$ -Ions gegenüber der entsprechenden Molybdänverbindung (s. o.) mit der größeren

Ausdehnung der 5d-Orbitale der Wolframatome. (Nach R. W. Shannon und C. T. Prewitt (208,209) haben die Ionen W^{6+} und Mo^{6+} beide den Radius 0,60 [Å], sodaß sich hieraus keine unterschiedlichen Strukturmerkmale ableiten lassen. (Im Handbook of Chemistry (210) sind für beide Ionen $r = 0,62$ [Å] angegeben.) Dies führt zu einer stärkeren Harmonisierung der $W=O$ -Einfachbindungen. Außerdem verhindert die schwächere Kompressibilität der inneren Elektronen der W^{6+} -Ionen eine starke Asymmetrie dieser Bindungen. Diese Modellvorstellungen lassen sich auch zur Erklärung der unterschiedlichen Schwankungsbreiten von Molybdän- und Wolframsauerstoffverbindungen heranziehen.

Wie sich aus der Betrachtung der Kantenlängen (gleich der Sauerstoffatomabstände) ergibt, haben wir es, oberflächlich gesehen, mit annähernd regulären Sauerstoffoktaedern zu tun und die Verzerrungen resultieren praktisch nur aus der "off center"-Verschiebung der Wolframatome. So sind die Winkel, die bei einem idealen Aufbau nur die Werte 90 oder 180 [Grad] aufweisen würden, stark verändert. Es ergeben sich beim Hexawolframat folgende Verhältnisse (in Klammern die Winkelwerte bei Idealverhältnissen): Der Mittelwert für die Winkel Wolfratom - bindendes (kantenverbrückendes) Sauerstoffatom - Wolfratom (90) beträgt $\alpha = 117,5(7)$ [Grad], der Mittelwert für die Winkel $O_b - W - O_b$ (90) (benachbarte

Sauerstoffatome) beträgt $\beta = 86,8(6)$ [Grad], der Mittelwert für die Winkel $O_b - W - O_b$ (180) (gegenüberliegende Sauerstoffatome) beträgt $\gamma = 152,5(6)$ [Grad], und der Mittelwert für die Winkel $O_b - M - O_t$ (90) beträgt $\delta = 103,7(7)$ [Grad]. Diese Mittelwerte decken sich innerhalb der angegebenen Fehlergrenzen mit den Mittelwerten der entsprechenden Winkel der Strukturen 5 und 10 (Hexametalate) und für den Winkel α mit den Werten des Dekawolframats (Struktur 8), die für den Wolframat - Sauerstoffatomachtering angegeben sind, wo die gleichen Bindungsverhältnisse wie im Hexawolframat herrschen.

4.5.3. Kraftkonstanten und Bindungsordnung

Die Berechnungen dieser Strukturanalyse und die Struktur 5 (das Hexamolybdation) zeigen im Vergleich mit der Struktur 2 (Normalkoordinatenanalyse - Hexametalate), deren Werte zum Teil aus anderen Strukturberechnungen (96,99,100) übernommen und zum Teil aufgrund geometrischer Überlegungen (97,98) berechnet wurden, größenordnungsmäßig das gleiche Ergebnis. Mit den genauen Werten des Hexawolframat- und des Hexamolybdations müßten sich jetzt noch verfeinerte Kraftkonstanten berechnen lassen. Die vorhandene Übereinstimmung zeigt jedoch die Richtigkeit der Berechnungsgrundlage der Normalkoordinatenanalyse (die Normal-

schwingungen des betreffenden Moleküls entsprechen den Grundfrequenzen).

Die Berechnung (97,98) der Kraftkonstanten beim $[W_6O_{19}]^{2-}$ -Ion ergaben für die Bindung $W=O_t$ einen Wert von $8,1 \text{ [mdyn/\AA]}$, $W=O_b$: $3,7 \text{ [mdyn/\AA]}$ und $W=O_c$: $0,89 \text{ [mdyn/\AA]}$. Diese Werte verhalten sich ähnlich wie die der anderen Hexametallate etwa wie $8 : 4 : 1$. Da das Verhältnis der Valenzkraftkonstanten im allgemeinen dem Verhältnis der Bindungsordnungen entspricht, kann man annehmen, daß die Bindungen $W=O_t$ weitgehend Doppelbindungs- ($\sigma\pi-d\pi$) und die Bindungen $W=O_b$ Einfachbindungscharakter haben. Der geringe Wert für die Bindungen $W=O_c$ zeigt, daß sie weitgehend ionischer Natur sind.

Diese Feststellungen lassen sich auch qualitativ und quantitativ durch den Vergleich der Bindungslängen $W=O$ im Hexawolframat machen, denn es besteht eine Beziehung zwischen Bindungslänge und Bindungsordnung (211-220).

L. Pauling definierte Bindungsstärke (Bindungsordnung) als die (formale) Wertigkeit eines Kations geteilt durch die Koordinationszahl. Diese Formulierung wird nach heutiger Auffassung dahingehend verändert, daß man definiert: Die Summe der Bindungsordnungen (BO) [angegeben in Valenzeinheiten VE] ergibt zahlenmäßig die (formale)

Wertigkeit eines Kations (wobei auch das Wort "Kation" nur formal zu verstehen ist). Es sind eine ganze Reihe von Versuchen gemacht worden, die Beziehung Bindungsordnung - Bindungslänge für regelmäßige und verzerrte Koordinationspolyeder für einzelne Kationen oder Gruppen von Kationen in mathematischen Gleichungen zu fassen (74,214-220). So wird z. B. von G. Donnay und R. Allmann (213,74,218) folgende Gleichung angegeben:

$$BO = \left(\frac{d_1(M-O)}{d(M-O)} \right)^5 \quad (G \ 31)$$

$$d_1(Mo) = 1,898$$

$$d_1(W) = 1,91$$

sowie eine Gleichung von F. A. Schröder (215) mit modifizierten Konstanten (216):

$$\lg BO = [d_1(M-O) - d(M-O)]/a \quad (G \ 32)$$

$$d_1(Mo) = 1,886$$

$$a(Mo) = 0,624$$

$$d_1(W) = 1,91$$

$$a(W) = 0,82$$

(Diese Gleichung entspricht der von L. Pauling vorgeschlagenen (217):

$$d(A-B) = d_0 - 2k \lg BO)$$

Eine dritte Gleichung für Molybdänkomplexe stammt von

I. D. Brown und K. K. Wu (220,215):

$$BO = 1,5(R/R_1)^{-N_1} \quad (G\ 33)$$

$$R_1(\text{Mo}) = 1,761 \quad R = d(\text{Mo-O})$$

$$N_1(\text{Mo}) = 5,45$$

Die Berechnungen für das Hexamolybdat (Struktur 5) ergeben folgende Werte:

a) nach (G 31)

Bindung	[Å]	BO	Summe BO
Mo—O _t	1,677	1,857	1,86
Mo—O _b	1,928	0,925	x4 = 3,70
Mo—O _c	2,319	0,367	0,37
			<u>5,93</u> [VE]

b) nach (G 32)

Bindung	[Å]	BO	Summe BO
Mo—O _t	1,677	2,162	2,16
Mo—O _b	1,928	0,856	x4 = 3,42
Mo—O _c	2,319	0,202	0,20
			<u>5,78</u> [VE]

c) nach (G 33)

Bindung	[R]	BO	Summe BO
Mo—O _t	1,677	1,958	1,96
Mo—O _b	1,928	0,916	x4 = 3,66
Mo—O _c	2,319	0,335	0,34
			<u>5,96</u> [VE]

Die Werte aus a und c liegen dem gewünschten Wert 6 [VE] sehr nahe. Auch derjenige aus b zeigt mit 3,8% Abweichung noch eine ausreichende Übereinstimmung.

Mit den Werten dieser Strukturanalyse ergibt sich folgendes:

a) nach (G 31)

Bindung	[R]	BO	Summe BO
W—O _t	1,693	1,828	1,83
W—O _b	1,924	0,964	x4 = 3,86
W—O _c	2,3254	0,374	0,37
			<u>6,06</u> [VE]

b) nach (G 32)

Bindung	[R]	BO	Summe BO
W—O _t	1,693	1,839	1,84
W—O _b	1,924	0,962	x4 = 3,85
W—O _c	2,3254	0,312	0,31
			<u>6,00</u> [VE]

Auch hier wird sehr gut der Wert entsprechend der Oxidationsstufe 6 der Wolframatome erreicht. Da die Gleichungen (G 31) - (G 33) aus bekannten, gesicherten Strukturergebnissen entwickelt wurden, kann man sagen, daß die Ergebnisse der Strukturanalyse des Hexamolybdatons und des Hexawolframatons sich in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer Strukturaufklärungen befinden, d. h. daß die berechneten $M-O$ -Bindungslängen "richtig" sind.

4.5.4. Die Struktur der Kationen

Die Lage der Kationen im Verhältnis zu den Anionen ergibt sich aus den Abb. 18 bis 20. Die Abb. 27 und 28 zeigen die Kationen mit Nummerierung und Bindungslängen. Die Bindungslängen und Winkel mit Standardabweichungen sind in den Tabellen 28 und 29 (im Anhang) aufgeführt.

Im allgemeinen decken sich die erhaltenen Werte mit den in der Literatur (210) veröffentlichten. Einzig die Bindungslängen Stickstoffatome - Kohlenstoffatome sind größer als die Literaturwerte, z. B. für Tetramethylammoniumionen (210), $N-C$ gleich 1,47 [Å], während hier ein Mittelwert von 1,54(3) [Å] gefunden wurde (kleinster Wert 1,49(4) [Å], größter Wert 1,58(4) [Å]). Der Mittelwert der Kohlenstoffatom - Kohlenstoffatom-

bindungslängen beträgt 1,52(5) (von 1,34 bis 1,60) [Å]
Die Winkelwerte C—N—C an beiden Stickstoffatomen
ergaben im Mittel den Tetraederwinkel 109,5(17) (von
104,1 bis 114,2) [Grad] und die Winkel in den Kohlen-
stoffketten N—C—C und C—C—C den Mittelwert
von 111,9(24) (von 106,1 bis 118,3) [Grad]. Da die
Kohlenstoffketten an einer Seite jeweils am Rest $-NR_3$
befestigt und auf der anderen frei beweglich sind, ist
in Richtung auf dieses freie Ende eine immer größere
Temperaturbewegung zu erwarten (ähnlich wie beim Tribu-
tylammoniumdekawolframmat (63,64)). Tatsächlich ist dies
durchschnittlich auch der Fall (Tabelle 3). Gleich-
zeitig erhöhen sich die Standardabweichungen der Orts-
parameter und der Bindungslängen. Besonders große Tem-
peraturfaktoren weisen die Kohlenstoffatome C114 und
C122 bis C124 auf. Es ist möglich, daß es sich hier
nicht um Temperaturbewegung, sondern um von Elementar-
zelle zu Elementarzelle unterschiedliche Aufenthalts-
orte dieser Kohlenstoffkettenglieder handelt. Gestützt
wird diese Vermutung durch die flachen und sehr brei-
ten Maxima dieser Atome in der Differenzfouriersyn-
these, auch ist eine derartige mangelnde Fixierung der
aliphatischen Reste aufgrund der räumlichen Gegebenhei-
ten vorstellbar.

4.5.5. Wasserstoffatomlagen und Signifikanztest

Zur Feststellung der restlichen Elektronendichte $[e/\text{\AA}^3]$ wurde eine Differenzfouriersynthese mit allen verfeinerten Werten berechnet. Hierbei ergaben sich, wie erwartet, verschwommene Maxima im Bereich der Anionen (speziell der Wolframatom) bis in Höhe von $0,8 [e/\text{\AA}^3]$, was auf eine gute Auflösung der Positions- und Temperaturparameter der Wolframatom hinweist. Es wurden außerdem Restmaxima bis $0,7 [e/\text{\AA}^3]$ im Bereich um die Kohlenstoffatom gefunden und zwar in Abständen (ca. $1 [\text{\AA}]$), die C—H-Bindungen entsprechen. Die Schwierigkeit bei der Suche von Wasserstoffatomen besteht vor allem prinzipiell in dem stark unterschiedlichen Gehalt an Elektronen der im Molekül beteiligten Atome: Neben 6 Wolframatom mit je 74 Elektronen sind 72 Wasserstoffatom mit je einem Elektron vorhanden. Bei entsprechenden Molybdänstrukturen sind Angaben über die Wasserstoffatom schon gemacht worden (104,221). Für das Parawolfram-Z ($R = 8,1\%$) hat R. Allmann die Lage der nichtsauren Wasserstoffatom angegeben (74), wenn auch aufgrund von Berechnungen der Bindungsstärken.

Zum Versuch, die Wasserstoffatom mit Hilfe der restlichen Elektronendichte zu finden, wurden verschiedene Differenzfouriersynthesen berechnet:

ohne die Elektronendichte von

- a) W , O , N Temperaturfaktoren anisotrop
- b) W , O , N T. anisotrop, C T. isotrop
- c) W , O , N T. anisotrop, C T. anisotrop
- d) und e) wie b) und c), zusätzlich mit berechneten oder "gefundenen" H-Atomen, T. isotrop

Bei der Berechnung der anisotropen Temperaturfaktoren für die Kohlenstoffatome sank der R-Wert (G 13) von 4,586% auf 4,3913%. Um entscheiden zu können, ob diese Verbesserung signifikant oder allein durch die Vermehrung der Parameter entstanden ist, wurde der Signifikanztest von W. C. Hamilton (222) durchgeführt.

$$X = \frac{R_Q}{R_0} \quad (G\ 34)$$

R_Q = R-Wert zu Beginn

R_0 = R-Wert mit zusätzlichen Parametern

X = Testgröße

Der Wert X wird verglichen mit Tabellenwerten für

$X_{b;n-m;\alpha}$

$$X_{b;n-m;\alpha} = \left[\frac{b}{n-m} \cdot F_{b;n-m;\alpha+1} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (G\ 35)$$

F = Quotient der Quadrate der Standardabweichungen (Varianzenquotient)

b = Anzahl der zusätzlichen Parameter von

R_Q nach R_0

n = Anzahl der Reflexe

m = Anzahl der Parameter (R_0)

α = Maß für die Wahrscheinlichkeit

Die Werte für $X_{b;n-m;\alpha}$ sind für verschiedene Werte von α tabelliert (222). Sie wurden wegen der großen Anzahl an Parametern und Reflexen extrapoliert. Der Wert X muß größer sein als der Wert $X_{b;n-m;\alpha}$, um für die angegebene Wahrscheinlichkeit eine positive Aussage machen zu können.

Die Berechnung ergab:

$$n = 5065 \qquad n-m = 4517$$

$$m = 548 \qquad b = 160$$

$$X = \frac{R_Q}{R_0} = \frac{4,586}{4,3913} = 1,0444$$

mit den gewichteten R-Werten (G 14):

$$R_Q = 4,7552$$

$$R_0 = 4,5954$$

$$X = 1,0348$$

$$X_{160;4517;0,005} = 1,0193$$

Ergebnis: R_0 ist mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 99,5% signifikant besser als R_Q , d. h. die Werte sprechen für die Angabe von anisotropen Schwingungen der Kohlenstoffatome.

Zusätzlich zu den Differenzfouriersynthesen wurden mit Hilfe des Rechenprogrammteils "BONDAT" 48 Wasserstoffatompositionen der jeweils ersten drei Kohlenstoffatome jeder Butylkette berechnet. Dies geschah auf der Grundlage der bekannten tetraedrischen Anordnung der Atome bei den aliphatischen Ketten. Mit diesen Werten konnte gezielt nach den H-Atomen in den "E-maps" gesucht werden.

Die "gefundenen" (Restmaxima im Bereich der anisotrop verfeinerten Kohlenstoffatome bis $0,6 \left[e/\text{\AA}^3 \right]$) und berechneten Wasserstoffatomlagen waren dann Grundlage einer Kleinste-Quadrateverfeinerung, wobei die Temperaturfaktoren zu Beginn auf $U = 0,08 \left[\text{\AA}^2 \right]$ gesetzt wurden. Zur rechnerischen Erzeugung der $8 \cdot 3 = 24$ Endwasserstoffatome (an den jeweils vierten Kohlenstoffatomen jeder Kette) mußte die Position von wenigstens einem H-Atom der CH_3 -Gruppe aus den Differenzfouriersynthesen gefunden werden, da aufgrund der geringen Energieschwelle von 3 kcal/Mol (223) nicht unbedingt davon ausgegangen werden konnte, daß die Wasserstoffatome auf Lücke stehen.

Differenzfouriersynthesen d) und e) mit den so bestimmten Wasserstoffatomen brachten ein weiteres Absinken der Elektronendichtemaxima auf etwa $0,4 \left[e/\text{\AA}^3 \right]$. Bei der Verfeinerung stellte sich heraus, daß etwa

die Hälfte der Wasserstoffatome mit zu großen Temperaturfaktoren berechnet wurden oder Ortskoordinaten entstanden, die zu kurz oder zu lang für chemisch sinnvolle Kohlenstoffatom - Wasserstoffatombindung waren. Es ließ sich aus dem Datenmaterial abschließend für die einzelnen Wasserstoffatome nicht mit ausreichender Genauigkeit entscheiden, ob sich an der berechneten Stelle tatsächlich ein Wasserstoffatom befindet. Durchschnittlich ergab sich jedoch bei der Verwendung der mit "BONDAT" berechneten Wasserstoffatompositionen (ohne Endwasserstoffatome) und einmaliger Verfeinerung eine signifikante Verbesserung (mit 99,5% statistischer Wahrscheinlichkeit) des R-Wertes (auf 4,266%) gegenüber dem R-Wert ohne Berücksichtigung der Wasserstoffatome.

$X = 1,0294$ mit konventionellen R-Werten

$X = 1,0401$ mit gewichteten R-Werten

$X_{191;4328;9005} = 1,0220$

Es werden deshalb hier nur die mit "BONDAT" berechneten Ortsparameter der 48 Wasserstoffatome (ohne die H-Atome der CH_3 -Gruppen) angeführt (Tabelle 26).

Die Möglichkeit von Wasserstoffbrückenbindungen kann bei dieser Struktur ausgeschlossen werden. Die Entfernung der Kohlenstoffatome von den Sauerstoffatomen ist größer, als die Summe der van der Waals' schen Radien,

Tabelle 26

Fraktionelle Atomkoordinaten der Wasserstoffatome ohne CH₃-Gruppen, berechnet mit "BONDAT".

Atom	x	y	z
H1111	0.3039	0.1815	0.9380
H1112	0.3983	0.2525	0.9457
H1121	0.4440	0.2824	-0.0488
H1122	0.3513	0.1975	-0.0639
H1131	0.4036	0.4720	-0.0231
H1132	0.3152	0.4141	0.0352
H1211	0.7138	-0.0043	0.0457
H1212	0.6327	-0.0718	-0.0270
H1221	0.7012	0.2083	0.0555
H1222	0.6055	0.1564	0.0696
H1231	0.6238	0.1500	0.0489
H1232	0.7197	0.1951	0.0320
H1311	0.6559	-0.0529	0.2064
H1312	0.6509	0.1110	0.2425
H1321	0.7711	0.0049	0.1938
H1322	0.7650	0.1594	0.2062
H1331	0.8385	0.2258	0.3616
H1332	0.7514	0.2345	0.4391
H1411	0.4750	0.1097	0.9018
H1412	0.4542	-0.0575	0.7877
H1421	0.4629	0.0254	0.6370
H1422	0.4823	0.1930	0.7508
H1431	0.5898	0.1651	0.7914
H1432	0.5688	-0.0075	0.6891
H2111	0.0160	0.2185	0.5171
H2112	0.0492	0.1519	0.5911
H2121	0.0087	0.4257	0.7189
H2122	-0.0271	0.2882	0.7569
H2131	0.9473	0.1633	0.7033
H2132	0.9829	0.3112	0.6809
H2211	0.1098	0.5029	0.6099
H2212	0.1848	0.4669	0.5018
H2221	0.0427	0.2914	0.3922
H2222	0.0695	0.4591	0.4094
H2231	0.9244	0.4105	0.5525
H2232	0.9383	0.5866	0.6390
H2311	0.1504	0.1191	0.4652
H2312	0.1135	0.1611	0.3750
H2321	0.2282	0.3071	0.3492
H2322	0.2660	0.2838	0.4517
H2331	0.2006	0.0542	0.2230
H2332	0.2939	0.1373	0.2275
H2411	0.2291	0.4179	0.6251
H2412	0.1538	0.4454	0.7345
H2421	0.1334	0.2104	0.7091
H2422	0.2170	0.2041	0.6186
H2431	0.2405	0.2712	0.8250
H2432	0.2762	0.4136	0.7939

außer zwischen dem Kohlenstoffatom C132 und dem Sauerstoffatom O6, wo der Abstand $3,18(4) \text{ [Å]}$ beträgt und damit einer Berührung der beiden Atome entspricht (224,225). Allerdings könnte dieser Abstand bei dazwischenbefindlichem Wasserstoffatom auch einer schwachen Wasserstoffbrückenbindung entsprechen (223,224,225-228) (Einbettung des Wasserstoffatoms in die Elektronenwolke der beiden Bezugsatome). Tatsächlich befinden sich jedoch die beiden Wasserstoffatome H1321 und H1322 des Kohlenstoffatoms C132, gespreizt durch den Tetraederwinkel von $109,5 \text{ [Grad]}$, symmetrisch außerhalb der Verbindungslinie C132...O6, sodaß ein größerer O...H-Abstand resultiert. Die Berechnung ergibt mit: H1321...O6, $d = 2,70 \text{ Å}$ und H1322...O6, $d = 2,72 \text{ [Å]}$ wiederum Abstände, die mit den Summen der van der Waals' schen Radien des Wasserstoff- ($1,20 \text{ [Å]}$) und Sauerstoffatoms ($1,52 \text{ [Å]}$) in Einklang stehen (224,225,227). Auch an anderen Stellen können auf Grund der gefundenen Abstände keine starken Wechselwirkungen zwischen den Atomen des Kohlen-, Wasser- und Sauerstoffs angenommen werden.

Erwartungsgemäß kann sich das positiv geladene, tetraedrisch von Kohlenstoffatomen umgebene Stickstoffatom den Anionen nicht soweit nähern, daß eine Einwirkung möglich wäre, wie dies etwa beim Tributylammoniumdekawolframat über eine N...H...O-Wasserstoffbrücke mit

einer Entfernung von ca $3 \text{ \AA}$ der Fall ist (63,64). Die kürzeste Entfernung eines Stickstoff- und eines Sauerstoffatoms beträgt (N1...O2) $4,06 \text{ \AA}$. Die kürzeste Entfernung zwischen einem Stickstoffatom und einem Wolframatom ist der Abstand N2...W1 mit $5,163 \text{ \AA}$.

4.5.6. Diffuse Beugungserscheinungen

Auf sehr lange (2 - 3 Wochen) belichteten Filmaufnahmen erkennt man neben den Braggreflexen diffuse Schwärzungen, die sich als Beugungsbilder interpretieren lassen, die durch starre, fehlgeordnete oder schwingende Atomgruppen verursacht sind. Beide Ursachen können auch kombiniert vorkommen (63,229-231). Als starre Körper kommen auch hier, wie bei der Librationsbewegung (Kap.4.5.2.2.) die Anionen in Betracht. Die Kräfte der Atome des starren Körpers untereinander sind viel stärker als die zu den umgebenden Atomen (van der Waals'sche Kräfte). Von U. Gerlach ist neben dem Tetrabutylammoniumhexawolframat auch das Tributylammoniumdekawolframat auf diese diffusen Beugungsmuster hin untersucht worden (231,63). Im Gegensatz zum Hexawolframat zeigen die diffusen Schwärzungen durch das Dekawolframat eine Feinstruktur. Dies wird durch die Korrelation von etwa fünf starren Körpern in einer Achsenrichtung, d. h. die kooperative Kopplung der Fehlordnung und/oder Schwingung, erklärt. Die diffusen Beugungsbilder ließen

sich auch mit mathematischen Modellen (mit und ohne Kopplung) in befriedigender Weise simulieren. Diese Deutung ist mit den Ergebnissen der Strukturanalyse der beiden Wolframate in Einklang. Die Einbettung der annähernd kugelförmigen Hexawolframationen in die, durch die freie Drehbarkeit der Kohlenwasserstoffketten anpassungsfähigen Kationen, lassen ohne Wasserstoffbrücken und sterische Zwänge keine Kopplung erwarten. Beim Dekawolframat läßt sich jedoch eine solche Korrelation auf Grund der ausgebildeten Wasserstoffbrücken (Kap.4.5.5.) und der Verzahnung der Anionen in einer Achsenrichtung verstehen. Die Frage, ob die Fehlordnung und/oder Schwingung durch das Metallatomgerüst allein oder durch das ganze Anion bewirkt ist, wird für das Dekawolframat mit einiger Wahrscheinlichkeit dahingehend beantwortet, daß das Anion als Ganzes für die diffuse Beugung verantwortlich ist. Eine Entscheidung über die Ursache(n) der diffusen Schwärzungen läßt sich erst mit Hilfe von Aufnahmen bei tiefen Temperaturen treffen, da hierdurch Anteile, die durch Schwingungen verursacht sind, geringer werden.

5. Zusammenfassung

Zur Aufklärung der Aggregationsvorgänge beim Ansäuern von Alkaliwolframatlösungen werden weitere Röntgenstrukturdaten benötigt. Als Beitrag hierzu wurden Einkristalle des Tributylammonium(5:24)-Wolframats, dessen IR-Spektrum die nahe Verwandtschaft zum "echten" Metawolframat zeigt, gezüchtet und eine Gitterkonstantenbestimmung durchgeführt. Sie könnte die Grundlage einer zukünftigen Strukturaufklärung sein. Die Herstellung von Einkristallen des Ammoniumparawolframat-B (Zwischenprodukt bei der zeitgesteuerten Umwandlung von Parawolframat-A- zum Parawolframat-Z-Ion, alle mit der Azidifikation $x = 1,167$) ließ sich nicht verwirklichen. Bessere Möglichkeiten werden sich bieten, wenn es gelingt, Salze mit organischen Kationen zu erzeugen.

Das Hexawolframation läßt sich mit Hilfe spezieller, großer Kationen aus wäßriger Lösung ausfällen, doch weiß man noch nichts über seine Rolle im p_H - und zeitabhängigen Gleichgewichtsschema (Abb. 1) der Isopolywolframsäuren. Vom Tantal, Niob und Molybdän sind Anionen gleicher Bauart bekannt, für die im Rahmen einer Normalkoordinatenanalyse (R. Mattes, H. Bierbüße und J. Fuchs) die Zuordnung der Banden in den IR- und Ramanspektren erfolgt ist. Als Wolframverbindung wurde das durch Esterhydrolyse hergestellte Tetrabutyl-

ammoniumhexawolframat $[\text{N}(\text{C}_4\text{H}_9)_4]_2[\text{W}_6\text{O}_{19}]$ verwendet. Von G. Henning und A. Hüllen sind Metallabstände und Abstände Metall - zentrales Sauerstoffatom bestimmt worden. Zur Verbesserung von Kraftkonstanten und damit der Zuordnung von Banden von gemischten Isopolyanionen mit M_6O_{19} -Struktur, sowie zum Vergleich mit anderen Verbindungen, die ähnliche Strukturelemente oder Teile davon enthalten, wurde eine Röntgenstrukturuntersuchung mit Hilfe dreidimensionaler Diffraktometerdaten durchgeführt. Es gelang, die bis jetzt genaueste Wolframstrukturverfeinerung (R-Wert = 4,6%) zu erhalten.

Die Zellparameter des triklinen Gitters, $P\bar{1}$, wurden bestimmt zu: $a = 19,815(16)$, $b = 11,803(3)$, $c = 12,691(8)$ [Å], $\alpha = 118,01(2)$, $\beta = 77,27(3)$, $\gamma = 108,46(5)$ [Grad], $V = 2476,4$ [Å³], $Z = 2$, $D_x = 2,537$ [g/cm³]. Wegen des hohen Wertes von $\mu = 262,2$ [cm⁻¹] wurden die Reflexintensitätsmessungen zur Erleichterung der Absorptions- und Extinktionskorrektur an einer Einkristallkugel durchgeführt. Es wurden Intensitäten von 6081 Reflexen in einem Bereich bis $\theta = 55$ [Grad] gemessen.

Die Verfeinerung der gesamten Struktur nach der "least square" -Methode ergab eine Bestätigung der angenommenen Voraussetzungen und Ergebnisse der Normalkoordinaten-

tenanalyse. Für die Metallabstände und die Bindungslänge Metall - zentraler Sauerstoff wurde mit Hilfe der anisotropen Temperaturfaktoren der Wolframatom eine Korrektur der aufgrund der Librationsbewegung (Betrachtung des Anions als "rigid body") verkürzten Distanzen durchgeführt. Die Bindungslängen der terminalen Sauerstoffatome, $W-O_t$ (von 1,673 bis 1,713) 1,693(17) [Å] sprechen für einen weitgehenden Doppelbindungscharakter (σ - und $p\pi-d\pi$ -Bindung), diejenigen von den Metallatomen zu dem zentralen Sauerstoffatom, $W-O_c$ (von 2,330 bis 2,342) 2,334(1) [Å] für eine schwache Bindung mit ionischem Charakter. Die Bindungen Metall - kantenverbrückende Sauerstoffatome, $W-O_b$ (von 1,892 bis 1,948) 1,924(14) [Å] lassen sich am besten als kovalente Einfachbindungen beschreiben. Ihre Streuung wird im Vergleich mit anderen Verbindungen, besonders der $Mo-O_b$ -Bindungen im Hexamolybdat - Cyclophosphazen, diskutiert. Die Schwankung der $M-O_b$ -Bindungen, die bei Molybdänverbindungen als regelmäßig alternierend gefunden werden, sind, neben der eindimensionalen Verschiebung der Metallatome in Richtung auf das O_t ("one corner displacement"), das Resultat einer zusätzlichen Verzerrung ("three corner displacement"), deren Endpunkt die Bildung eines Tetraeders wäre. Insgesamt fügen sich die erhaltenen Ergebnisse, wie sich auch aus einer Bindungsordnungs-

berechnung ergibt, sinnvoll in das bekannte Datenmaterial der Polymetallationen ein.

Von den Kationen konnten die Stickstoff- und alle Kohlenstoffatome in der Differenzfouriersynthese entdeckt werden. Eine "least square" -Verfeinerung mit Wasserstoffatompositionen brachte zwar eine signifikante Verbesserung des Zuverlässigkeitsindex auf 4,3%, aber in bezug auf das einzelne Wasserstoffatom konnte keine eindeutige Entscheidung getroffen werden. Aufgeführt sind die mit der Tetraedergeometrie als Grundlage berechneten Positionen von 48 Wasserstoffatomen. Die Einbettung der Wolframationen in die Kationenstruktur schließt Wasserstoffbrücken und sterische Behinderungen aus. Dies wird durch die von U. Gerlach angefertigten Weissenbergfilmaufnahmen (Belichtungszeit: mehrere Wochen) bestätigt. Die erkennbaren diffusen Schwärzungen zwischen den Braggreflexen, die auf thermische Schwingungen und/oder Fehlordnung der starren Anionenkörper zurückzuführen sind, weisen keine Feinstruktur auf, d. h. die Anionen korrelieren nicht miteinander wie dies z. B. beim Tributylammoniumdekawolframat der Fall ist.

6. A N H A N G

6.1. Experimentelles

Darstellung von Wolfram(VI)-säuretetramethylester über Wolframoxidthetrachlorid (151,110,109)

WOCl₄

150 g Wolframtrioxid werden mit 300 ml Dischwefeldichlorid (frisch destilliert, $K_p = 137^{\circ}\text{C}$) auf dem Ölbad 8 Stunden bei 140°C und 2 Stunden bei 175°C unter Rückfluß erhitzt. Nach dem Erkalten gießt man das überschüssige S_2Cl_2 von den roten, nadelförmig ausgeschiedenen Kristallen ab, schüttelt diese mehrmals mit gut getrocknetem (P_{40}_{10}) Kohlendisulfid durch und saugt unter Feuchtigkeitsschluß ab. Der Rest des CS_2 wird durch einen trockenen (CaCl_2 , $\text{Mg}(\text{ClO}_4)_2$) Stickstoffstrom bei einer Ölbadtemperatur von 100°C (3 - 5 Std.) entfernt.

Um das hauptsächlich entstandene WOCl_4 von der geringen Menge mitentstandenen WO_2Cl_2 und nicht umgesetztem WO_3 zu trennen, wird eine Sublimation durchgeführt.

Bei Normaldruck wird dazu das sehr feuchtigkeits- und sauerstoffempfindliche Reaktionsprodukt in einem schwer schmelzbaren Rohr in einen elektrisch heizbaren Röhrenofen eingeführt und auf 220°C erhitzt, damit sich das WOCl_4 ($\text{Sp} = 212^{\circ}\text{C}$) in reiner Form (WOCl_2 , $\text{Sp} = 266^{\circ}\text{C}$) im unbeheizten Teil des Rohres als orangefarbene, faserige Kristalle niederschlagen kann (Aufbewahrung un-

ter Stickstoff).



10 g WOCl_4 werden in ca. 150 ml trockenem, thiophen-freiem Benzol suspendiert. Man fügt 15 ml absoluten Methanol zu.

Das Reaktionsgemisch wird ca. 20 Minuten unter Rückfluß (CaCl_2 -Rohr gegen Luftfeuchtigkeit) zum Sieden erhitzt. Man leitet einen trockenen Strom Stickstoff hindurch, der einen Teil des entstehenden Chlorwasserstoffs aus dem Reaktionsgefäß entfernt.



Um Überschüssiges HCl zu binden, wird nach dem Erkalten gut getrocknetes Ammoniak (Natronkalk, Kaliumhydroxid und Natriumdraht) eingeleitet. Wenn die Lösung kein HCl mehr enthält, wird der entstandene Niederschlag von Ammoniumchlorid mit Hilfe einer Druckfilternutsche von der Lösung getrennt und mit einem Gemisch von absolutem Äthanol/Benzol (1:1) gewaschen.

Die klare Lösung wird unter Feuchtigkeitsausschluß in einem Vakuumrotationsverdampfer auf ca. 5 ml eingeeengt. Es fallen farblose, nadelförmige Kristalle von $\text{WO}(\text{OCH}_3)_4$ aus. Der Ester wird zweckmäßig in äthanolischer Lösung aufbewahrt. Er ist feuchtigkeits- und

lichtempfindlich.

Darstellungsmethoden für Tetrabutylammoniumbase

(110, 152, 153, 154):

1. Durch Umsetzung von Tetrabutylammoniumchlorid mit KOH in Isopropanol.
2. In methanolischer Lösung wird Tetrabutylammoniumjodid mit Silberoxid geschüttelt.
3. Durch Behandlung eines basischen Ionenaustauschers mit der Lösung eines Tetrabutylammoniumsalzes.

Darstellungsmethode für Natriummetawolframat

(Vorschrift G. Schott und C. Harzdorf, 89):

Eine siedende Lösung von NaOH wird mit einer Aufschlämmung von $\text{WO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ in Wasser beschickt und ca. 2 Stunden unter Rühren weiter erhitzt. Die Suspension soll zum Schluß noch eine leicht gelbe Färbung aufweisen. Von nicht umgesetztem $\text{WO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ wird die Lösung klar abgetrennt und im Rotationsverdampfer bis zur sirupösen Konsistenz eingeengt. Restliches Wasser läßt sich im Exikator über NaOH entfernen. Da sich die Ausscheidung von kolloidalem WO_3 nicht verhindern läßt, wird das Produkt in der dreifachen Menge aufgelöst und noch dreimal umkristallisiert.

10	7	0	1409	1372	0-10	1	601	666	9-8	1	602	691	-5	-6	1	1079	1121	10	-3	-5	1	517	533	-14	-15	-1	303	272
9	7	0	1409	1372	0-10	1	601	666	9-8	1	602	691	-5	-6	1	1079	1121	10	-3	-5	1	517	533	-14	-15	-1	303	272
8	7	0	1409	1372	0-10	1	601	666	9-8	1	602	691	-5	-6	1	1079	1121	10	-3	-5	1	517	533	-14	-15	-1	303	272
7	4	0	879	896	11	7	0	149	147	9-10	1	217	182	10	-8	1	1146	1146	-4	-6	1	675	692	11	-5	1	869	897
6	4	0	466	403	12	7	0	282	313	10-10	1	715	154	39	-3	-1	3004	3175	12	-5	1	150	103	11	-5	1	150	103
5	4	0	1555	1667	1	8	0	142	86	11-10	1	384	304	12	-8	-1	478	488	-2	-6	1	291	276	13	-5	1	792	684
4	0	256	244	1	8	0	872	882	12-10	1	152	111	13	-8	-1	603	624	-1	-6	1	2262	2340	14	-5	1	617	636	
3	4	0	997	1045	2	8	0	263	156	11-10	1	146	112	14	-8	1	151	106	0	-6	1	142	150	15	-5	1	258	219
2	4	0	869	878	3	8	0	147	77	12-10	1	486	430	15	-8	1	1213	1222	1	-6	1	486	490	16	-5	1	230	165
1	4	0	147	163	4	8	0	459	432	-8-9	1	260	243	16	-8	1	225	77	2	-6	1	141	146	17	-5	1	752	720
14	4	0	357	307	5	8	0	148	44	-7-9	1	146	131	17	-8	1	788	804	3	-6	1	504	504	18	-5	1	361	318
15	4	0	281	210	6	8	0	638	615	-5-9	1	393	421	18	-8	1	283	270	4	-6	1	1000	1066	19	-5	1	148	99
16	4	0	474	402	7	8	0	822	738	-5-9	1	441	445	12	-8	1	146	98	5	-6	1	1324	1389	20	-5	1	392	425
17	4	0	891	902	8	8	0	900	285	-4-9	1	1024	987	11	-7	1	323	323	6	-6	1	1433	1476	21	-5	1	146	66
18	4	0	2152	2227	9	8	0	352	680	-3-9	1	1172	1193	8	-6	1	579	537	7	-6	1	556	544	22	-5	1	269	226
19	4	0	217	196	10	8	0	1425	1401	-1-9	1	1099	1086	-7	-7	1	909	893	8	-6	1	556	544	23	-5	1	224	182
20	4	0	3667	3833	10	9	0	352	296	0-9	1	693	699	-7	-7	1	556	587	9	-6	1	1231	1242	24	-5	1	156	128
21	4	0	138	127	1	9	0	739	722	0-9	1	1101	1094	-6	-7	1	349	347	10	-6	1	806	782	25	-5	1	357	180
22	4	0	2339	2448	2	9	0	739	722	0-9	1	1101	1094	-6	-7	1	349	347	11	-6	1	806	782	26	-5	1	357	180
23	4	0	572	507	3	9	0	585	515	2-9	1	299	234	-5	-7	1	436	441	12	-6	1	700	693	27	-5	1	1154	1472
24	4	0	139	163	4	9	0	145	9	3-9	1	153	63	-4	-7	1	1081	1145	13	-6	1	388	359	28	-5	1	1508	1476
25	4	0	568	667	5	9	0	147	250	4-9	1	1044	1028	-3	-7	1	364	432	14	-6	1	280	319	29	-5	1	1253	1264
26	4	0	323	280	6	9	0	139	128	5-9	1	802	745	-7	-7	1	1853	1892	15	-6	1	896	911	30	-5	1	1296	1354
27	4	0	149	124	7	9	0	139	128	6-9	1	1266	1251	-7	-7	1	950	991	16	-6	1	156	211	31	-5	1	212	257
28	4	0	324	321	8	10	0	246	201	7-9	1	266	181	0	-7	1	950	991	17	-6	1	156	211	32	-5	1	212	257
29	4	0	146	112	9	10	0	876	821	8-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	18	-6	1	148	442	33	-5	1	482	511
30	4	0	218	187	10	10	0	144	129	9-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	19	-6	1	403	442	34	-5	1	141	482
31	4	0	146	112	11	10	0	876	821	10-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	20	-6	1	403	442	35	-5	1	141	482
32	4	0	218	187	12	10	0	144	129	11-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	21	-6	1	403	442	36	-5	1	141	482
33	4	0	146	112	13	10	0	876	821	12-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	22	-6	1	403	442	37	-5	1	141	482
34	4	0	218	187	14	10	0	144	129	13-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	23	-6	1	403	442	38	-5	1	141	482
35	4	0	146	112	15	10	0	876	821	14-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	24	-6	1	403	442	39	-5	1	141	482
36	4	0	218	187	16	10	0	144	129	15-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	25	-6	1	403	442	40	-5	1	141	482
37	4	0	146	112	17	10	0	876	821	16-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	26	-6	1	403	442	41	-5	1	141	482
38	4	0	218	187	18	10	0	144	129	17-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	27	-6	1	403	442	42	-5	1	141	482
39	4	0	146	112	19	10	0	876	821	18-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	28	-6	1	403	442	43	-5	1	141	482
40	4	0	218	187	20	10	0	144	129	19-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	29	-6	1	403	442	44	-5	1	141	482
41	4	0	146	112	21	10	0	876	821	20-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	30	-6	1	403	442	45	-5	1	141	482
42	4	0	218	187	22	10	0	144	129	21-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	31	-6	1	403	442	46	-5	1	141	482
43	4	0	146	112	23	10	0	876	821	22-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	32	-6	1	403	442	47	-5	1	141	482
44	4	0	218	187	24	10	0	144	129	23-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	33	-6	1	403	442	48	-5	1	141	482
45	4	0	146	112	25	10	0	876	821	24-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	34	-6	1	403	442	49	-5	1	141	482
46	4	0	218	187	26	10	0	144	129	25-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	35	-6	1	403	442	50	-5	1	141	482
47	4	0	146	112	27	10	0	876	821	26-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	36	-6	1	403	442	51	-5	1	141	482
48	4	0	218	187	28	10	0	144	129	27-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	37	-6	1	403	442	52	-5	1	141	482
49	4	0	146	112	29	10	0	876	821	28-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	38	-6	1	403	442	53	-5	1	141	482
50	4	0	218	187	30	10	0	144	129	29-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	39	-6	1	403	442	54	-5	1	141	482
51	4	0	146	112	31	10	0	876	821	30-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	40	-6	1	403	442	55	-5	1	141	482
52	4	0	218	187	32	10	0	144	129	31-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	41	-6	1	403	442	56	-5	1	141	482
53	4	0	146	112	33	10	0	876	821	32-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	42	-6	1	403	442	57	-5	1	141	482
54	4	0	218	187	34	10	0	144	129	33-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	43	-6	1	403	442	58	-5	1	141	482
55	4	0	146	112	35	10	0	876	821	34-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	44	-6	1	403	442	59	-5	1	141	482
56	4	0	218	187	36	10	0	144	129	35-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	45	-6	1	403	442	60	-5	1	141	482
57	4	0	146	112	37	10	0	876	821	36-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	46	-6	1	403	442	61	-5	1	141	482
58	4	0	218	187	38	10	0	144	129	37-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	47	-6	1	403	442	62	-5	1	141	482
59	4	0	146	112	39	10	0	876	821	38-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	48	-6	1	403	442	63	-5	1	141	482
60	4	0	218	187	40	10	0	144	129	39-9	1	1355	1342	-7	-7	1	258	146	49	-6	1	403	442	64	-5	1	141	482
61	4	0	146	112	41	10	0	876	821	40-9	1	1171	1145	-7	-7	1	910	921	50	-6	1	403	442	65	-5	1	141	482
62	4	0	218	187	42	10	0	144	129	41-9	1</																	

	h	k	1	10F _o	10F _c	h	k	1	10F _o	10F _c	h	k	1	10F _o	10F _c	h	k	1	10F _o	10F _c
-13	-3	1	512	523		-1	-2	1	953	538	12	-1	1	1362	1352	-12	1	623	637	3
-12	-3	1	151	50		0	-2	1	953	538	13	-1	1	865	877	-11	1	483	467	4
-11	-3	1	995	527		1	-2	1	2312	2185	14	-1	1	1671	1652	-10	1	379	354	5
-10	-3	1	556	512		2	-2	1	123	170	15	-1	1	754	800	-9	1	1058	1084	6
-9	-3	1	868	938		3	-2	1	1062	1062	16	-1	1	1354	1412	-8	1	1395	1412	7
-8	-3	1	483	441		4	-2	1	817	927	17	-1	1	383	361	-6	1	2277	2321	8
-7	-3	1	478	399		5	-2	1	832	814	18	-1	1	837	833	-4	1	3382	3293	9
-6	-3	1	730	399		6	-2	1	2916	2937	19	-1	1	150	11	-3	1	465	496	10
-5	-3	1	991	1110		7	-2	1	1767	1823	20	-1	1	429	429	-2	1	1223	1143	11
-4	-3	1	1117	1104		8	-2	1	2719	2736	21	-1	1	145	98	-1	1	273	310	12
-3	-3	1	455	441		9	-2	1	2919	2991	22	-1	1	264	343	0	1	3023	2861	13
-2	-3	1	257	226		10	-2	1	345	328	23	-1	1	398	338	0	1	128	282	14
-1	-3	1	268	135		11	-2	1	1410	1498	24	-1	1	328	370	2	1	961	136	15
0	-3	1	226	285		12	-2	1	1348	1368	25	-1	1	287	271	5	1	1625	1579	16
1	-3	1	2263	2183		13	-2	1	1036	1052	26	-1	1	1238	1233	4	1	302	139	17
2	-3	1	705	748		14	-2	1	1936	1932	27	-1	1	1936	1932	3	1	1388	1387	18
3	-3	1	2871	2739		15	-2	1	122	334	28	-1	1	122	334	2	1	143	162	19
4	-3	1	832	591		16	-2	1	905	907	29	-1	1	1330	1332	1	1	1707	1681	20
5	-3	1	152	170		17	-2	1	905	907	30	-1	1	1330	1332	0	1	2633	2714	21
6	-3	1	212	2169		18	-2	1	435	405	31	-1	1	846	550	10	1	1386	1395	22
7	-3	1	3062	3199		19	-2	1	153	263	32	-1	1	887	1648	13	1	113	445	23
8	-3	1	1698	1817		20	-2	1	153	263	33	-1	1	887	1648	12	1	426	343	24
9	-3	1	3390	3417		21	-2	1	282	315	34	-1	1	1327	1536	14	1	542	428	25
10	-3	1	3390	3417		22	-2	1	625	578	35	-1	1	1055	1052	15	1	836	824	26
11	-3	1	825	962		23	-2	1	254	236	36	-1	1	1055	1052	14	1	1704	1532	27
12	-3	1	2091	2089		24	-2	1	703	722	37	-1	1	1055	913	17	1	332	317	28
13	-3	1	1723	1766		25	-2	1	155	165	38	-1	1	120	14	18	1	619	658	29
14	-3	1	600	627		26	-2	1	1069	1046	39	-1	1	1557	1455	19	1	533	444	30
15	-3	1	550	508		27	-2	1	1276	1342	40	-1	1	118	73	20	1	971	948	31
16	-3	1	435	407		28	-2	1	782	757	41	-1	1	2229	2188	19	1	766	772	32
17	-3	1	154	158		29	-2	1	2292	2393	42	-1	1	1183	1231	18	1	930	872	33
18	-3	1	884	840		30	-2	1	663	637	43	-1	1	628	632	17	1	730	762	34
19	-3	1	152	197		31	-2	1	336	365	44	-1	1	3289	3349	16	1	930	872	35
20	-3	1	579	533		32	-2	1	1508	1400	45	-1	1	2988	2963	15	1	441	427	36
21	-3	1	220	193		33	-2	1	1174	1220	46	-1	1	1411	1420	9	1	281	218	37
22	-3	1	856	807		34	-2	1	608	654	47	-1	1	1666	1670	13	1	1911	1882	38
23	-3	1	856	807		35	-2	1	948	954	48	-1	1	210	216	12	1	1491	1534	39
24	-3	1	877	853		36	-2	1	1065	1170	49	-1	1	555	625	11	1	821	853	40
25	-3	1	428	427		37	-2	1	2318	2292	50	-1	1	1436	1540	10	1	431	394	41
26	-3	1	862	861		38	-2	1	346	348	51	-1	1	666	683	9	1	675	678	42
27	-3	1	146	140		39	-2	1	3321	3200	52	-1	1	520	474	7	1	1457	1495	43
28	-3	1	1246	1246		40	-2	1	354	493	53	-1	1	543	544	6	1	746	808	44
29	-3	1	1225	1259		41	-2	1	647	623	54	-1	1	239	198	5	1	1940	1995	45
30	-3	1	866	884		42	-2	1	352	488	55	-1	1	457	413	4	1	792	811	46
31	-3	1	2362	2427		43	-2	1	517	575	56	-1	1	1231	1181	3	1	1818	1804	47
32	-3	1	583	646		44	-2	1	1024	1116	57	-1	1	643	601	2	1	859	788	48
33	-3	1	1227	1287		45	-2	1	687	694	58	-1	1	719	679	0	1	1494	1427	49
34	-3	1	1999	2082		46	-2	1	526	575	59	-1	1	746	722	1	1	1552	1778	50
35	-3	1	1561	1529		47	-2	1	1001	1056	60	-1	1	1019	1009	2	1	661	729	51

h	k	1	10f _o	10f _c	h	k	1	10f _o	10f _c	h	k	1	10f _o	10f _c	h	k	1	10f _o	10f _c
-7	5	1	1853	1971	10	6	1	1635	1609	2	8	1	152	8	7	1	2	605	553
-6	5	1	1688	1732	11	6	1	329	299	3	8	1	343	285	8	-11	2	317	288
-5	5	1	142	55	12	6	1	841	837	4	8	1	646	659	9	-11	2	154	177
-4	5	1	694	753	13	6	1	146	61	5	8	1	170	284	10	-11	2	266	206
-3	5	1	660	635	-17	7	1	339	344	6	8	1	252	18	11	-11	2	372	343
-2	5	1	529	455	-16	7	1	1055	1033	7	8	1	170	32	12	-11	2	485	445
-1	5	1	578	601	-15	7	1	773	775	8	8	1	738	735	13	-11	2	629	614
0	5	1	514	586	-14	7	1	1145	1147	9	8	1	143	128	-10	2	455	354	
1	5	1	509	426	-13	7	1	722	719	-14	9	1	549	522	-10	2	629	614	
2	5	1	2716	2705	-12	7	1	234	236	-12	9	1	229	713	-10	2	1097	1077	
3	5	1	465	547	-11	7	1	157	166	-12	9	1	766	715	-10	2	574	585	
4	5	1	2797	2834	-10	7	1	395	391	-11	9	1	728	722	10	-10	2	179	169
5	5	1	301	337	-9	7	1	401	367	-10	9	1	798	786	2	-10	2	1128	1104
6	5	1	191	1054	-8	7	1	150	97	-9	9	1	168	1248	2	-10	2	158	90
7	5	1	147	26	-7	7	1	151	70	-8	9	1	644	679	3	-10	2	490	498
8	5	1	153	84	-6	7	1	149	24	-7	9	1	462	424	4	-10	2	300	272
9	5	1	428	424	-5	7	1	345	324	-6	9	1	150	58	5	-10	2	525	478
10	5	1	371	409	-4	7	1	1299	1312	-5	9	1	312	323	6	-10	2	685	614
11	5	1	711	730	-3	7	1	1625	1737	-3	9	1	155	76	7	-10	2	160	191
12	5	1	347	383	-2	7	1	498	575	-1	9	1	858	826	8	-10	2	800	749
13	5	1	378	328	-1	7	1	1625	1737	-3	9	1	155	76	8	-10	2	820	775
14	5	1	339	308	0	7	1	498	575	-1	9	1	378	470	9	-10	2	696	690
15	5	1	227	168	1	7	1	530	559	2	9	1	490	652	10	-10	2	557	50
16	6	1	144	61	2	7	1	427	458	1	9	1	155	47	11	-8	2	495	487
17	6	1	265	305	3	7	1	155	47	2	9	1	155	47	12	-8	2	582	605
18	6	1	391	412	4	7	1	157	167	3	9	1	146	113	13	-8	2	446	437
19	6	1	784	802	5	7	1	157	167	4	9	1	146	113	14	-8	2	446	437
20	6	1	693	709	6	7	1	288	929	5	9	1	146	113	15	-8	2	332	379
21	6	1	735	391	7	7	1	971	929	6	9	1	388	366	16	-8	2	732	735
22	6	1	1045	1019	8	7	1	156	158	7	9	1	551	526	17	-8	2	696	696
23	6	1	485	477	9	7	1	156	158	8	9	1	551	526	18	-8	2	732	735
24	6	1	1708	1683	10	7	1	266	294	9	9	1	653	638	19	-8	2	1177	1163
25	6	1	216	118	11	7	1	998	994	-8	10	1	147	99	20	-8	2	1082	1063
26	6	1	1685	1702	-16	8	1	676	607	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
27	6	1	588	577	-15	8	1	676	607	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
28	6	1	1270	1288	-14	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
29	6	1	145	163	-13	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
30	6	1	139	141	-12	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
31	6	1	153	141	-11	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
32	6	1	123	123	-10	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
33	6	1	123	123	-9	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
34	6	1	123	123	-8	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
35	6	1	123	123	-7	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
36	6	1	123	123	-6	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
37	6	1	123	123	-5	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
38	6	1	123	123	-4	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
39	6	1	123	123	-3	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
40	6	1	123	123	-2	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
41	6	1	123	123	-1	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
42	6	1	123	123	0	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
43	6	1	123	123	1	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
44	6	1	123	123	2	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
45	6	1	123	123	3	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
46	6	1	123	123	4	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
47	6	1	123	123	5	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
48	6	1	123	123	6	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
49	6	1	123	123	7	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
50	6	1	123	123	8	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
51	6	1	123	123	9	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
52	6	1	123	123	10	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
53	6	1	123	123	11	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
54	6	1	123	123	12	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
55	6	1	123	123	13	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
56	6	1	123	123	14	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
57	6	1	123	123	15	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
58	6	1	123	123	16	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
59	6	1	123	123	17	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
60	6	1	123	123	18	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
61	6	1	123	123	19	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
62	6	1	123	123	20	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
63	6	1	123	123	21	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
64	6	1	123	123	22	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
65	6	1	123	123	23	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
66	6	1	123	123	24	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
67	6	1	123	123	25	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
68	6	1	123	123	26	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
69	6	1	123	123	27	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
70	6	1	123	123	28	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
71	6	1	123	123	29	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
72	6	1	123	123	30	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
73	6	1	123	123	31	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
74	6	1	123	123	32	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
75	6	1	123	123	33	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
76	6	1	123	123	34	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
77	6	1	123	123	35	8	1	150	17	-10	10	1	620	534	-9	-2	5	547	489
78	6	1	123	12															

h	k	l	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F	o	10F
---	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

h	k	l	10F ₀	10F ₁	h	k	l	10F ₀	10F ₁	h	k	l	10F ₀	10F ₁	h	k	l	10F ₀	10F ₁
12	-9	4	164	27	1	-7	4	1300	1345	17	-6	4	1869	1895	-5	-4	4	416	466
13	-9	4	163	35	2	-7	4	885	911	18	-6	4	1707	1696	-4	-4	4	1707	1696
14	-9	4	162	9	3	-7	4	793	846	19	-6	4	1067	1046	-3	-4	4	2756	2747
15	-9	4	165	164	4	-7	4	552	485	20	-6	4	157	155	-2	-4	4	2133	2156
16	-9	4	163	467	5	-7	4	1159	1146	-15	-5	4	485	445	-1	-4	4	1079	1058
17	-9	4	164	330	6	-7	4	928	903	-14	-5	4	566	568	0	-4	4	1079	1157
18	-9	4	165	731	7	-7	4	755	724	-13	-5	4	1034	1010	1	-4	4	2057	2051
19	-9	4	164	282	8	-7	4	1316	1294	-12	-5	4	395	383	2	-4	4	540	376
-10	-8	4	905	888	9	-7	4	1552	1521	-11	-5	4	559	579	3	-4	4	151	27
-9	-8	4	908	888	10	-7	4	636	628	-10	-5	4	334	268	4	-4	4	1620	1611
-8	-8	4	907	889	11	-7	4	2210	2191	-9	-5	4	1070	1036	5	-4	4	1331	1403
-7	-8	4	166	79	12	-7	4	276	322	-8	-5	4	795	789	6	-4	4	1211	1185
-6	-8	4	714	706	13	-7	4	1050	1036	-7	-5	4	1480	1514	7	-4	4	919	887
-5	-8	4	611	224	14	-7	4	549	490	-6	-5	4	1589	1652	8	-4	4	487	457
-4	-8	4	870	515	15	-7	4	164	99	-5	-5	4	323	278	9	-4	4	230	155
-3	-8	4	673	653	16	-7	4	164	1005	-4	-5	4	152	121	10	-4	4	1213	1199
-2	-8	4	340	359	17	-7	4	162	97	-3	-5	4	1389	1388	11	-4	4	438	416
-1	-8	4	1481	1502	18	-7	4	1015	998	-2	-5	4	2283	2242	12	-4	4	553	563
0	-8	4	1189	1198	19	-7	4	489	472	0	-5	4	2669	2675	13	-4	4	378	374
1	-8	4	2012	2018	-14	-6	4	487	445	1	-5	4	514	422	14	-4	4	166	185
2	-8	4	269	246	-13	-6	4	157	23	2	-5	4	485	497	15	-4	4	470	487
3	-8	4	1240	1288	-12	-6	4	845	845	3	-5	4	1181	1101	16	-4	4	166	185
4	-8	4	1234	1180	-11	-6	4	165	79	4	-5	4	469	488	17	-4	4	166	185
5	-8	4	159	15	-10	-6	4	166	101	5	-5	4	790	918	18	-4	4	166	185
6	-8	4	1051	1069	9	-6	4	163	98	6	-5	4	1123	1136	19	-4	4	166	185
7	-8	4	600	578	-8	-6	4	1416	1383	7	-5	4	968	951	20	-4	4	298	258
8	-8	4	486	476	-7	-6	4	548	623	8	-5	4	1128	1082	-16	-3	4	454	555
9	-8	4	1809	1791	-6	-6	4	1360	1362	9	-5	4	1128	1082	-15	-3	4	371	379
10	-8	4	164	39	-5	-6	4	1447	1476	10	-5	4	152	63	-14	-3	4	794	796
11	-8	4	1338	1368	-4	-6	4	156	4	11	-5	4	291	332	-13	-3	4	415	467
12	-8	4	167	157	-3	-6	4	1052	1105	12	-5	4	378	416	-12	-3	4	167	58
13	-8	4	163	90	-2	-6	4	613	510	13	-5	4	1074	1116	-11	-3	4	535	599
14	-8	4	163	90	-1	-6	4	407	444	14	-5	4	159	7	-10	-3	4	231	62
15	-8	4	159	235	0	-6	4	386	400	15	-5	4	182	1439	-9	-3	4	147	1476
16	-8	4	159	83	1	-6	4	152	106	16	-5	4	164	13	-8	-3	4	482	1519
17	-8	4	156	124	2	-6	4	151	4	17	-5	4	164	13	-6	-3	4	1214	1294
18	-8	4	156	125	3	-6	4	360	376	18	-5	4	960	986	7	-2	4	670	645
19	-8	4	156	125	4	-6	4	2156	2073	19	-5	4	259	173	8	-2	4	1583	1533
-10	-7	4	970	910	5	-6	4	156	125	20	-5	4	159	124	9	-2	4	185	2136
-9	-7	4	829	204	6	-6	4	2220	2190	-15	-4	4	316	338	-4	-3	4	2005	2729
-8	-7	4	507	504	7	-6	4	156	126	-16	-4	4	316	338	-2	-3	4	2005	2729
-7	-7	4	382	288	8	-6	4	156	126	-15	-4	4	883	868	1	-3	4	292	532
-6	-7	4	382	288	9	-6	4	142	130	-14	-4	4	831	889	2	-3	4	1603	1585
-5	-7	4	162	155	10	-6	4	156	126	-13	-4	4	850	829	3	-3	4	1603	1585
-4	-7	4	1291	1282	11	-6	4	156	126	-12	-4	4	950	932	4	-3	4	206	2016
-3	-7	4	554	552	12	-6	4	1022	1053	-10	-4	4	330	352	5	-3	4	206	2016
-2	-7	4	1949	1977	13	-6	4	161	11	-9	-4	4	163	803	6	-3	4	353	3292
-1	-7	4	356	391	14	-6	4	1206	1241	-8	-4	4	158	82	7	-3	4	206	2016
0	-7	4	2100	2140	15	-6	4	169	223	-7	-4	4	1809	1863	8	-3	4	2177	2221
					16	-6	4	169	223	-6	-4	4	937	946	9	-3	4	854	741

	h	K	I	10F	10F	h	K	I	10F	10F	h	K	I	10F	10F	h	K	I	10F	10F	h	K	I	10F	10F	h	K	I	10F	10F
-3	0	4	1261	1216	10	1	4	1320	1278	-11	3	4	162	86	6	4	1365	1355	-2	6	4	994	964	-2	11	5	281	262		
-2	0	4	1036	1039	10	1	4	523	549	-10	3	4	161	109	7	4	1356	1358	-1	6	4	156	141	-1	11	5	159	235		
-1	0	4	731	712	12	1	4	277	286	-8	3	4	154	129	8	4	1374	1368	0	6	4	742	705	0	11	5	768	718		
0	0	4	183	52	13	1	4	765	812	-7	3	4	990	967	10	4	163	100	1	6	4	166	198	1	11	5	165	82		
1	0	4	1501	1480	14	1	4	514	253	-6	3	4	354	396	11	4	167	112	2	6	4	185	102	2	11	5	1081	1111		
2	0	4	343	393	15	1	4	545	581	-5	3	4	2032	2008	12	4	168	122	3	6	4	166	198	3	11	5	169	109		
3	0	4	1493	1480	16	1	4	514	253	-4	3	4	1440	1352	13	4	167	112	4	6	4	1551	1483	4	11	5	925	953		
4	0	4	152	102	17	1	4	362	302	-3	3	4	1575	1568	14	4	167	112	5	6	4	166	198	5	11	5	165	51		
5	0	4	1113	1153	18	1	4	502	444	-2	3	4	677	663	15	4	167	112	6	6	4	184	766	6	11	5	255	264		
6	0	4	1350	1396	19	1	4	219	181	-1	3	4	897	801	16	4	167	112	7	6	4	184	766	7	11	5	753	746		
7	0	4	257	162	17	1	4	263	197	0	3	4	867	801	17	4	167	112	8	6	4	241	121	8	11	5	155	189		
8	0	4	2253	2190	16	1	4	248	177	1	3	4	1330	1248	18	4	167	112	9	6	4	181	208	9	11	5	517	519		
9	0	4	1233	1209	15	1	4	132	105	2	3	4	1026	924	19	4	167	112	10	6	4	153	199	10	11	5	517	519		
10	0	4	885	858	14	1	4	1053	1031	3	3	4	1026	924	20	4	167	112	11	6	4	153	199	11	11	5	395	241		
11	0	4	1749	1780	13	1	4	1053	1031	4	3	4	1026	924	21	4	167	112	12	6	4	153	199	12	11	5	395	241		
12	0	4	247	267	12	1	4	1053	1031	5	3	4	1026	924	22	4	167	112	13	6	4	153	199	13	11	5	395	241		
13	0	4	163	147	11	1	4	1053	1031	6	3	4	1026	924	23	4	167	112	14	6	4	153	199	14	11	5	395	241		
14	0	4	597	561	10	1	4	1053	1031	7	3	4	1026	924	24	4	167	112	15	6	4	153	199	15	11	5	395	241		
15	0	4	766	777	9	1	4	1053	1031	8	3	4	1026	924	25	4	167	112	16	6	4	153	199	16	11	5	395	241		
16	0	4	167	117	8	1	4	1053	1031	9	3	4	1026	924	26	4	167	112	17	6	4	153	199	17	11	5	395	241		
17	0	4	162	123	7	1	4	1053	1031	10	3	4	1026	924	27	4	167	112	18	6	4	153	199	18	11	5	395	241		
18	0	4	160	97	6	1	4	1053	1031	11	3	4	1026	924	28	4	167	112	19	6	4	153	199	19	11	5	395	241		
19	0	4	953	935	5	1	4	1053	1031	12	3	4	1026	924	29	4	167	112	20	6	4	153	199	20	11	5	395	241		
-18	1	4	511	502	-4	2	4	1131	1131	1	2	4	151	245	-1	2	4	151	245	1	2	4	151	245	1	2	4	151	245	
-17	1	4	161	235	-3	2	4	1131	1131	2	2	4	151	245	-2	2	4	151	245	2	2	4	151	245	2	2	4	151	245	
-16	1	4	532	457	-2	2	4	1131	1131	3	2	4	151	245	-3	2	4	151	245	3	2	4	151	245	3	2	4	151	245	
-15	1	4	164	126	-1	2	4	1131	1131	4	2	4	151	245	-4	2	4	151	245	4	2	4	151	245	4	2	4	151	245	
-14	1	4	508	495	1	2	4	1131	1131	5	2	4	151	245	-5	2	4	151	245	5	2	4	151	245	5	2	4	151	245	
-13	1	4	140	1817	2	2	4	1131	1131	6	2	4	151	245	-6	2	4	151	245	6	2	4	151	245	6	2	4	151	245	
-12	1	4	140	1817	3	2	4	1131	1131	7	2	4	151	245	-7	2	4	151	245	7	2	4	151	245	7	2	4	151	245	
-11	1	4	140	1817	4	2	4	1131	1131	8	2	4	151	245	-8	2	4	151	245	8	2	4	151	245	8	2	4	151	245	
-10	1	4	121	1010	5	2	4	1131	1131	9	2	4	151	245	-9	2	4	151	245	9	2	4	151	245	9	2	4	151	245	
-9	1	4	121	1010	6	2	4	1131	1131	10	2	4	151	245	-10	2	4	151	245	10	2	4	151	245	10	2	4	151	245	
-8	1	4	154	100	7	2	4	1131	1131	11	2	4	151	245	-11	2	4	151	245	11	2	4	151	245	11	2	4	151	245	
-7	1	4	282	208	8	2	4	1131	1131	12	2	4	151	245	-12	2	4	151	245	12	2	4	151	245	12	2	4	151	245	
-6	1	4	154	244	9	2	4	1131	1131	13	2	4	151	245	-13	2	4	151	245	13	2	4	151	245	13	2	4	151	245	
-5	1	4	653	665	10	2	4	1131	1131	14	2	4	151	245	-14	2	4	151	245	14	2	4	151	245	14	2	4	151	245	
-4	1	4	167	169	11	2	4	1131	1131	15	2	4	151	245	-15	2	4	151	245	15	2	4	151	245	15	2	4	151	245	
-3	1	4	646	657	12	2	4	1131	1131	16	2	4	151	245	-16	2	4	151	245	16	2	4	151	245	16	2	4	151	245	
-2	1	4	632	652	13	2	4	1131	1131	17	2	4	151	245	-17	2	4	151	245	17	2	4	151	245	17	2	4	151	245	
-1	1	4	647	652	14	2	4	1131	1131	18	2	4	151	245	-18	2	4	151	245	18	2	4	151	245	18	2	4	151	245	
0	1	4	647	652	15	2	4	1131	1131	19	2	4	151	245	-19	2	4	151	245	19	2	4	151	245	19	2	4	151	245	
1	1	4	647	652	16	2	4	1131	1131	20	2	4	151	245	-20	2	4	151	245	20	2	4	151	245	20	2	4	151	245	
2	1	4	647	652	17	2	4	1131	1131	21	2	4	151	245	-21	2	4	151	245	21	2	4	151	245	21	2	4	151	245	
3	1	4	647	652	18	2	4	1131	1131	22	2	4	151	245	-22	2	4	151	245	22	2	4	151	245	22	2	4	151	245	
4	1	4	647	652	19	2	4	1131	1131	23	2	4	151	245	-23	2	4	151	245	23	2	4	151	245	23	2	4	151	245	
5	1	4	647	652	20	2	4	1131	1131	24	2	4	151	245	-24	2	4	151	245	24	2	4	151	245	24	2	4	151	245	
6	1	4	647	652	21	2	4	1131	1131	25	2	4	151	245	-25	2	4	151	245	25	2	4	151	245	25	2	4	151	245	
7	1	4	647	652	22	2	4	1131	1131	26	2	4	151	245	-26	2	4	151	245	26	2	4	151	245	26	2	4	151	245	
8	1	4	647	652	23	2	4	1131	1131	27	2	4	151	245	-27	2	4	151	245	27	2	4	151	245	27	2	4	151	245	
9	1	4	647	652	24	2	4	1131	1131	28	2	4	151	245	-28	2	4	151	245	28	2	4	151	245	28	2	4	151	245	
10	1	4	647	652	25	2	4	1131	1131	29	2	4	151	245	-29	2	4	151	245	29	2	4	151	245	29	2	4	151	245	
11	1	4	647	652	30	2	4	1131	1131	30	2	4	151	245	-30	2	4	151	245	30	2	4	151	245	30	2	4	151	245	
12	1	4	647	652	31	2	4	1131	1131	31	2	4	151	245	-31	2	4	151	245	31	2	4	151	245	31	2	4	151	245	
13	1	4	647	652	32	2	4	1131	1131	32	2	4	151	245	-32	2	4	151	245	32	2	4	151	245	32	2	4	151	245	
14	1	4	647	652	33	2	4	1131	1131	33	2	4	151	245	-33	2	4	151	245	33	2	4	151	245	33	2	4	151	245	
15	1	4	647	652	34	2	4	1131	1131	34	2	4	151	245	-34	2														

2	-9	5	1266	1267	7	-7	5L	168	57	10	-6	5	397	410	-10	-4	5L	166	56	4	-3	5	1967	2021	18	-2	5	440	447
3	-9	5	1349	1352	-5	-7	5L	168	18	12	-6	5	730	736	-9	-4	5	730	798	5	-3	5	799	807	19	-2	5L	164	192
4	-9	5	1214	1311	-5	-7	5	918	859	13	-6	5	1394	1456	-7	-4	5	1740	1785	6	-3	5	2589	2526	20	-2	5	486	448
5	-9	5L	167	58	-4	-7	5	749	757	13	-6	5	505	520	-7	-4	5	2450	2485	8	-3	5	868	800	-16	-1	5	249	289
6	-9	5	334	246	-3	-7	5	1726	1750	15	-6	5	1775	232	-5	-4	5	1371	1387	9	-3	5L	15	9	-15	-1	5	823	803
7	-9	5	432	330	-2	-7	5	890	910	15	-6	5	872	832	-5	-4	5	321	407	10	-3	5L	156	117	-14	-1	5	1319	1298
8	-9	5	325	334	-1	-7	5	1931	1927	17	-6	5	942	416	-3	-4	5	1949	1896	9	-3	5L	159	9	-13	-1	5	638	606
9	-9	5	526	615	0	-7	5	441	451	17	-6	5	488	523	-2	-4	5	2309	2272	12	-3	5	589	630	-12	-1	5	560	792
10	-9	5	328	555	2	-7	5L	1795	1793	18	-6	5	488	523	-1	-4	5	1540	1600	13	-3	5	581	583	-11	-1	5	564	507
11	-9	5L	168	82	2	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	621
12	-9	5L	169	48	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	255
13	-9	5	617	508	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
14	-9	5	617	508	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
15	-9	5	617	508	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
16	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
17	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
18	-9	5	257	133	8	-7	5	1449	1472	19	-5	5	386	406	6	-4	5	1531	1490	13	-3	5L	153	192	-5	-1	5	276	214
19	-9	5	519	539	10	-7	5	633	606	8	-5	5	1135	1031	6	-4	5	1531	1490	13	-3	5L	153	192	-5	-1	5	276	214
20	-9	5	442	439	11	-7	5	553	527	-7	-5	5	1191	1128	9	-4	5	1531	1490	13	-3	5L	153	192	-5	-1	5	276	214
21	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
22	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
23	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
24	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
25	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
26	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
27	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
28	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
29	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
30	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
31	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
32	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
33	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
34	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
35	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
36	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
37	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
38	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
39	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
40	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
41	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
42	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
43	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
44	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
45	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
46	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
47	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
48	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
49	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
50	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
51	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
52	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
53	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
54	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
55	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
56	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
57	-9	5	356	521	4	-7	5L	1531	1213	20	-6	5	833	855	0	-4	5	1587	1484	14	-3	5	914	935	-10	-1	5L	164	743
58	-9	5	356	521																									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																				

h	k	1	10F ₀	10F ₁	h	k	1	10F ₀	10F ₁	h	k	1	10F ₀	10F ₁	h	k	1	10F ₀	10F ₁
3	-8	6	1193	1219	-12	-6	6	590	598	4	-5	6	1162	1169	20	-4	6	820	822
4	-8	6	545	515	-11	-6	6	509	586	5	-5	6	706	557	-15	-3	6L	185	232
5	-8	6	472	451	-10	-6	6L	176	116	6	-5	6	322	416	-14	-3	6	403	524
6	-8	6	2193	2177	-9	-6	6	1065	1111	7	-5	6	348	320	-13	-3	6	561	584
7	-8	6	584	474	-8	-6	6	505	489	8	-5	6	277	236	-12	-3	6	882	911
8	-8	6	1638	1586	-7	-6	6	729	802	9	-5	6L	165	2224	-11	-3	6	655	207
9	-8	6	1006	977	-6	-6	6	174	204	10	-5	6	2215	224	-10	-3	6L	544	523
10	-8	6L	174	122	-5	-6	6L	170	122	11	-5	6	437	446	-9	-3	6	184	2037
11	-8	6	1011	986	-4	-6	6	880	929	12	-5	6	3114	3133	-8	-3	6	1381	2037
12	-8	6	310	229	-3	-6	6	336	360	13	-5	6	377	349	-7	-3	6	2438	2464
13	-8	6	745	805	-2	-6	6	485	436	14	-5	6	1514	1551	-6	-3	6	798	753
14	-8	6	795	825	-1	-6	6	533	541	15	-5	6L	176	74	-5	-3	6	1096	1044
15	-8	6	508	528	0	-6	6	336	359	16	-5	6L	177	86	-4	-3	6	396	317
16	-8	6	608	604	1	-6	6	134	132	17	-5	6	505	523	-3	-3	6	431	442
17	-8	6L	173	68	2	-6	6L	1008	947	18	-5	6L	175	262	-2	-3	6	2341	2179
18	-8	6L	175	335	3	-6	6	2357	2360	19	-5	6	504	507	-1	-3	6	1691	1652
19	-8	6	322	317	5	-6	6	288	299	20	-5	6	429	421	0	-3	6	3036	3022
-1	-7	6L	166	58	6	-6	6	238	239	-1	-4	6	429	451	2	-3	6	2723	2626
-2	-7	6	320	292	7	-6	6	1995	1912	-2	-4	6	843	559	3	-3	6	777	786
-3	-7	6	551	590	8	-6	6	537	461	-3	-4	6	966	923	4	-3	6	1501	1420
-4	-7	6	711	693	9	-6	6	171	187	-4	-4	6	387	337	5	-3	6	786	746
-5	-7	6	392	420	10	-6	6L	171	187	-5	-4	6L	177	214	6	-3	6	261	309
-6	-7	6	173	258	11	-6	6	285	231	-6	-4	6	2323	2323	7	-3	6L	161	53
-7	-7	6	1332	1418	12	-6	6	307	258	-7	-4	6	169	73	8	-3	6	259	144
-8	-7	6	630	550	13	-6	6	2358	2328	-8	-4	6	2453	2432	9	-3	6	1199	1199
-9	-7	6	528	552	14	-6	6L	177	148	-9	-4	6	322	253	10	-3	6	276	224
-10	-7	6	112	1117	15	-6	6	675	666	-10	-4	6	164	178	11	-3	6	726	709
1	-7	6	448	358	16	-6	6	344	320	-11	-4	6L	164	178	12	-3	6	312	373
2	-7	6	1335	1258	17	-6	6	411	363	-12	-4	6	1045	939	13	-3	6	401	344
3	-7	6	1045	1037	18	-6	6L	171	79	-13	-4	6	1115	1063	14	-3	6	893	905
4	-7	6	1193	1244	19	-6	6L	171	79	-14	-4	6	1081	1111	15	-3	6	1185	1127
5	-7	6	1343	1361	20	-6	6	580	567	-15	-4	6	580	567	16	-3	6	298	413
6	-7	6L	170	91	21	-6	6	616	613	-16	-4	6	1804	1804	17	-3	6	775	836
7	-7	6	3403	3427	22	-6	6	702	744	-17	-4	6	473	460	18	-3	6	973	934
8	-7	6	1057	1047	23	-6	6	756	759	-18	-4	6	257	156	19	-3	6L	163	80
9	-7	6	1387	1415	24	-6	6	1025	1011	-19	-4	6	723	641	20	-3	6	287	229
10	-7	6	254	287	25	-6	6L	179	173	-20	-4	6L	162	66	21	-3	6	1143	1140
11	-7	6L	172	121	26	-6	6L	171	52	-21	-4	6L	164	125	22	-3	6L	178	267
12	-7	6	535	510	27	-6	6L	173	66	-22	-4	6	774	799	23	-3	6L	178	267
13	-7	6L	174	71	28	-6	6	1199	1145	-23	-4	6	1948	1980	24	-3	6	356	287
14	-7	6	395	381	29	-6	6	304	240	-24	-4	6	452	394	25	-3	6	983	947
15	-7	6L	176	202	30	-6	6	368	398	-25	-4	6	1067	1084	26	-3	6	464	455
16	-7	6	310	229	31	-6	6L	165	54	-26	-4	6	1398	1415	27	-3	6	663	613
17	-7	6	483	586	32	-6	6	1398	1415	-27	-4	6L	177	268	28	-3	6	675	656
18	-7	6	262	254	33	-6	6L	165	315	-28	-4	6L	178	312	29	-3	6	1225	1201
19	-7	6	814	837	34	-6	6	968	947	-29	-4	6	882	942	30	-3	6	166	60
20	-7	6	300	395	35	-6	6L	163	153	-30	-4	6	638	628	31	-3	6	549	559
-1	-6	6L	164	157	36	-6	6	759	692	-31	-4	6L	1350	1345	32	-3	6	770	775
-2	-6	6L	164	157	37	-6	6	577	602	-32	-4	6L	170	175	33	-3	6	549	476

[illegible]

h	k	1	10F ₀	10F ₁	h	k	1	10F ₀	10F ₁	h	k	1	10F ₀	10F ₁	
8	5	7	180	150	9	-4	7	560	516	-8	-2	7	324	131	
7	6	5	7	475	421	-1	-2	7	1374	1381	10	-1	7	1279	1275
6	5	7	369	361	11	-4	7	257	259	-6	-2	7	179	175	
5	5	7	923	789	12	-4	7	1015	1003	-5	-2	7	1859	1859	
4	5	7	936	958	13	-4	7	197	390	-4	-2	7	540	580	
3	5	7	176	143	14	-4	7	17	12	-3	-2	7	470	393	
2	5	7	1739	1725	15	-4	7	375	322	-1	-2	7	2060	1001	
1	5	7	2366	2329	16	-4	7	847	528	-1	-2	7	2557	2460	
0	5	7	441	381	17	-4	7	1457	1514	1	-2	7	1151	1260	
-1	5	7	1392	1376	18	-4	7	415	212	1	-2	7	2699	2605	
-2	5	7	989	979	19	-4	7	1371	1414	2	-2	7	369	316	
-3	5	7	574	565	-14	-3	7	742	651	3	-2	7	408	431	
-4	5	7	672	624	-12	-3	7	959	963	4	-2	7	303	474	
-5	7	3	308	268	-10	-3	7	959	1011	5	-2	7	1137	1130	
-6	7	3	1439	1372	-9	-3	7	733	733	6	-2	7	1189	1233	
-7	7	3	170	173	-8	-3	7	100	39	7	-2	7	1473	1463	
-8	7	3	174	175	-8	-3	7	826	844	8	-2	7	2307	2310	
-9	5	7	1717	129	-7	-3	7	1154	1082	9	-2	7	584	508	
-10	5	7	1953	1932	-6	-3	7	1762	1850	10	-2	7	1165	1082	
-11	5	7	1719	65	-5	-3	7	847	812	11	-2	7	181	237	
-12	5	7	1922	1983	-4	-3	7	1777	1728	12	-2	7	180	111	
-13	5	7	388	373	-3	-3	7	776	682	13	-2	7	182	202	
-14	5	7	592	620	-2	-3	7	761	735	14	-2	7	182	41	
-15	7	3	1138	1153	0	-3	7	2975	2912	15	-2	7	417	396	
-16	7	3	1718	249	1	-3	7	687	684	16	-2	7	363	388	
-17	7	3	1712	85	2	-3	7	2314	2159	17	-2	7	172	176	
-18	7	3	1717	7	3	-3	7	515	515	18	-2	7	168	12	
-19	7	3	1717	1085	4	-3	7	348	300	19	-2	7	177	5	
-20	7	3	1717	285	5	-3	7	525	443	20	-2	7	510	551	
-21	7	3	1717	900	6	-3	7	170	188	21	-2	7	184	101	
-22	7	3	1717	900	7	-3	7	520	498	22	-2	7	317	293	
-23	7	3	1717	900	8	-3	7	1176	1155	23	-2	7	828	826	
-24	7	3	1717	900	9	-3	7	174	221	24	-2	7	181	50	
-25	7	3	1717	900	10	-3	7	1469	1411	25	-2	7	1717	1671	
-26	7	3	1717	900	11	-3	7	177	46	26	-2	7	969	959	
-27	7	3	1717	900	12	-3	7	177	85	27	-2	7	2226	2210	
-28	7	3	1717	900	13	-3	7	428	447	28	-2	7	898	845	
-29	7	3	1717	900	14	-3	7	253	289	29	-2	7	2180	2112	
-30	7	3	1717	900	15	-3	7	47	330	30	-2	7	894	866	
-31	7	3	1717	900	16	-3	7	672	675	31	-2	7	1790	1757	
-32	7	3	1717	900	17	-3	7	252	207	32	-2	7	1076	1081	
-33	7	3	1717	900	18	-3	7	1024	1060	33	-2	7	1825	1757	
-34	7	3	1717	900	19	-3	7	170	87	34	-2	7	837	849	
-35	7	3	1717	900	20	-3	7	176	173	35	-2	7	266	254	
-36	7	3	1717	900	21	-3	7	176	173	36	-2	7	1765	171	
-37	7	3	1717	900	22	-3	7	176	173	37	-2	7	1765	171	
-38	7	3	1717	900	23	-3	7	176	173	38	-2	7	1765	171	
-39	7	3	1717	900	24	-3	7	176	173	39	-2	7	1765	171	
-40	7	3	1717	900	25	-3	7	176	173	40	-2	7	1765	171	
-41	7	3	1717	900	26	-3	7	176	173	41	-2	7	1765	171	
-42	7	3	1717	900	27	-3	7	176	173	42	-2	7	1765	171	
-43	7	3	1717	900	28	-3	7	176	173	43	-2	7	1765	171	
-44	7	3	1717	900	29	-3	7	176	173	44	-2	7	1765	171	
-45	7	3	1717	900	30	-3	7	176	173	45	-2	7	1765	171	
-46	7	3	1717	900	31	-3	7	176	173	46	-2	7	1765	171	
-47	7	3	1717	900	32	-3	7	176	173	47	-2	7	1765	171	
-48	7	3	1717	900	33	-3	7	176	173	48	-2	7	1765	171	
-49	7	3	1717	900	34	-3	7	176	173	49	-2	7	1765	171	
-50	7	3	1717	900	35	-3	7	176	173	50	-2	7	1765	171	
-51	7	3	1717	900	36	-3	7	176	173	51	-2	7	1765	171	
-52	7	3	1717	900	37	-3	7	176	173	52	-2	7	1765	171	
-53	7	3	1717	900	38	-3	7	176	173	53	-2	7	1765	171	
-54	7	3	1717	900	39	-3	7	176	173	54	-2	7	1765	171	
-55	7	3	1717	900	40	-3	7	176	173	55	-2	7	1765	171	
-56	7	3	1717	900	41	-3	7	176	173	56	-2	7	1765	171	
-57	7	3	1717	900	42	-3	7	176	173	57	-2	7	1765	171	
-58	7	3	1717	900	43	-3	7	176	173	58	-2	7	1765	171	
-59	7	3	1717	900	44	-3	7	176	173	59	-2	7	1765	171	
-60	7	3	1717	900	45	-3	7	176	173	60	-2	7	1765	171	
-61	7	3	1717	900	46	-3	7	176	173	61	-2	7	1765	171	
-62	7	3	1717	900	47	-3	7	176	173	62	-2	7	1765	171	
-63	7	3	1717	900	48	-3	7	176	173	63	-2	7	1765	171	
-64	7	3	1717	900	49	-3	7	176	173	64	-2	7	1765	171	
-65	7	3	1717	900	50	-3	7	176	173	65	-2	7	1765	171	
-66	7	3	1717	900	51	-3	7	176	173	66	-2	7	1765	171	
-67	7	3	1717	900	52	-3	7	176	173	67	-2	7	1765	171	
-68	7	3	1717	900	53	-3	7	176	173	68	-2	7	1765	171	
-69	7	3	1717	900	54	-3	7	176	173	69	-2	7	1765	171	
-70	7	3	1717	900	55	-3	7	176	173	70	-2	7	1765	171	
-71	7	3	1717	900	56	-3	7	176	173	71	-2	7	1765	171	
-72	7	3	1717	900	57	-3	7	176	173	72	-2	7	1765	171	
-73	7	3	1717	900	58	-3	7	176	173	73	-2	7	1765	171	
-74	7	3	1717	900	59	-3	7	176	173	74	-2	7	1765	171	
-75	7	3	1717	900	60	-3	7	176	173	75	-2	7	1765	171	
-76	7	3	1717	900	61	-3	7	176	173	76	-2	7	1765	171	
-77	7	3	1717	900	62	-3	7	176	173	77	-2	7	1765	171	
-78	7	3	1717	900	63	-3	7	176	173	78	-2	7	1765	171	
-79	7	3	1717	900	64	-3	7	176	173	79	-2	7	1765	171	
-80	7	3	1717	900	65	-3	7	176	173	80	-2	7	1765	171	
-81	7	3	1717	900	66	-3	7	176	173	81	-2	7	1765	171	
-82	7	3	1717	900	67	-3	7	176	173	82	-2	7	1765	171	
-83	7	3	1717	900	68	-3	7	176	173	83	-2	7	1765	171	
-84	7	3	1717	900	69	-3	7	176	173	84	-2	7	1765	171	
-85	7	3	1717	900	70	-3	7	176	173	85	-2	7	1765	171	
-86	7	3	1717	900	71	-3	7	176	173	86	-2	7	1765	171	
-87	7	3	1717	900	72	-3	7	176	173	87	-2	7	1765	171	
-88	7	3	1717	900	73	-3	7	176	173	88	-2	7	1765	171	
-89	7	3	1717	900	74	-3	7	176	173	89	-2	7	1765	171	
-90	7	3	1717	900	75	-3	7	176	173	90	-2	7	1765	171	
-91	7	3	1717	900	76	-3	7	176	173	91	-2	7	1765	171	
-92	7	3	1717	900	77	-3	7	176	173	92	-2	7	1765	171	
-93	7	3	1717	900	78	-3	7	176	173	93	-2	7	1765	171	
-94	7	3	1717	900	79	-3	7	176	173	94	-2	7	1765	171	
-95	7	3	1717	900	80	-3	7	176	173	95	-2	7	1765	171	
-96	7	3	1717	900	81	-3	7	176	173	96	-2	7	1765	171	
-97	7	3	1717	900	82	-3	7	176	173	97	-2	7	1765	171	
-98	7	3	1717	900	83	-3	7	176	173	98	-2	7	1765	171	
-99	7	3	1717	900	84	-3	7	176	173	99	-2	7	1765	171	
-100	7	3	1717	900	85	-3	7	176	173	100	-2	7	1765	171	

h	k	1	10F ₀	10F ₀	h	k	1	10F ₀	10F ₀	h	k	1	10F ₀	10F ₀	h	k	1	10F ₀	10F ₀	
17	-2	8L	182	274	6	0	8	1473	1465	1	2	8	703	712	8	4	8	658	645	
-13	-1	8L	178	208	7	0	8L	194	290	2	2	8	502	524	-5	5	8L	175	24	
-12	-1	8L	185	263	8	0	8	589	623	3	2	8	622	532	-4	5	8	293	395	
-11	-1	8	458	521	9	0	8	1105	1062	4	2	8	908	927	3	5	8	637	609	
-10	-1	8L	194	171	10	0	8L	194	103	5	2	8L	191	231	-2	5	8	264	203	
-9	-1	8	631	646	11	0	8	1439	1311	6	2	8	322	359	-1	5	8	151	552	
-8	-1	8	303	349	12	0	8	409	426	7	2	8	751	754	0	5	8L	176	52	
-7	-1	8	402	409	13	0	8L	188	122	8	2	8	273	217	1	5	8L	182	280	
-6	-1	8	932	969	14	0	8	551	530	9	2	8	113	1102	2	5	8	331	392	
-5	-1	8	1147	1103	15	0	8	492	582	10	2	8	186	615	3	5	8	477	430	
-4	-1	8	1194	1225	16	0	8	1494	1325	11	2	8	604	613	-1	11	9	443	419	
-3	-1	8	702	652	-12	1	8	640	645	12	2	8	365	416	0	-11	9	463	542	
-2	-1	8L	191	1336	-11	1	8	280	234	-11	3	8	340	331	1	-11	9L	191	6	
-1	-1	8L	181	145	-10	1	8L	187	75	-10	3	8	667	666	9	-11	9L	192	90	
0	-1	8	1866	1810	-9	1	8L	185	136	-9	3	8	317	338	10	-11	9	402	256	
1	-1	8	1138	1040	-8	1	8	763	793	-8	3	8	975	1032	11	-11	9L	190	92	
2	-1	8	1763	1767	-7	1	8	313	218	-7	3	8L	187	188	12	-11	9L	188	237	
3	-1	8	2819	2672	-6	1	8L	189	123	-6	3	8	825	803	13	-11	9	421	324	
4	-1	8L	184	125	-5	1	8L	188	29	-5	3	8	277	74	14	-11	9	300	139	
5	-1	8	2616	2507	-4	1	8	1099	1137	-4	3	8	632	656	-4	-10	9L	184	27	
6	-1	8	1445	1508	-3	1	8	288	288	-3	3	8	855	894	-3	-10	9L	192	290	
7	-1	8	1059	1018	-2	1	8	888	878	-2	3	8	757	781	-2	-10	9L	192	278	
8	-1	8	1240	1197	-1	1	8	987	1028	-1	3	8	1110	1140	-1	-10	9	400	278	
9	-1	8L	189	22	0	1	8	375	361	0	3	8	1162	1166	0	-10	9L	193	138	
10	-1	8L	190	27	1	1	8	881	860	1	3	8L	188	155	1	-10	9L	196	107	
11	-1	8L	185	20	2	1	8	535	539	2	3	8	871	868	2	-10	9	358	885	
12	-1	8L	185	71	3	1	8	542	540	3	3	8	1153	1193	3	-10	9L	202	193	
13	-1	8L	186	78	4	1	8L	189	14	4	3	8	386	415	4	-10	9	1713	1708	
14	-1	8	543	672	5	1	8	478	421	5	3	8	681	656	5	-10	9	355	484	
15	-1	8	309	352	6	1	8L	188	250	6	3	8	379	294	6	-10	9	1358	1362	
16	-1	8	536	469	7	1	8	525	496	7	3	8L	191	278	7	-10	9L	211	376	
17	-1	8	252	512	8	1	8	188	163	8	3	8L	187	171	8	-10	9	401	376	
-13	-1	0	255	512	9	1	8	188	163	9	3	8L	187	171	9	-10	9	107	588	
-12	-1	0	555	592	10	1	8	173	127	10	3	8	183	114	10	-10	9	198	198	
-11	-1	0	636	575	11	1	8	540	575	11	3	8	324	330	11	-10	9	133	147	
-10	-1	0	636	641	12	1	8	564	507	12	4	8	406	366	12	-10	9L	197	268	
-9	-1	0	8	192	180	13	1	8	564	507	13	4	8	426	416	13	-10	9	322	345
-8	-1	0	8	326	280	14	1	8L	179	24	-6	4	8	435	245	14	-10	9L	184	132
-7	-1	0	8	583	560	-12	2	8	517	526	-5	4	8	535	531	15	-10	9	184	116
-6	-1	0	8	583	560	-11	2	8L	181	75	-4	4	8	518	526	-6	-9	9L	184	116
-5	-1	0	8	594	603	-10	2	8	563	560	-3	4	8	878	925	-5	-9	9L	270	255
-4	-1	0	8	594	603	-9	2	8	1079	1114	-2	4	8	1073	1119	-4	-9	9	694	651
-3	-1	0	8	537	560	-8	2	8	316	349	-1	4	8	943	934	-3	-9	9L	196	141
-2	-1	0	8	511	484	-7	2	8	326	950	0	4	8	504	543	-2	-9	9	1065	1052
-1	-1	0	8L	185	220	-6	2	8L	191	72	1	4	8	758	727	-1	-9	9L	196	58
0	-1	0	8	1488	1469	-5	2	8L	186	75	2	4	8	325	339	0	-9	9	509	508
1	-1	0	8	1364	1311	-4	2	8L	191	128	3	4	8	765	779	1	-9	9	336	377
2	-1	0	8	2429	2393	-3	2	8	289	328	4	4	8	185	105	2	-9	9L	202	157
3	-1	0	8	461	458	-2	2	8	531	533	5	4	8	559	628	3	-9	9	834	827
4	-1	0	8	2294	2298	-1	2	8	331	310	6	4	8	711	701	4	-9	9	371	341
5	-1	0	8	603	602	0	2	8	457	487	7	4	8L	178	21	5	-9	9	453	522

[illegible]

4	-5	11	123	48	1	-4	1	607	560	7	-2	11	119	155	6	-10	12	793	855	-1	-6	12	830	882	12	-4	12	340	376	10	10
-3	-5	11	125	1246	2	-4	1	2010	1926	7	-2	11	117	106	8	-10	12	881	528	1	-6	12	218	188	-3	-3	12	652	720	10	10
-2	-6	11	802	806	3	-4	1	222	270	9	-2	11	117	106	9	-10	12	351	342	2	-6	12	442	415	-2	-3	12	214	281	10	10
-1	-6	11	803	1027	4	-4	1	156	136	10	-2	11	117	106	9	-10	12	351	342	3	-6	12	908	851	-1	-3	12	329	237	10	10
0	-6	11	806	760	5	-4	1	756	704	11	-2	11	205	293	7	-9	12	351	342	4	-6	12	222	275	0	-3	12	329	237	10	10
1	-6	11	647	653	6	-4	1	708	674	12	-2	11	205	293	7	-9	12	351	342	5	-6	12	627	563	3	-3	12	220	178	10	10
2	-6	11	317	317	7	-4	1	528	558	13	-2	11	825	812	4	-9	12	1252	1285	6	-6	12	331	269	5	-5	12	488	493	10	10
3	-6	11	288	690	8	-4	1	1248	117	14	-2	11	1074	1034	5	-9	12	1209	1266	7	-6	12	352	402	5	-5	12	221	82	10	10
4	-6	11	271	884	9	-4	1	461	365	15	-2	11	1074	1034	5	-9	12	1209	1266	8	-6	12	352	402	5	-5	12	221	82	10	10
5	-6	11	137	137	10	-4	1	461	365	16	-2	11	1074	1034	5	-9	12	1209	1266	9	-6	12	352	402	5	-5	12	221	82	10	10
6	-6	11	488	137	11	-4	1	682	702	17	-2	11	836	827	6	-9	12	1103	1209	10	-6	12	740	793	9	-5	12	163	1570	10	10
7	-6	11	488	460	12	-4	1	215	206	18	-2	11	836	827	6	-9	12	1103	1209	11	-6	12	740	793	9	-5	12	163	1570	10	10
8	-6	11	518	538	13	-4	1	557	335	19	-2	11	881	858	7	-9	12	1204	149	12	-6	12	121	522	10	-4	12	421	455	10	10
9	-6	11	218	396	14	-4	1	206	486	20	-2	11	881	858	7	-9	12	1204	149	13	-6	12	205	519	10	-4	12	216	216	10	10
10	-6	11	244	411	15	-4	1	544	206	21	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-3	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
11	-6	11	274	366	16	-4	1	214	214	22	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-4	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
12	-6	11	274	366	17	-4	1	895	981	23	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-5	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
13	-6	11	274	366	18	-4	1	895	981	24	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-6	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
14	-6	11	274	366	19	-4	1	895	981	25	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-7	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
15	-6	11	274	366	20	-4	1	895	981	26	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-8	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
16	-6	11	274	366	21	-4	1	895	981	27	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-9	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
17	-6	11	274	366	22	-4	1	895	981	28	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-10	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
18	-6	11	274	366	23	-4	1	895	981	29	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-11	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
19	-6	11	274	366	24	-4	1	895	981	30	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-12	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
20	-6	11	274	366	25	-4	1	895	981	31	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-13	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
21	-6	11	274	366	26	-4	1	895	981	32	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-14	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
22	-6	11	274	366	27	-4	1	895	981	33	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-15	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
23	-6	11	274	366	28	-4	1	895	981	34	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-16	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
24	-6	11	274	366	29	-4	1	895	981	35	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-17	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
25	-6	11	274	366	30	-4	1	895	981	36	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-18	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
26	-6	11	274	366	31	-4	1	895	981	37	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-19	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
27	-6	11	274	366	32	-4	1	895	981	38	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-20	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
28	-6	11	274	366	33	-4	1	895	981	39	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-21	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
29	-6	11	274	366	34	-4	1	895	981	40	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-22	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
30	-6	11	274	366	35	-4	1	895	981	41	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-23	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
31	-6	11	274	366	36	-4	1	895	981	42	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-24	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
32	-6	11	274	366	37	-4	1	895	981	43	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-25	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
33	-6	11	274	366	38	-4	1	895	981	44	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-26	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
34	-6	11	274	366	39	-4	1	895	981	45	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-27	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
35	-6	11	274	366	40	-4	1	895	981	46	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-28	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
36	-6	11	274	366	41	-4	1	895	981	47	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-29	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
37	-6	11	274	366	42	-4	1	895	981	48	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-30	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
38	-6	11	274	366	43	-4	1	895	981	49	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-31	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
39	-6	11	274	366	44	-4	1	895	981	50	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-32	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
40	-6	11	274	366	45	-4	1	895	981	51	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-33	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
41	-6	11	274	366	46	-4	1	895	981	52	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-34	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
42	-6	11	274	366	47	-4	1	895	981	53	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-35	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
43	-6	11	274	366	48	-4	1	895	981	54	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-36	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
44	-6	11	274	366	49	-4	1	895	981	55	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-37	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
45	-6	11	274	366	50	-4	1	895	981	56	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-38	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
46	-6	11	274	366	51	-4	1	895	981	57	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-39	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
47	-6	11	274	366	52	-4	1	895	981	58	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-40	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
48	-6	11	274	366	53	-4	1	895	981	59	-2	11	648	659	-1	-8	12	507	469	-41	-6	12	611	519	10	-4	12	216	216	10	10
49	-6	11	274	366	54	-4	1	895	981	60	-2	11	648	659	-1</																

6.3.

Abb. 30

Alternierende Bindungslängen im Hexamolybdat-Cyclophosphazen (104,105)




Abb. 31

Bindungslängen $W - O_b$ im $[NR_4]_2W_6O_{19}$

Anion (019)





Abb. 31 Fortsetzung

Bindungslängen $W - O_b$ im $[NR_4]_2W_6O_{19}$

Anion (O_{20})



6.4.

Tabelle 28

Bindungslängen einerseits zwischen Stickstoff- und Kohlenstoffatomen und andererseits zwischen den Kohlenstoffatomen untereinander für die Kationen (N1) und (N2). Nummerierung der Stickstoff- und Kohlenstoffatome siehe Abbildungen 27 und 28.

(N1)		(N2)	
Bindung	d[Å]	Bindung	d[Å]
N1 - C111	1,49(4)	N2 - C211	1,55(2)
- C121	1,58(4)	C221	1,56(4)
- C131	1,53(3)	C231	1,53(2)
- C141	1,55(4)	C241	1,53(3)
C111 - C112	1,46(4)	C211 - C212	1,54(3)
C112 - C113	1,56(6)	C212 - C213	1,57(3)
C113 - C114	1,46(6)	C213 - C214	1,57(3)
C121 - C122	1,55(6)	C221 - C222	1,54(4)
C122 - C123	1,34(9)	C222 - C223	1,60(4)
C123 - C124	1,53(8)	C223 - C224	1,51(3)
C131 - C132	1,55(4)	C231 - C232	1,54(3)
C132 - C133	1,56(5)	C232 - C233	1,56(3)
C133 - C134	1,45(6)	C233 - C234	1,47(6)
C141 - C142	1,53(5)	C241 - C242	1,54(4)
C142 - C143	1,53(4)	C242 - C243	1,57(3)
C143 - C144	1,46(5)	C243 - C244	1,55(3)

Tabelle 29

Winkel an den Stickstoffatomen und den aliphatischen Ketten für die Kationen (N1) und (N2).

(N1)		(N2)	
Winkel	[Grad]	Winkel	[Grad]
C111- N1 -C121	108,1(18)	C211- N2 -C221	111,1(17)
C131	109,5(23)	C231	104,1(12)
C141	112,2(17)	C241	114,2(16)
C121 C131	113,6(17)	C221 C231	110,0(16)
C141	104,6(23)	C241	105,0(14)
C131 C141	109,0(16)	C231 C241	112,7(17)
N1 -C111-C112	118,3(30)	N2 -C211-C212	112,6(14)
C111-C112-C113	109,7(33)	C211-C212-C213	106,1(15)
C112-C113-C114	112,9(44)	C212-C213-C214	110,7(17)
N1 -C121-C122	115,7(24)	N2 -C221-C222	113,9(15)
C121-C122-C123	113,0(35)	C221-C222-C223	107,6(17)
C122-C123-C124	110,7(39)	C222-C223-C224	113,5(24)
N1 -C131-C132	113,3(20)	N2 -C231-C232	116,1(14)
C131-C132-C133	109,6(25)	C231-C232-C233	108,2(16)
C132-C133-C134	111,8(26)	C232-C233-C234	112,6(23)
N1 -C141-C142	112,8(29)	N2 -C241-C242	114,0(15)
C141-C142-C143	107,8(31)	C241-C242-C243	109,9(18)
C142-C143-C144	113,0(37)	C242-C243-C244	111,3(21)

6.5.

Tabelle 30

Anisotrope Temperaturfaktoren der Kohlenstoffatome;
für die Temperaturfaktoren $U_{ij} [Å^2]$ gelten die Gleichungen (G 25) und (G 28); sie sind mit dem Faktor 10^3 multipliziert.

	U_{11}	U_{22}	U_{33}	U_{12}	U_{13}	U_{23}
C111	78(17)	90(18)	89(21)	53(15)	2(15)	22(16)
C112	147(28)	75(18)	111(25)	33(18)	-19(21)	34(18)
C113	197(36)	32(13)	137(29)	24(17)	-45(26)	24(16)
C114	369(70)	136(35)	142(39)	140(43)	-82(43)	8(30)
C121	168(29)	75(18)	49(17)	47(18)	0(17)	23(14)
C122	228(47)	73(20)	115(28)	59(25)	-9(29)	14(19)
C123	568(99)	94(25)	120(37)	139(41)	17(48)	58(26)
C124	216(40)	104(24)	143(32)	20(25)	-55(29)	80(24)
C131	63(15)	97(20)	71(18)	5(14)	-20(13)	27(15)
C132	61(17)	181(34)	99(26)	23(19)	-2(17)	36(24)
C133	104(22)	117(23)	96(23)	52(18)	-41(18)	20(19)
C134	97(21)	196(35)	117(26)	87(23)	21(19)	96(26)
C141	88(19)	111(22)	68(19)	49(17)	3(15)	15(17)
C142	93(19)	117(23)	79(21)	57(17)	7(16)	35(18)
C143	79(18)	120(25)	135(28)	50(17)	20(18)	68(22)
C144	118(23)	94(20)	98(24)	39(18)	21(19)	55(18)
C211	59(13)	42(11)	49(14)	8(10)	-1(11)	8(10)
C212	54(13)	53(13)	76(17)	18(11)	17(12)	11(12)
C213	55(14)	100(19)	74(17)	12(13)	4(12)	46(15)
C214	85(19)	153(28)	73(21)	59(19)	25(16)	42(20)
C221	96(17)	30(10)	62(15)	21(11)	-19(13)	17(10)
C222	85(16)	70(15)	55(14)	18(12)	-41(12)	22(12)
C223	117(21)	50(14)	98(20)	34(14)	-44(17)	21(14)
C224	104(21)	83(18)	92(21)	45(16)	17(17)	52(16)
C231	68(13)	45(11)	47(13)	27(10)	-2(10)	12(10)
C232	46(12)	66(14)	50(14)	11(10)	16(10)	21(11)
C233	66(16)	74(16)	69(18)	16(13)	-2(13)	9(14)
C234	96(20)	112(24)	115(26)	57(18)	4(19)	39(20)
C241	68(14)	61(14)	37(13)	4(11)	-19(11)	23(11)
C242	81(16)	51(13)	63(16)	12(12)	-16(13)	21(12)
C243	86(16)	73(15)	55(15)	15(13)	-22(13)	34(12)
C244	83(17)	114(20)	27(13)	32(15)	-3(12)	17(13)

6.6. Schwingungsfrequenzen der Polywolframate in IR- und Ramanspektren

Die Schwingungsfrequenzen und damit die Banden in IR- und Ramanspektren hängen von den beteiligten Massen, den Bindungskräften, von der Symmetrie usw. ab. Wenn im Verlauf der Schwingung eine Änderung der Polarisierbarkeit auftritt, läßt sich eine Ramanbande erfassen (Lichtstreuung). Molekülschwingungen, die dabei eine Änderung des Dipolmomentes verursachen, rufen Lichtabsorption im IR-Bereich hervor.

Es lassen sich für bestimmte Baugruppen Erwartungsbereiche angeben. Für die Frequenzen in Polywolframaten sind von R. Mattes (232) Untersuchungen gemacht worden. Z. B. gibt er für die terminalen Metallsauerstoffatomschwingungen folgende Werte an (in $[cm^{-1}]$):

	1 O_t	2 O_t, C_{2v}	3 O_t, C_{3v}
ω^{VI}	970 - 1050	ν_s 930 - 970 ν_{as} 880 - 920	ν_s 900 - 940 ν_{as} 810 - 860

Im Gegensatz zum sonst üblichen Befund liegen hier bei den endständigen Sauerstoffatomen die symmetrischen Schwingungsfrequenzen bei höheren Wellenzahlen als die der asymmetrischen Schwingungen.

Verbrückende Wolframatom - Sauerstoffatom - Wolframatom-Schwingungen allgemein kann man im Bereich von 450 - 900 $[\text{cm}^{-1}]$ erwarten, z. B. Schwingungen eckenverknüpfender $\text{W}-\text{O}-\text{W}$ -Bindungen mit 180 $[\text{Grad}]$ Winkel und lokaler $D_{\infty h}$ -Symmetrie haben wegen großer Orbitalüberlappung Werte etwa zwischen 800 - 900 $[\text{cm}^{-1}]$. Wenn der Winkel deutlich kleiner wird als 180 $[\text{Grad}]$ - es liegt dann lokal C_{2v} -Symmetrie vor - entstehen Banden bei niedrigeren Wellenzahlen.

Die Schwingungsfrequenzen von $\text{W} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{smallmatrix} \text{W}$ -Brücken befinden sich unterhalb von 850 $[\text{cm}^{-1}]$. Die Metallvalenz-, Metalldeformations- und Metallsauerstoffdeformations-schwingungen treten unter 500 $[\text{cm}^{-1}]$ auf.

Text zu Abb. 32 bis 34

Das IR- und Ramanspektrum des Tetrabutylammoniumhexawolframats

Die Spektren des Hexawolframats sind aufgrund der an Polyanionen mit M_6O_{19} -Struktur durchgeführten Normalkoordinatenanalyse (97,98,108,36,63) und der Untersuchungen von R. Mattes (232) genau bekannt. Idealisiert gehört das Wolframation zur Symmetriegruppe O_h . Da ein Symmetriezentrum vorliegt, gilt das Alternativverbot: Schwingungen die, bezogen auf das Zentrum, symmetrisch verlaufen sind ramanaktiv, jene die, bezogen auf das

Zentrum, antisymmetrisch verlaufen sind infrarotaktiv. Durch die hohe Symmetrie sind die Spektren relativ bandenarm: 11 ramanaktive ($3A_{1g}$, $4E_g$, $4F_{2g}$) und 7 infrarotaktive (F_{1u}) Banden.

Zuordnung einiger Banden (97,98):

Mit den höchsten Frequenzen treten die Schwingungen der terminalen Sauerstoffatome auf, die polarisierte Bande 995 [cm^{-1}] (Rasse A_{1g} , gleichphasig) und die depolarisierte Bande 972 [cm^{-1}] (E_g , ungleichphasig) im Ramanspektrum und die Bande 975 [cm^{-1}] (F_{1u} , ungleich-




Abb. 32 Das IR-Spektrum des kristallinen Tetrabutylammoniumhexawolframats; Gerät Beckmann IR-11 und IR-7; Nujol; weiterer Text s. o.




Abb. 33 Das Ramanspektrum des kristallinen Tetra-
butylammoniumhexawolframats; Gerät Cary 82;
Krypton-Laser, 6471 [Å], Leistung an der
Probe 400 mW; sensitivity: a = 20000, b =
1,1·5000 CTS/SEC; weiterer Text s. o.

phasig) im IR-Spektrum. Das in Aceton aufgenommene
Spektrum zeigt zwar um wenige Wellenzahlen verschobene
Banden, bietet aber die Möglichkeit der Bestimmung des
Depolarisationsgrades. Auch zeigt sich ein weiterer
Vorteil der organischen Kationen, wie zum Beispiel
durch das Tetrabutylammoniumkation. Die Feststoff- und
Lösungsspektren lassen sich gut vergleichen, da die
chemische Umgebung der Anionen jeweils ähnlich ist.
Von den asymmetrischen $W-O$ -Banden ist eine bei




Abb. 34 Das Ramanspektrum des in Aceton gelösten Tetrabutylammoniumhexawolframats (aus 97); a = $I_{||}$, b = $I_{\perp}$, x = Acetonbanden; Aufnahme-
gerät: Spex-Spektrometer (Ar-Laser, 5145[Å];
weiterer Text s. o.

840 [cm^{-1}] ramanaktiv (E_g) und eine bei 815 infrarot-
aktiv (F_{1u}), von den symmetrischen, tieferliegenden
eine IR-aktiv, 587 [cm^{-1}] (F_{1u}) und drei ramanaktiv
662 (F_{2g}); 561 (A_{1g} , polarisiert) und 505 (E_g) [cm^{-1}].
Beim Hexamolybdat existiert statt der drei letzten
nur eine stark verbreiterte bei 580 [cm^{-1}], was zu der

Vorhersage der Ungleichartigkeit der Mo—O_b-Bindungen führte. Die W—O_c-Bindung gibt Anlaß zu einer IR-aktiven starken Bande bei 445 [cm⁻¹] (asymmetrische Valenzschwingung), zu einer polarisierten bei 235 (A_{1g}) und einer depolarisierten bei 181 (E_g) [cm⁻¹]. Die restlichen Banden sind Metall- und Deformationsschwingungen zuzuordnen.

7. Literaturverzeichnis

- (1) H. Siebert
Z. anorg. allg. Chem. 275, 225 (1954)
- (2) L. A. Woodward u. H. L. Roberts
Trans Faraday Soc. 52, 615 (1956)
- (3) R. H. Busy u. O. L. Keller
J. Chem. Phys. 41, 215 (1964)
- (4) L. Pauling
J. Am. Chem. Soc. 51 (1929) 2868
- (5) G. Jander u. U. Krüerke
Z. anorg. allg. Chem. 265, 244 (1951)
- (6) D. L. Kepert
Prog. inorg. Chem. IV., 199 (1962)
- (7) O. Glemser, W. Holznagel, W. Höltje u.
E. Schwarzmann
Z. Naturforsch. 20b, 725 (1965)
- (8) K. F. Jahr u. J. Fuchs
Angew. Chem. 78, 725 (1966)
- (9) G. Jander u. W. Heukeshoven
Z. anorg. Chem. 187, 62 (1930)
- (10) G. Ewald
Diplomarbeit, Humboldt-Universität Berlin (1951)
- (11) P. Souchay
Ann. Chim. 18, 61, 169 (1943)
- (12) G. Jander u. F. Exner
Z. phys. Chem. A 190, 195 (1942)

- (13) G. Jander, D. Mojert u. T. Aden
Z. anorg. allg. Chem. 180, 129 (1929)
- (14) H. Schulz u. G. Jander
Z. anorg. allg. Chem. 162, 141 (1927)
- (15) I. Hapke
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. TU Berlin (1955)
- (16) J. F. Duncan u. D. L. Kepert
J. Chem. Soc. (London) 1961, 5317
- (17) O. Glemser u. W. Holznagel
Angew. Chem. 72, 918 (1960)
- (18) W. Höltje
Diplomarbeit, Göttingen (1963)
- (19) H. G. Wendlandt u. O. Glemser
Angew. Chem., internat. Edit. 3, 47 (1964)
- (20) O. Glemser u. W. Höltje
Z. Naturforsch. 20b, 492 (1965)
- (21) I. Aveston
Inorg. Chem. 3, 981 (1964)
- (22) O. Glemser
Angew. Chem. 73, 785 (1961)
- (23) Gmelins Handbuch d. anorg. Chem., Syst. Nr. 52
Chrom, Teil B, 8. Aufl. Weinheim/Bergstraße (1962)
- (24) A. Bystrom u. K.-A. Wilhelmi
Acta chem. scand. 4, 1131 (1950)
- (25) B. O. Loopstra u. P. Boldrini
Acta Cryst. 21, 158 (1966)

- (26) G. Schwarzenbach u. J. Meier
J. Inorg. Nucl. Chem. 8, 302 (1958)
- (27) G. Schwarzenbach, G. Geier u. J. Littler
Helv. Chim. Acta 45, 2601 (1962)
- (28) K. H. Tytko u. O. Glemser
Chimia (Aarau, Schweiz) 23, 494 (1969)
- (29) K. H. Tytko u. O. Glemser
Z. Naturforsch. 26b, 659 (1971)
- (30) K. F. Wissburn, D. M. Frency u. A. Patterson
Z. phys. Chem. 58, 693 (1954)
- (31) P. Ruetschi
Z. phys. Chem. 5, 323 (1955)
- (32) M. Eigen u. J. Schoen
Z. Elektrochem. 59, 483, 986 (1955)
- (33) Y. Sasaki
Acta chem. scand. 15, 175 (1961)
- (34) K. H. Tytko u. B. Schönfeld
Z. Naturforsch. 30b, 471 (1975)
- (35) K. F. Jahr u. H. Witzmann
Z. anorg. allg. Chem. 208, 145 (1932)
- (36) J. Fuchs
Z. Naturforsch. 28b, 389 (1973)
- (37) Laurent
Ann. Chim. Phys. (3) 21, 59 (1847)
- (38) E. F. Anton
J. prakt. Chem. (1) 8, 403 (1836)

- (39) Lotz
J. prakt. Chem. 63, 209 (1854)
- (40) Lotz
J. prakt. Chem. 83, 273 (1861)
- (41) Marignac
C. R. 55, II, 288 (1862)
- (42) Marignac
Ann. Chim. Phys. (3) 69, 41 (1863)
- (43) Forcher
J. prakt. Chem. 86, 240 (1862)
- (44) Lefort
Ann. Chim. Phys. 9, 96 (1876)
- (45) Gibbs
Ann. Chem. J. 1, 218 (1897); 7, 236 (1886)
- (46) G. v. Knorre
Ber. 19, 819 (1886)
- (47) C. Gonzalez
J. prakt. Chem. (2) 36, 44 (1887)
- (48) Junius
Z. anorg. Chem. 46, 445 (1903)
- (49) E. F. Smith
J. Am. Chem. Soc. 44, 2027 (1922)
- (50) G. Jander, D. Mojert u. Th. Aden
Z. anorg. Chem. 180, 133 (1929)
- (51) Rosenheim u. Wolff
Z. anorg. Chem. 193, 52 (1930)

- (52) Vallence
J. Chem. Soc. 1421 (1931)
- (53) R. C. Wells
J. Am. Chem. Soc. 29, 115 (1907)
- (54) Gmelins Handbuch der Anorg. Chem., 8, Aufl.,
Wolfram (System-Nr. 54) Berlin (1933)
- (55) G. v. Knorre
Ber. dtsh. chem. Ges. 18, 2362 (1885)
- (56) R. Kubens
Dissertation, Humboldt-Universität Berlin (1952)
- (57) O. Glemser u. W. Hölzje
Z. Naturforsch. 20b, 398 (1965)
- (58) O. Glemser u. K. H. Tytko
Z. Naturforsch. 24b, 648 (1969)
- (59) J. Fuchs u. K. F. Jahr
Z. Naturforsch. 23b, 1380 (1968)
- (60) E. Birkholz, J. Fuchs, W. Schiller u. H. P. Stock
Z. Naturforsch. 26b, 365 (1971)
- (61) H. Hartl, W. Freiwald, W. Schiller u. J. Fuchs
Z. Naturforsch. 26b, 364 (1971)
- (62) J. Fuchs, H. Hartl u. W. Schiller
Angew. Chem. 85, 417 (1973)
- (63) J. Fuchs, H. Hartl, W. Schiller u. U. Gerlach
Acta Cryst. B 32, 740 (1976)
- (64) W. Schiller
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1973)

- (65) R. Grase
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin
in Vorbereitung
- (66) J. Fuchs u. R. Grase
Veröffentlichung, in Vorbereitung
- (67) K. F. Jahr, J. Fuchs, P. Witte u. E.-P. Flindt
Chem. Ber. 98, 3588 (1965)
- (68) W. Freiwald
Diplomarbeit, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1970)
- (69) V. Cordis, K. H. Tytko u. O. Glemser
Z. Naturforsch. 30b, 834 (1975)
- (70) I. Lindquist
Acta chem. scand. 4 I, 551 (1950)
- (71) I. Lindquist
Acta Cryst. 5, 667 (1952)
- (72) H. Lipscomb
Inorg. Chem. 4, 132 (1965)
- (73) G. Weiss
Z. anorg. allg. Chem. 279, 368 (1969)
- (74) R. Allmann
Acta Cryst. 27, 1393 (1971)
- (75) H. d'Amour u. R. Allmann
Z. Kristallogr. 136, 23 (1972)
- (76) H. d'Amour u. R. Allmann
Z. Kristallogr. 138, 5 (1973)
- (77) Y. H. Tsay u. J. V. Silverston
Z. Kristallogr. 137, 256 (1973)

- (78) H. T. Evans jr.
Acta Cryst. B 32, 1565 (1976)
- (79) J. F. Keggin
Nature (London) 131, 908 (1933); 132, 351 (1933)
- (80) J. F. Keggin
Proc. Roy. Soc. (London) A 144, 75 (1934)
- (81) J. W. Illingworth u. J. F. Keggin
J. Chem. Soc. (London) 575 (1935)
- (82) R. Singer u. H. Gross
Helv. Chem. Acta 17, 1076 (1934)
- (83) Bradley and J. W. Illingworth
Proc. Roy. Soc. (London) 157, 113 (1936)
- (84) J. W. Linnet
J. Chem. Soc. (London) 3796 (1961)
- (85) H. d'Amour u. R. Allmann
Z. Kristallogr., im Druck
- (86) H. d'Amour u. R. Allmann
noch unveröffentl.
- (87) V. I. Spicyn, H.-J. Lunk, V. F. Cuvaev u.
J. D. Kolli
Z. anorg. Chem. 370, 191 (1969)
- (88) M. T. Pope and G. M. Varga jr.
Chem. Communications, 653 (1966)
- (89) G. Schott u. C. Harzdorf
Z. anorg. allg. Chem. 288, 15 (1956)
- (90) H. A. Levy, P. A. Agron u. M. D. Danford
J. Chem. Phys. 30, 1486 (1959)

- (91) K. Nishikawa, A. Kobayashi and Y. Sasaki
Bull. Chem. Soc. Jap. Vol. 48 (3) 889 (1975)
- (92) J. Stahnke
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1974)
- (93) F. Cheveau, M. Boyer u. B. le Meur
C. R. Acad. Sci. C 268, 479 (1969)
- (94) H. T. Evans
J. Persp. Struct. Chem. IV, 1 (1971)
- (95) G. Henning
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1968)
- (96) G. Henning u. A. Hüllen
Z. Kristallogr. 130, 162 (1969)
- (97) H. Bierbüße
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1971)
- (98) R. Mattes, H. Bierbüße u. J. Fuchs
Z. anorg. allg. Chem. 385, 230 (1971)
- (99) H. T. Evans
J. Am. Chem. Soc. 90, 3275 (1968)
- (100) A. Perloff
Inorg. Chem. 9, 2228 (1970)
- (101) H. P. Stock
Z. Naturforsch. 20b, 933 (1965)
- (102) I. Lindquist
Ark. Kemi 5, 247 (1953)
- (103) I. Lindquist u. B. Aronsson
Ark. Kemi 7, 49 (1955)
- (104) H. R. Allcock, E. C. Bissell, E. T. Shawl
J. Am. Chem. Soc. 94, 8603 (1972)

- (105) H. R. Allcock, E. C. Bissell and E. T. Shawl
Inorg. Chem. 12, 2963 (1973)
- (106) K. F. Jahr u. J. Fuchs
Chem. Ber. 96, 2457 (1963)
- (107) J. Fuchs, K. F. Jahr u. A. Nebelung
Chem. Ber. 100, 2415 (1967)
- (108) J. Fuchs u. K. F. Jahr
Z. Naturforsch. 23b, 1380 (1968)
- (109) K. F. Jahr, J. Fuchs u. R. Oberhauser
Chem. Ber. 101, 477 (1968)
- (110) R. Oberhauser
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1967)
- (111) K. F. Jahr u. J. Fuchs
Z. Naturforsch. 14b, 470 (1959)
- (112) K. F. Jahr u. J. Fuchs
Z. anal. Chem. 176, 269 (1960)
- (113) G. Jander u. D. Ertl
J. Inorg. Nucl. Chem. 3, 139 (1956); 14, 77 (1960)
- (114) A. Clays
Anal. Chim. Acta 17, 360 (1957)
- (115) C. Scheibler
J. prakt. Chem. 83, 273 (1861)
- (116) V. I. Spitzin
Z. anal. Chem. 75, 433 (1928)
- (117) P. Raff u. W. Brotz
Z. anal. Chem. 133, 241 (1951)
- (118) W. Geilmann u. W. Gehbauer
Z. anal. Chem. 139, 161 (1953)

- (119) K. Sporek u. A. F. Williams
Analyst 80, 347 (1955)
- (120) G. O. Müller
Praktikum d. quant. chem. Analyse
S. Hirzel Verlag, Leipzig
- (121) G. Jander u. D. Mojert
Z. anorg. allg. Chem. 175, 270 (1928)
- (122) G. Schwarzenbach u. J. Meier
Helv. Chim. Acta 40, 907 (1957)
- (123) K. H. Tytko u. O. Glemser
Z. Naturforsch. 25b, 429 (1970)
- (124) A. Hüllen
Naturwissenschaften 51, 508 (1964)
- (125) A. Hüllen
Ber. d. Bunsengesellschaft, 598 (1966)
- (126) S. V. Borisov, R. F. Klevtsova and N. V. Belov
Kristallographia 13, 980 (1968);
Soviet Physics Cryst. 13, 852 (1969)
- (127) P. Scharner
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1965)
- (128) K. F. Jahr u. E. Lothar
Ber. dtsh. chem. Ges. 71, 1127 (1938)
- (129) K. F. Jahr
Naturwiss. 29, 528 (1941)
- (130) E. Birkholz
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1969)
- (131) J. S. Anderson
Nature (London) 140, 850 (1937)

- (132) H. T. Evans jr.
J. Am. Min. 32, 687 (1947)
- (133) H. T. Evans jr.
J. Am. Chem. Soc. 70, 1291 (1948)
- (134) U. C. Agarwala
Doc. Diss., Boston University (1960)
- (135) K. Eriks, N. F. Yannoni, U. C. Agarwala,
V. E. Simmons and L. C. W. Baker
Acta Cryst. 13, 1139 (1960)
- (136) E.-P. Flindt u. Wallner
unveröff., Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1968)
- (137) E.-P. Flindt
Diplomarbeit, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1974)
- (138) P. Witte
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1964)
- (139) K. F. Jahr, J. Fuchs u. P. Witte
Angew. Chem. 76, 13 (1964)
- (140) F. Neu, M.-J. Schwing-Weill
Bull. Soc. Chim. France 4821 (1968)
- (141) E. Birkholz
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1969)
- (142) E. Birkholz, J. Fuchs, W. Schiller, H.-P. Stock
Z. Naturforsch. 26b, 365 (1971)
- (143) W. Schiller
Diplomarbeit, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1969)
- (144) K. Yamanura and Y. Sasaki
J. Chem. Soc., Chem. Comm., 18, 648 (1973)

- (145) L. C. W. Baker and J. S. Figgis
J. Am. Chem. Soc., 92, 3794 (1970)
- (146) G. Johansson
Arkiv Kemi, 20, 321 (1963)
- (147) Int. Tables for X-Ray Crystallography,
Kynoch Press, Birmingham, Vol. III (1962)
- (148) M. M. Boyer, B. le Meur et M. G. Chaudron
c. R. Acad. Sc. Paris, t. 281 (21. 7. 1975)
Série C-59
- (149) K. Nishikawa, A. Kabayashi and Y. Sasaki
Bull. Chem. Soc. Jap. Vol. 48 (11), 3152 (1975)
- (150) J. R. Rea and E. Kostiner
J. Solid State Chem. 7, 17 (1973)
- (151) H. Funk u. G. Mohaupt
Z. anorg. allg. Chem. 315, 204 (1962)
- (152) R. H. Cundiff u. P. C. Markunas
Analytic. Chem. 28, 792 (1956)
- (153) Harlow
Analytic. Chem. 34, 1487 (1962)
- (154) Harlow, Wyld
Analytic. Chem. 34, 172 (1962)
- (155) Int. Tables for X-Ray Crystallography,
Kynoch Press, Bermingham, Vol. II, 300 (1959)
- (156) F. Korte
Methodicum chemicum, Stuttgart, Thieme Verlag-
New York Acad. Press. - London (1973)
- (157) Int. Tables for X-Ray Crystallography

- Kynoch Press, Birmingham, Vol. I (1952)
- (158) G. Ruban
AED 5 und AED 8-Programm zur Herstellung von
Eingabelochstreifen (unveröffentlicht)
- (159) G. Ruban
ALS-Programm zur Auswertung von Ausgabeloch-
streifen (unveröffentlicht)
- (160) G. H. Stout and L. H. Jensen
X-Ray Structure Determination
Collier-Macmillan Limited/ London (1968)
- (161) M. J. Buerger
Vector Space, J. Wiley and Son, New York (1959)
- (162) E. Hellner
Z. Kristallogr. 108, 64 (1957)
- (163) A. L. Patterson
Physic. Rev. 46, 372 (1934)
- (164) A. L. Patterson
Z. Kristallogr., Abt. A90, 517 (1935)
- (165) F. Raaz
Röntgenkristallographie
Walter de Gruyter, Berlin, New York (1975)
- (166) M. J. Buerger
Crystal-structure Analysis,
John Wiley and Son, New York (1967)
- (167) C. C. Darwin
Phil. Mag., 27, 315, 675 (1914)
- (168) P. P. Ewald
Ann. Phys., Leipzig, 54, 519, 557 (1917)

- (169) W. H. Zachariasen
Theory of X-Ray Diffraction by Crystals,
89 - 176 Wiley, New York (1945)
- (170) I. J. de Marco and R. J. Weiss
Acta Cryst. 15, 1125 (1962)
- (171) P. J. Becker, P. Coppens
Acta Cryst. A30, 129 (1974)
- (172) W. H. Zachariasen
Acta Cryst. 23, 558 (1967)
- (173) Siemens (Hrsg.)
Automatisches Einkristalldiffraktometer
nach W. Hoppe (1969)
- (174) L. E. Alexander and G. S. Smith
Acta Cryst. 15, 983
- (175) X-Ray 63, Programm Systems for X-Ray Crystal-
lography, the Depts. of Chem. at the Univers.
Washington, Seattle and Maryland (1965)
- (176) X-Ray 67, Programm Systems for X-Ray Crystal-
lography, Comp. Science Center Univers. of
Maryland (1967)
- (177) X-Ray 72, Programm Systems for X-Ray Crystal-
lography, Comp. Science Center Univers. of
Maryland (1972)
- (178) C. K. Johnson
Programm "ORTEP", Oak Ridge National Laboratory
Oak Ridge, Tennessee (1965)
- (179) D. T. Cromer and J. T. Waber
Acta Cryst. 18, 104 (1965)

- (180) H. P. Hanson, F. Herman, J. D. Lea and
S. Skillmann
Acta Cryst. 17, 1040 (1964)
- (181) D. T. Cromer
Acta Cryst. 18, 17 (1965)
- (182) C. H. Dauben and D. H. Templeton
Acta Cryst. 8, 841, 842 (1955)
- (183) C. H. Dauben and D. H. Templeton
Int. Tables for X-Ray Cryst. Vol. III,
S. 216 (1962)
- (184) W. R. Busing, K. O. Martin and H. A. Levy
Rechenprogramm "ORFFE";
Oak Ridge, Tennessee (1964)
- (185) D. W. J. Cruickshank
Acta Cryst. 9, 754, 757 (1956)
- (186) D. W. J. Cruickshank
Acta Cryst. 14, 896 (1961)
- (187) V. Shomaker u. K. N. Trueblood
Acta Cryst. B. 24, 63 (1968)
- (188) C. Scheringer
Acta Cryst. A28, 512 (1972)
- (189) C. Scheringer
Programm "AKW" (unveröffentlicht)
- (190) J. W. Linnet
J. Chem. Soc. (London), 3796 (1961)
- (191) D. L. Kepert
Inorg. Chem. 1556, 8, II (1969)
- (192) C. M. Flynn jr. and G. D. Stucky

- Inorg. Chem. 8, 332, 335 (1969)
- (193) J. Iball, J. N. Low and T. J. R. Weakley
J. Chem. Soc. 96, 2021 (1974)
- (194) H. d'Amour
Acta Cryst. B 32, 729 (1976)
- (195) B. Dawson
Acta Cryst. 6, 113 (1953)
- (196) T. J. R. Weakley and H. T. Evans jun.
J. Chem. Soc., Chem. Comm. 95, 139 (1973)
- (197) K. Okada, H. Morikawa, F. Marumo and S. Iwai
Acta Cryst. B 31, 1200 (1975)
- (198) H. T. Evans
J. Inorg. Chem. 5, 967 (1966)
- (199) J. R. Rea and E. Kostiner
J. Solid State Chem. 7, 17 (1973)
- (200) K. Nishikawa, A. Kobayashi and Y. Sasaki
Bull. Chem. Soc. Japan 48 (11), 3152 (1975)
- (201) G. Anderson
Acta Chem. Scand. 7, 154 (1953)
- (202) B. Krebs
Acta Cryst. B 28, 2222 (1972)
- (203) L. A. Bursill
Acta Cryst. A 29, 28 (1973)
- (204) L. E. Orgel
Faraday Soc. Disc. 26, 138 (1958)
- (205) Dunitz and L. E. Orgel
Advances Inorg. Chem. Radiochem. 2, 45 (1960)

- (206) H. D. Megaw
Acta Cryst. B 24, 149 (1968)
- (207) L. Pauling
The Nature of the Chemical Bond 2nd. ed.
Oxford University Press (1940)
- (208) R. W. Shannon and C. T. Prewitt
Acta Cryst. B 25, 925 (1969)
- (209) R. W. Shannon and C. T. Prewitt
Acta Cryst. B 26, 1046 (1970)
- (210) R. C. Weast
Handbook of Chemistry, CRC,
Cleveland Ohio (1970)
- (211) L. Pauling
J. Am. Chem. Soc. 51, 1010 (1929)
- (212) F. A. Cotton and R. W. Wing
Inorg. Chem. Vol. 4, 6, 867 (1965)
- (213) G. Donnay u. R. Allmann
Am. Mineralogist 55, 1003 (1970)
- (214) I. D. Brown and R. D. Shannon
Acta Cryst. A 29, 266 (1973)
- (215) F. A. Schröder
Acta Cryst. B 31, 2294 (1975)
- (216) I. Bösch
Dissertation, Mathem.-Naturw. Fak.
Univ. Kiel (1974)
- (217) L. Pauling
J. Am. Chem. Soc. 69, 542 (1947)

- (218) R. Allmann
Vortrag, Berlin (1974)
- (219) D. W. J. Cruickshank
unveröffentlicht
- (220) I. D. Brown and K. K. Wu
private communication, s. (215)
- (221) B. Krebs
Acta Cryst. B 28, 2222 (1972)
- (222) W. C. Hamilton
Acta Cryst. 18, 502 (1965)
- (223) H. Beyer u. W. Walter
Lehrbuch d. org. Chemie
S. Hirzel Verlag Stuttgart (1973)
- (224) S. N. Vinogradov and R. H. Linnell
Hydrogen Bonding, Van Nostrand Reinhold Comp.,
New York, XI, 319 (1971)
- (225) A. Bondi
J. Phys. Chem. 68, 441 (1964)
- (226) Ferguson and Islam
J. Chem. Soc. (B), 593 (1966)
- (227) D. J. Sutor
J. Chem. Soc. 1105 (1963)
- (228) Krimm, Kurowsa and Rebane
Academic Press, New York, Vol. 2, 439 (1967)
- (229) H. Pritzkow
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1971)
- (230) H. Pritzkow u. H. Hartl

- Acta Cryst. B 29, 1777 (1973)
- (231) U. Gerlach
Dissertation, Anorg. Chem. Inst. FU Berlin (1975)
- (232) R. Mattes
Habilitationsschrift, Univ. Münster (1970)

Zusätzliche Übersichtsliteratur:

- (233) H. T. Evans jr.
Persp. of Structural Chemistry IV, 1 (1971)
- (234) T. J. R. Weakley
Am. Structure and Bonding 18, 131 (1974)
- (235) L. P. Kazanskii, E. A. Torchenkova and
V. I. Spitsyn
Russ. Chem. Rev. 43, 525 (1974)
- (236) A. F. Wells
Structural Inorganic Chemistry, 4. ed. (1975)

Die vorliegende Arbeit wurde unter Leitung von Herrn Professor Dr. J. Fuchs im Institut für Anorganische Chemie der Freien Universität Berlin angefertigt.

Meinem sehr verehrten Doktorvater, Herrn Professor Dr. J. Fuchs, danke ich herzlich für die Anregungen und Unterstützung bei dieser Arbeit. Sein großes Interesse und seine ständige Diskussionsbereitschaft haben bei der Durchführung der Arbeit sehr geholfen.

Mein besonderer Dank gilt auch Herrn Professor Dr. H. Hartl, dessen Anleitung und stete Hilfsbereitschaft maßgeblich zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Mein Dank gilt weiterhin allen wissenschaftlichen und technischen Mitarbeitern des Fachbereichs Chemie für die Bereitschaft, mit der sie mir bei der Ausführung meiner Arbeiten behilflich waren. Insbesondere bedanke ich mich bei den Angehörigen des Instituts für Kristallographie für die Überlassung von Rechenprogrammen und des Diffraktometers zu ausgedehnten Messungen.

Lebensdaten

Geburt: 14. 11. 1940 in Berlin

Eltern: Dr. Heinz Freiwald, Diplom-Chemiker
Frida Freiwald, Lehrerin

Schulen: 1945 - 1951 Volksschule Weil am Rhein
1951 - März 1960 Hans-Thoma-Gymnasium

Lörrach

März 1960 Abitur

Studium: Apr. 1960 - Sept. 1962 Universität Freiburg
Okt. 1962 - Febr. 1967 Universität München

In diesem Zeitraum auch Ausbildung an der
Chemieschule Dr. Elhardt in München zum

Chemotechniker: Prüfung Okt. 1966

Febr. 1967 Vordiplom

Apr. 1967 - Febr. 1970 F. U. Berlin

Jul. 1969 Hauptdiplom

Sept. 1969 - Febr. 1970 Anfertigung der
Diplomarbeit unter Anleitung von Prof. Dr.

J. Fuchs

Seit Febr. 1970 wissenschaftlicher Assistent
am Institut für Anorganische Chemie der
Freien Universität Berlin

